

# Capitolul 1

## Elemente de topologie în $\mathbb{R}^k$

### 1.1 Structura de spațiu vectorial pe $\mathbb{R}^k$

Vom nota cu  $\Pi$  (respectiv  $\Sigma$ ) planul (spațiul cu trei dimensiuni) orientat și cu

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\} = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\};$$

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

Aplicațiile

$$\varphi_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \Pi, \varphi_2(x, y) = P(x, y) \in \Pi$$

și

$$\varphi_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \Sigma, \varphi_3(x, y, z) = P(x, y, z) \in \Sigma$$

sînt bijecții. Vom identifica în mod curent un punct din plan (spațiu) cu o pereche ordonată (triplet ordonat) din  $\mathbb{R}^2$  ( $\mathbb{R}^3$ ).

$\forall A \subseteq \mathbb{R}^2(\mathbb{R}^3), \varphi_2(A)(\varphi_3(A))$  se numește imaginea plană (în spațiu) a mulțimii  $A$ .

**1.1.1 Exemple 1.** Fie  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^4 \leq y^2\}$ . Imaginea plană a mulțimii  $A$  este porțiunea hașurată din Figura 1 de mai jos.




Figura 1

$(x, y)$	$I$	$II$	$III$	$IV$
$y - x^2$	+	-	-	
$y + x^2$	+	+	-	+
$y^2 - x^4$	+	-	+	-

$$\Rightarrow A = I \cup III$$




Figura 2

2. Mulțimea  $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$  are drept imagine un hiperboloid de rotație din  $\mathbb{R}^3$  a cărui imagine este schițată în Figura 2 de mai sus.

### Distanța dintre două puncte

Fie  $(x, y, z), (u, v, w) \in \mathbb{R}^3$  și fie  $d$  distanța dintre aceste două puncte (vezi Figura 3); atunci

$$d = \sqrt{d_1^2 + (z - w)^2} = \sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2 + (z - w)^2}.$$

În cazul particular al planului (deci dacă  $z = 0$ ), se obține  $d = \sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2}$  iar pe dreaptă  $d = |x - u|$  și deci se regăsesc formulele cunoscute pentru distanța dintre două puncte în plan și pe dreaptă.




Figura 3

Inspirați de aceste cazuri particulare vom introduce o distanță între două puncte arbitrare din  $\mathbb{R}^k$ .

**1.1.2 Definiție.** Fie  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k), \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k$ ; definim **distanța** dintre punctele  $\mathbf{x}$  și  $\mathbf{y}$  ca fiind numărul pozitiv

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_k - y_k)^2}.$$

Distanța dintre punctele spațiului  $\mathbb{R}^k$  are următoarele proprietăți.

### 1.1.3 Teoremă.

- 1).  $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$ ;
- 2).  $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{x}), \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^k$ ;
- 3).  $d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{z}), \forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^k$ .


**Demonstrație.** Vom demonstra numai proprietatea 3). Fie  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k)$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_k)$ ,  $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_k) \in \mathbb{R}^k$ ; atunci, utilizând inegalitatea lui Cauchy-Schwarz-Buniakowski ( $\sum_{i=1}^k \alpha_i^2 \cdot \sum_{i=1}^k \beta_i^2 \geq (\sum_{i=1}^k \alpha_i \beta_i)^2$ ) obținem

$$\begin{aligned}
 [d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{z})]^2 &= \\
 &= \sum_{i=1}^k (x_i - z_i)^2 + \sum_{i=1}^k (y_i - z_i)^2 + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^k (x_i - z_i)^2 \cdot \sum_{i=1}^k (y_i - z_i)^2} \geq \\
 &\geq \sum_{i=1}^k (x_i - z_i)^2 + \sum_{i=1}^k (y_i - z_i)^2 + 2 \cdot \sum_{i=1}^k (x_i - z_i)(y_i - z_i) = \\
 &= \sum_{i=1}^k (x_i - y_i)^2 = d^2(\mathbf{x}, \mathbf{y}).
 \end{aligned}$$

■

**1.1.4 Definiție.** O funcție  $d$  care la orice două puncte  $x, y$  ale unei mulțimi  $X$  asociază un număr pozitiv  $d(x, y)$  și care verifică proprietățile 1), 2) și 3) din teorema precedentă se numește **metrică** pe  $X$ . Metrica definită în 1.1.2 se numește **metrica euclidiană** pe  $\mathbb{R}^k$ .

În  $\mathbb{R}^2$  adunarea a două puncte  $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$  și  $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$  se face după “regula paralelogramului” ilustrată mai jos:



Suma este  $\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$ ; vom defini după același model adunarea în  $\mathbb{R}^k$ .

**1.1.5 Definiție.** Fie  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k), \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k$  și  $t \in \mathbb{R}$ ; definim adunarea prin  $\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_k + y_k)$  și înmulțirea cu scalari prin  $t \cdot \mathbf{x} = (tx_1, \dots, tx_k)$ .

Față de aceste două operații  $\mathbb{R}^k$  se organizează ca un spațiu vectorial real, adică sînt verificate proprietățile:

1.  $\mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = (\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z}, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^k$  (asociativitatea adunării).
  2.  $\exists \mathbf{0} = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^k$  a.î.  $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$  ( $\mathbf{0}$  se numește element neutru la adunare;
  3.  $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^k, \exists (-\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^k$  a.î.  $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$  ( $-\mathbf{x}$  se numește opusul elementului  $\mathbf{x}$ ).
  4.  $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^k$  (comutativitatea adunării).
- Din proprietățile 1. – 4. deducem că  $(\mathbb{R}^k, +)$  este un grup comutativ.
5.  $t \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = t \cdot \mathbf{x} + t \cdot \mathbf{y}, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^k, \forall t \in \mathbb{R}$ .
  6.  $(t + s) \cdot \mathbf{x} = t \cdot \mathbf{x} + s \cdot \mathbf{x}, \forall t, s \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$ .
  7.  $(t \cdot s) \cdot \mathbf{x} = t \cdot (s \cdot \mathbf{x}), \forall t, s \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$ .
  8.  $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$ .

**1.1.6 Definiție.**  $\forall A \subseteq \mathbb{R}^k, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^k, \forall t \in \mathbb{R}$  definim

$\mathbf{x} + A = \{\mathbf{x} + \mathbf{y} : \mathbf{y} \in A\}$  (translată mulțimii  $A$  cu vectorul  $\mathbf{x}$ ) și  
 $t \cdot A = \{t \cdot \mathbf{x} : \mathbf{x} \in A\}$ .

**1.1.7 Definiție.** Fie  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$ ; numărul pozitiv

$$\|\mathbf{x}\| = d(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \sqrt{\sum_{i=1}^k x_i^2}$$

se numește **norma elementului  $\mathbf{x}$** .

**1.1.8 Propoziție.** Aplicația  $\|\cdot\| : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}_+$  este o normă pe  $\mathbb{R}^k$  adică verifică condițiile:

1.  $\|\mathbf{x}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$ .
2.  $\|t \cdot \mathbf{x}\| = |t| \cdot \|\mathbf{x}\|, \forall t \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$ .
3.  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^k$ .

**1.1.9 Observații.** (i) Rezultă din propoziția precedentă că  $(\mathbb{R}^k, \|\cdot\|)$  este un spațiu normat real.

(ii)  $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^k$ .

Inegalitatea de la punctul 3) al teoremei 1.1.3 (inegalitatea triunghiului) devine, în anumite cazuri, egalitate; prezentăm în definiția următoare această situație specială.

**1.1.10 Definiție.** Fie  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^3$  (sau  $\mathbb{R}^2$ ); spunem că  $\mathbf{z}$  este **între**  $\mathbf{x}$  și  $\mathbf{y}$  și notăm cu  $\mathbf{x} - \mathbf{z} - \mathbf{y}$  situația în care  $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ .

Mulțimea  $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{x} - \mathbf{z} - \mathbf{y}\}$  se va numi **segment** cu capete  $\mathbf{x}$  și  $\mathbf{y}$ .

Mulțimea  $[\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{x} - \mathbf{z} - \mathbf{y} \text{ sau } \mathbf{x} - \mathbf{y} - \mathbf{z}\}$  se va numi **semidreaptă** cu originea în  $\mathbf{x}$  și care trece prin  $\mathbf{y}$ .

Mulțimea  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = [\mathbf{x}, \mathbf{y}) \cup [\mathbf{y}, \mathbf{x})$  se va numi **dreaptă** care trece prin punctele  $\mathbf{x}$  și  $\mathbf{y}$ .

Definiții similare se pot da pentru segmente, semidrepte sau drepte din  $\mathbb{R}^2$ .

În propoziția următoare se dau caracterizări ale segmentelor, semidreptelor și dreptelor din  $\mathbb{R}^3$ .

**1.1.11 Propoziție.** Fie  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ ; atunci:

1.  $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] = \{(1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y} : t \in [0, 1]\}$ .
2.  $[\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \{(1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y} : t \geq 0\}$ .
3.  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \{(1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y} : t \in \mathbb{R}\} = \{\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}) : t \in \mathbb{R}\}$ .

**Demonstrație.**

1. Fie  $t \in [0, 1]$  și  $\mathbf{z} = (1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y}$ ; atunci  $d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\| = \|t(\mathbf{x} - \mathbf{y})\| = t\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$  și  $d(\mathbf{y}, \mathbf{z}) = \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\| = (1-t)\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$  de unde rezultă:  $d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{z}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  și deci  $\mathbf{z} \in [\mathbf{x}, \mathbf{y}]$ .

Reciproc,  $\forall \mathbf{z} \in [\mathbf{x}, \mathbf{y}]$ ,  $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ ; fie  $t = \frac{d(\mathbf{x}, \mathbf{z})}{d(\mathbf{x}, \mathbf{y})} \in [0, 1]$ .

Urmărind ca suport imaginea din Figura 4, obținem:




Figura 4

$$\frac{z_3 - x_3}{y_3 - x_3} = \frac{d(\mathbf{x}, \mathbf{z})}{d(\mathbf{x}, \mathbf{y})} = t \text{ de unde } z_3 = x_3 + ty_3 - tx_3 = (1-t)x_3 + ty_3.$$

Similar,  $z_2 = (1-t)x_2 + ty_2$  și  $z_1 = (1-t)x_1 + ty_1$ , deci  $\mathbf{z} = (1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y}$ .

2.  $\mathbf{z} \in [\mathbf{x}, \mathbf{y}] \Leftrightarrow \mathbf{z} \in [\mathbf{x}, \mathbf{y}]$  sau  $\mathbf{y} \in [\mathbf{x}, \mathbf{z}] \Leftrightarrow \exists t \in [0, 1]$  a.î.  $\mathbf{z} = (1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y}$  sau  $\exists s \in [0, 1]$  a.î.  $\mathbf{y} = (1-s)\mathbf{x} + s\mathbf{z}$ . Ultima egalitate se mai scrie  $\mathbf{z} = (1 - \frac{1}{s})\mathbf{x} + \frac{1}{s}\mathbf{y}$  iar  $t = \frac{1}{s} \geq 1$ . Rezultă că  $\mathbf{z} \in [\mathbf{x}, \mathbf{y}] \Leftrightarrow \exists t \geq 0$  a.î.  $\mathbf{z} = (1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y}$ .

3.  $\mathbf{z} \in (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \Leftrightarrow \mathbf{z} \in [\mathbf{x}, \mathbf{y}] \cup [\mathbf{y}, \mathbf{x}] \Leftrightarrow \exists t \geq 0$  a.î.  $\mathbf{z} = (1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y}$  sau  $\exists s \geq 0$  a.î.  $\mathbf{z} = (1-s)\mathbf{y} + s\mathbf{x}$ ; ultima egalitate se scrie  $\mathbf{z} = (1-t)\mathbf{x} + t\mathbf{y}$  unde  $t = 1-s \leq 1$ . ■

**Exercițiu.** Să se arate că  $\mathbf{x} + [\mathbf{y}, \mathbf{z}] = [\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{z}] = \mathbf{x} + [\mathbf{z}, \mathbf{y}]$ .

## Vectori

Fie  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^k$ ; segmentul orientat  $\overrightarrow{\mathbf{x}\mathbf{y}}$  este segmentul  $[\mathbf{x}, \mathbf{y}]$  căruia i s-a asociat o direcție: de la originea  $\mathbf{x}$  la extremitatea  $\mathbf{y}$ . Observăm că  $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] = [\mathbf{y}, \mathbf{x}]$  însă  $\overrightarrow{\mathbf{x}\mathbf{y}} \neq \overrightarrow{\mathbf{y}\mathbf{x}}$ .

Spunem că  $\overrightarrow{\mathbf{x}\mathbf{y}}$  este echivalent cu  $\overrightarrow{\mathbf{u}\mathbf{v}}$  dacă există  $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^k$  a.î.  $\mathbf{z} + \mathbf{x} = \mathbf{u}$  și  $\mathbf{z} + \mathbf{y} = \mathbf{v}$  și notăm aceasta cu  $\overrightarrow{\mathbf{x}\mathbf{y}} \sim \overrightarrow{\mathbf{u}\mathbf{v}}$ ; observăm că  $\overrightarrow{\mathbf{x}\mathbf{y}} \sim \overrightarrow{\mathbf{0}\mathbf{y} - \mathbf{x}}$ .

$\sim$  este o relație de echivalență pe mulțimea segmentelor orientate (este reflexivă, simetrică și tranzitivă). O clasă de echivalență în raport cu relația  $\sim$  se numește **vector**.

Așa cum am remarcat, vectorul generat de orice segment orientat  $\overrightarrow{\mathbf{x}\mathbf{y}}$  este de asemenea generat de segmentul orientat  $\overrightarrow{\mathbf{0}\mathbf{y} - \mathbf{x}}$  care are originea în  $\mathbf{0}$ . Astfel putem identifica orice element  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$  cu vectorul  $\{\mathbf{z} + \overrightarrow{\mathbf{0}\mathbf{x}} : \mathbf{z} \in \mathbb{R}^k\} = \{\overrightarrow{\mathbf{z}\mathbf{z} + \mathbf{x}} : \mathbf{z} \in \mathbb{R}^k\}$ . Acesta este un motiv în plus să numim elementele lui  $\mathbb{R}^k$  vectori.

**Convenție.** În cele ce urmează vom nota vectorii  $\mathbf{x}$  din  $\mathbb{R}^k$  pur și simplu cu  $x$ , urmînd să se înțeleagă din context cînd este vorba de vectorul  $x \in \mathbb{R}^k$  și cînd de numărul real  $x$ ; în mod similar vectorul nul  $\mathbf{0}$  va fi notat cu  $0$ .

Un **versor** este un vector  $x \in \mathbb{R}^k$  cu  $\|x\| = 1$ .

În cazul  $n = 3$  versorii  $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$ ,  $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ ,  $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$  formează o bază în  $\mathbb{R}^3$ . Orice alt vector  $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$  se exprimă în mod unic în funcție de acești versori:  $x = x_1 \cdot \mathbf{i} + x_2 \cdot \mathbf{j} + x_3 \cdot \mathbf{k}$ .

În  $\mathbb{R}^k$  versorii  $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0, 0)$ , ...,  $e_k = (0, 0, 0, \dots, 0, 1)$  formează o bază; orice vector  $x = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$  se scrie în mod unic în funcție de versorii bazei:  $x = x_1 \cdot e_1 + \dots + x_k \cdot e_k$ .

## Ecuatia dreptei și ecuația planului

Inspirați de propoziția 1.1.11, extindem în  $\mathbb{R}^k$  noțiunile de segment, semidreaptă și dreaptă.

**1.1.12 Definiție.** Fie  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_k^0), y^0 = (y_1^0, \dots, y_k^0) \in \mathbb{R}^k$ ; numim:

1. **segment** avînd drept capete punctele  $x^0$  și  $y^0$  mulțimea

$$[x^0, y^0] = \{x^0 + t(y^0 - x^0) : t \in [0, 1]\}.$$

2. **semidreaptă** cu originea în punctul  $x^0$  și care trece prin  $y^0$  mulțimea

$$[x^0, y^0) = \{x^0 + t(y^0 - x^0) : t \geq 0\}.$$

3. **dreaptă** care trece prin punctele  $x^0$  și  $y^0$  mulțimea

$$(x^0, y^0) = \{x^0 + t(y^0 - x^0) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Ecuatia  $\boxed{x = x^0 + t(y^0 - x^0), t \in \mathbb{R}}$  se numește ecuația vectorială a dreptei  $(x^0, y^0)$ ; ecuațiile scalare sau parametrice ale acestei drepte sînt:

$$\begin{cases} x_1 = x_1^0 + t(y_1^0 - x_1^0) \\ x_2 = x_2^0 + t(y_2^0 - x_2^0) \\ \dots\dots\dots \\ x_k = x_k^0 + t(y_k^0 - x_k^0) \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Dacă se elimină parametru  $t$ , ecuația dreptei se mai poate scrie:

$\frac{x_1 - x_1^0}{y_1^0 - x_1^0} = \frac{x_2 - x_2^0}{y_2^0 - x_2^0} = \dots = \frac{x_k - x_k^0}{y_k^0 - x_k^0}$ . Se constată imediat că, în cazul particular  $n = 2$ , se obține ecuația plană a dreptei ce trece prin două puncte, ecuație cunoscută din geometria analitică plană.

Din cele de mai sus rezultă că ecuația unei drepte care trece prin  $x^0$  și este paralelă cu versorul  $u^0$  (dreaptă ce trece deci prin  $x^0$  și prin  $x^0 + u^0$ ) va fi

$$\boxed{x = x^0 + tu^0, t \in \mathbb{R}}$$

În cazul particular  $n = 3$  vom nota cu  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  unghiurile făcute de versorul  $u^0$  cu axele  $Ox_1, Ox_2$  și respectiv  $Ox_3$ ; atunci  $u^0 = (\cos \alpha_1, \cos \alpha_2, \cos \alpha_3)$  și astfel obținem ecuația normală a dreptei:


$$\frac{x_1 - x_1^0}{\cos \alpha_1} = \frac{x_2 - x_2^0}{\cos \alpha_2} = \frac{x_3 - x_3^0}{\cos \alpha_3}.$$

**1.1.13 Propoziție.** Fie  $x, y, z \in \mathbb{R}^3$  puncte necoliniare și  $(x, y, z)$  planul care trece prin cele trei puncte; atunci:

$$(x, y, z) = \{tx + sy + rz : t, s, r \in \mathbb{R}, t + s + r = 1\}.$$



**Demonstrație.**



Din figura de mai sus observăm că  $u \in (x, y, z) \iff \exists v \in (x, y), \exists w \in (x, z)$   
a.î.  $\vec{xu} = \vec{xv} + \vec{xw}$  sau  $u - x = v - x + w - x \iff u = v + w - x$ . Fie  $t, s \in \mathbb{R}$   
a.î.  $v = x + t(y - x), w = x + s(z - x)$ . Atunci  $u = ty - tx + x + sz - sx = (1 - t - s)x + tx + sz$ . ■

**1.1.14 Definiție.** Fie  $x, y, z \in \mathbb{R}^3$  trei puncte necoliniare; numim **plan** care trece prin  $x, y, z$  mulțimea  $\Pi = \{u = tx + sy + (1 - t - s)z : t, s \in \mathbb{R}\}$ . Ecuația acestui plan este  $\boxed{u = tx + sy + (1 - t - s)z, \quad t, s \in \mathbb{R}}$ .

#### 1.1.15 Exemplu.

Fie punctele necoliniare  $A = (a, 0, 0), B = (0, b, 0), C = (0, 0, c) \in \mathbb{R}^3$ ; ecuația planului care trece prin  $A, B$  și  $C$  este  $u = tA + sB + (1 - t - s)C = (ta, 0, 0) + (0, sb, 0) + (0, 0, (1 - t - s)c) = (ta, sb, (1 - t - s)c)$ . Dacă notăm cu

$$(x, y, z) \text{ coordonatele lui } u \text{ obținem } \begin{cases} x = ta \\ y = sb \\ z = (1 - t - s)c \end{cases}, t, s \in \mathbb{R}. \text{ Eliminând}$$


parametrii  $t$  și  $s$  din ecuațiile de mai sus vom ajunge la ecuația planului prin tăieturi:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} - 1 = 0.$$

### Produs scalar

Fie  $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$  și fie  $\theta$  unghiul  $\widehat{x0y}$ ; definim atunci  $(x, y) = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos \theta$ . Observăm că dreapta care trece prin punctele 0 și  $x$  este perpendiculară pe dreapta ce trece prin 0 și  $y$  dacă și numai dacă  $(x, y) = 0$ .

Așa cum putem constata din figura de mai jos,  $\cos \theta = \cos(\theta_2 - \theta_1) = \cos \theta_2 \cos \theta_1 + \sin \theta_2 \sin \theta_1 = \frac{y_1}{\|y\|} \cdot \frac{x_1}{\|x\|} + \frac{y_2}{\|y\|} \cdot \frac{x_1}{\|x\|} = \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2}{\|x\| \cdot \|y\|}$ .



Rezultă deci că  $(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2$ ; acesta ne permite să extindem acest “produs” la  $\mathbb{R}^k$ .

**1.1.16 Definiție.** Fie  $x = (x_1, \dots, x_k), y = (y_1, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k$ ; numim **produs scalar** (sau **produs interior**) al vectorilor  $x$  și  $y$  numărul real:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^k x_i y_i.$$

Vom spune că vectorii  $x$  și  $y$  sînt **perpendiculari** dacă  $(x, y) = 0$ ; vom nota această situație cu  $x \perp y$ .

**1.1.17 Observație.** Deși notația pentru produsul scalar a vectorilor  $x$  și  $y$  coincide cu aceea pentru dreapta care trece prin punctele  $x$  și  $y$  vom putea să distingem din context în ce sens este folosită.

**1.1.18 Propoziție.** Produsul scalar pe  $\mathbb{R}^k$  are următoarele proprietăți:

$$\begin{aligned} (x, y) &= (y, x), \forall x, y \in \mathbb{R}^k, \\ (tx, y) &= t(x, y), \forall x, y \in \mathbb{R}^k, \forall t \in \mathbb{R}, \\ (x + y, z) &= (x, z) + (y, z), \forall x, y, z \in \mathbb{R}^k, \\ (x, x) &= \|x\|^2, \forall x \in \mathbb{R}^k, \\ |(x, y)| &\leq \|x\| \cdot \|y\| \leq \frac{1}{2}(\|x\|^2 + \|y\|^2), \forall x, y \in \mathbb{R}^k \end{aligned}$$

**Demonstrație.** Vom demonstra numai ultima inegalitate.

$\forall x, y \in \mathbb{R}^k, (x - ty, x - ty) \geq 0$  sau  $(y, y) \cdot t^2 - 2(x, y) \cdot t + (x, x) \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$ ; deci discriminantul acestui trinom de gradul doi trebuie să fie negativ, de unde:  $|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ . ■

# Capitolul 1

## Elemente de topologie în $\mathbb{R}^k$

### 1.1 Structura de spațiu vectorial pe $\mathbb{R}^k$

**1.1.19 Definiție.** Din propoziția precedentă remarcăm că

$$-1 \leq \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|} \leq 1, \forall x, y \in \mathbb{R}^k, x \neq 0 \neq y.$$

Rezultă atunci că există un unghi unic  $\theta \in [0, \pi]$  a.î.

$$\cos \theta = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|}.$$

Vom spune că  $\theta$  este **unghiul** dintre vectorii  $x$  și  $y$  (unghiul  $\widehat{x0y}$ ); regăsim astfel formula din cazul  $k = 2$ :

$$(x, y) = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos \theta, \forall x, y \in \mathbb{R}^k.$$

### 1.2 Relația de ordine pe $\mathbb{R}^k$

**1.2.1 Definiție.** Fie  $x = (x_1, \dots, x_k), y = (y_1, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k$ ; spunem că  $x$  este mai mic decât  $y$  și notăm cu  $x \leq y$  situația în care  $x_1 \leq y_1, \dots, x_k \leq y_k$ .

**1.2.2 Observație.** Relația definită este **reflexivă**, adică:

1.  $x \leq x, \forall x \in \mathbb{R}^k$ ,

**antisimetrică**, deci:

2.  $x \leq y$  și  $y \leq x$  antrenează  $x = y$

și **tranzitivă**, deci:

3.  $x \leq y$  și  $y \leq z$  antrenează  $x \leq z$ .

Aceste proprietăți caracterizează relațiile de ordine; deci “ $\leq$ ” este o **relație de ordine** pe  $\mathbb{R}^k$ .


Această ordine nu este totală; de exemplu  $(0, 1)$  nu este comparabil cu  $(1, 0)$  în  $\mathbb{R}^2$ .

**1.2.3 Definiție.** O mulțime  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  este **mărginită superior** în  $\mathbb{R}^k$  dacă există un **majorant** pentru  $A$ , deci dacă există un element  $x^0 \in \mathbb{R}^k$  a.î.  $x \leq x^0, \forall x \in A$ .

O mulțime  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  este **mărginită inferior** în  $\mathbb{R}^k$  dacă există un **minorant** pentru  $A$ , deci dacă există un element  $x^0 \in \mathbb{R}^k$  a.î.  $x \geq x^0, \forall x \in A$ .

O mulțime este **mărginită** dacă este mărginită superior și mărginită inferior.

În figura de mai jos se ilustrează o astfel de situație în  $\mathbb{R}^2$




$x^0$  este un majorant iar  $y^0$  un minorant pentru mulțimea  $A$ .

**1.2.4 Teoremă.** Orice mulțime nevidă și mărginită superior (mărginită inferior) din  $\mathbb{R}^k$  admite margine superioară (margine inferioară).

**Demonstrație.** Presupunem că  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_k^0) \in \mathbb{R}^k$  este un majorant pentru mulțimea nevidă  $A$ . Fie  $A_1 = \{a \in \mathbb{R} : \exists x = (a, x_2, \dots, x_k) \in A\}$ ;  $A_1$  este o mulțime nevidă și mărginită superior de  $x_1^0$  în  $\mathbb{R}$ . Rezultă că există  $\bar{x}_1 = \sup A_1 \in \mathbb{R}$ . Raționăm similar pentru celelalte coordonate și găsim  $\bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k$

marginii superioare pentru  $A_2, \dots, A_k$ , respectiv. Fie  $\bar{x} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_k) \in \mathbb{R}^k$ . Rezultă imediat că  $\bar{x}$  este marginea superioară a mulțimii  $A$ . Similar se arată că dacă  $A$  este mărginită inferior  $\exists \bar{y} = \inf A$ . ■

**1.2.5 Observație.** Trebuie remarcat că, spre deosebire de  $\mathbb{R}$ , în  $\mathbb{R}^k, k \geq 2$ ,



nu ne putem apropia oricât de marginea superioară a unei mulțimi cu puncte din mulțime.

În figura alăturată ilustrăm o astfel de situație.  $\bar{x} = \sup A$  însă,  $\forall x \in A, d(x, \bar{x}) = \|x - \bar{x}\| \geq r$ .

**1.2.6 Definiție.** Fie  $x^0 \in \mathbb{R}^k$  și  $r \in \mathbb{R}, r > 0$ ; mulțimea

$$S(x^0, r) = \{x \in \mathbb{R}^k : d(x, x^0) = \|x - x^0\| < r\}$$

se numește **sferă deschisă** cu centrul în  $x^0$  și de rază  $r$  iar mulțimea

$$T(x^0, r) = \{x \in \mathbb{R}^k : d(x, x^0) = \|x - x^0\| \leq r\}$$

se numește **sferă închisă** cu centrul în  $x^0$  și de rază  $r$ .

**1.2.7 Observație.** În cazul particular  $k = 3$  sferele deschise sînt exact sferele geometrice pline fără “coajă”, iar sferele închise sînt sferele pline din spațiu.

Pentru  $k = 2$ , sferele deschise (închise) sînt discurile geometrice deschise (închise); în cazul  $k = 1$  sferele deschise sînt intervale deschise iar sferele închise sînt intervale închise (centrul este în mijlocul intervalului iar raza este egală cu jumătate din lungimea acestuia).

**1.2.8 Propoziție.** O mulțime  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  este mărginită dacă și numai dacă există un număr  $r > 0$  a.î.  $A \subseteq T(0, r)$  (sau  $\|x\| \leq r, \forall x \in A$ ).

**Demonstrație.** ( $\Rightarrow$ ): Presupunem că  $A$  este mărginită; fie  $y^0 = (y_1^0, \dots, y_k^0)$  un minorant și  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_k^0)$  un majorant pentru  $A$ .

Rezultă că,  $\forall x = (x_1, \dots, x_k) \in A$ ,

$$y_i^0 \leq x_i \leq x_i^0, \forall i = 1, \dots, k$$

și deci că

$$|x_i| \leq \max\{|x_i^0|, |y_i^0|\} \leq \max\{|x_i^0|, |y_i^0|, i = 1, \dots, k\}.$$


Atunci  $\sum_{i=1}^k x_i^2 \leq k \cdot \max\{(x_i^0)^2, (y_i^0)^2 : i = 1, \dots, k\}$ , de unde

$$\|x\| \leq \sqrt{k} \cdot \max\{|x_i^0|, |y_i^0| : i = 1, \dots, k\}.$$

Putem deci alege  $r = \sqrt{k} \cdot \max\{|x_i^0|, |y_i^0| : i = 1, \dots, k\}$ .

( $\Leftarrow$ ): Presupunem că există un număr  $r > 0$  a.î.  $A \subseteq T(0, r)$  și notăm  $x^0 = (r, \dots, r)$ ,  $y^0 = (-r, \dots, -r)$ . Este evident că  $y^0$  este un minorant iar  $x^0$  este un majorant pentru mulțimea  $A$ . ■

**1.2.9 Observație.** Fie  $x, y \in \mathbb{R}^k$ ,  $x \leq y$ ; atunci  $[x, y] \subsetneq \{z : x \leq z \leq y\}$ . Ilustrăm acest fapt în  $\mathbb{R}^2$ :




## 1.3 Structura topologică uzuală pe $\mathbb{R}^k$

**1.3.1 Definiție.** Fie  $x^0 \in \mathbb{R}^k$ ; o mulțime  $V \subseteq \mathbb{R}^k$  se numește **vecinătate** a punctului  $x^0$  dacă există un număr  $r > 0$  a.î.  $S(x^0, r) \subseteq V$ .

Vom nota cu  $\mathcal{V}(x^0)$  mulțimea tuturor vecinătăților lui  $x^0$ ;  $\mathcal{V}(x^0)$  este o submulțime a mulțimii  $\mathcal{P}(\mathbb{R}^k)$  a tuturor părților lui  $\mathbb{R}^k$ . Evident că  $\forall x \in \mathbb{R}^k, \forall r > 0, S(x, r) \in \mathcal{V}(x)$ .

În figura de mai jos  $V \subseteq \mathbb{R}^3$  este un con plin cu vârful în  $y^0$  iar  $x^0$  este un punct în interiorul lui  $V$ ; după cum se poate constata din figură,  $V$  este vecinătate pentru  $x^0$  dar nu este vecinătate pentru  $y^0$ .



Teorema următoare pune în evidență câteva proprietăți importante ale mulțimii vecinătăților unui punct.

**1.3.2 Teoremă.** Fie  $x^0 \in \mathbb{R}^k$ ;  $\forall x \in \mathbb{R}^k$  fie  $\mathcal{V}(x)$  mulțimea vecinătăților lui  $x$ . Atunci sînt îndeplinite următoarele proprietăți:

- (V<sub>1</sub>)  $V \in \mathcal{V}(x^0), V \subseteq W \implies W \in \mathcal{V}(x^0)$ ,
- (V<sub>2</sub>)  $V_1, V_2 \in \mathcal{V}(x^0) \implies V_1 \cap V_2 \in \mathcal{V}(x^0)$ ,
- (V<sub>3</sub>)  $x^0 \in V, \forall V \in \mathcal{V}(x^0)$ ,
- (V<sub>4</sub>)  $\forall V \in \mathcal{V}(x^0), \exists W \in \mathcal{V}(x^0)$  a.î.  $V \in \mathcal{V}(x), \forall x \in W$ ,
- (V<sub>5</sub>)  $\forall y^0 \neq x^0, \exists V \in \mathcal{V}(x^0), \exists W \in \mathcal{V}(y^0)$  a.î.  $V \cap W = \emptyset$ .

**Demonstrație.** Vom schița demonstrația doar pentru ultimele două proprietăți.

(V<sub>4</sub>). Oricare ar fi  $V \in \mathcal{V}(x^0)$  există  $r > 0$  așa fel încît  $S(x^0, r) \subseteq V$ ; atunci  $W = S(x^0, r) \in \mathcal{V}(x^0)$  și  $\forall x \in W, d(x, x^0) = \|x - x^0\| < r$ . Fie  $r_1 = r - \|x - x^0\| > 0$ ;  $\forall y \in S(x, r_1), d(y, x^0) = \|y - x^0\| \leq \|y - x\| + \|x - x^0\| < r_1 + \|x - x^0\| = r$  deci  $y \in S(x^0, r)$ . Rezultă că  $S(x, r_1) \subseteq S(x^0, r) \subseteq V$  ceea ce antrenează  $V \in \mathcal{V}(x)$ .

(V<sub>5</sub>). Fie  $y^0 \neq x^0$ ; atunci  $r = \frac{1}{2} \cdot d(x^0, y^0) = \frac{1}{2} \cdot \|x^0 - y^0\| > 0$ .  $S(x^0, r) \in \mathcal{V}(x^0)$ ,  $S(y^0, r) \in \mathcal{V}(y^0)$  și intersecția celor două vecinătăți este vidă.

Intr-adevăr dacă ar exista un element comun  $x$  atunci  $2 \cdot r = d(x^0, y^0) \leq d(x^0, x) + d(x, y^0) < r + r = 2 \cdot r$  ceea ce este absurd. ■

În practică este mai dificil de operat cu noțiunea generală de vecinătate; unele vecinătăți, cum ar fi de exemplu sferele, oferă simplificări ale raționamentelor.

**1.3.3 Definiție.** Fie  $x^0 \in \mathbb{R}^k$ ; o familie de mulțimi  $\mathcal{V}_0(x^0) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^k)$  se numește sistem fundamental de vecinătăți dacă:

- 1).  $\mathcal{V}_0(x^0) \subseteq \mathcal{V}(x^0)$ ;
- 2).  $\forall V \in \mathcal{V}(x^0), \exists W \in \mathcal{V}_0(x^0)$  a.î.  $W \subseteq V$ .

**1.3.4 Exemple.** Următoarele familii de mulțimi oferă exemple de sisteme fundamentale numărabile de vecinătăți pentru un punct  $x = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$ :

- a).  $\left\{ S\left(x, \frac{1}{n}\right) : n \in \mathbb{N}^* \right\}$ .
- b).  $\left\{ \prod_{i=1}^k \left(x_i - \frac{1}{n}, x_i + \frac{1}{n}\right) : n \in \mathbb{N}^* \right\}$ .

Avînd la dispoziție noțiunea de vecinătate putem trece la studiul convergenței șirurilor în  $\mathbb{R}^k$ .

**1.3.5 Definiție.** O funcție  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^k$  se numește **șir** de vectori în  $\mathbb{R}^k$ ; vom nota,  $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = x^n = (x_1^n, \dots, x_k^n)$ . Șirurile de numere reale  $(x_1^n)_{n \in \mathbb{N}}, \dots, (x_k^n)_{n \in \mathbb{N}}$  se vor numi șirurile de coordonate asociate șirului  $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

Ca și în cazul real, vom folosi pentru șirul  $f$  notația mai sugestivă  $f \equiv (x^n)_{n \in \mathbb{N}}$  sau pur și simplu  $(x^n)$ . Pentru a indica mulțimea  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  ca mulțime de valori pentru șirul  $f$  vom nota (abuziv !)  $(x^n) \subseteq A$ .

Fie  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^k$  un șir; șirul  $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^k$  se numește **subșir** al șirului  $f$  dacă există o funcție strict crescătoare  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  a.î.  $g = f \circ \varphi$ . Dacă notăm  $\varphi(n) = l_n, \forall n \in \mathbb{N}$  atunci un subșir al șirului  $f$  este  $g \equiv (x^{l_n})_{n \in \mathbb{N}}$  unde  $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este un șir strict crescător de numere naturale.

**1.3.6 Lemă.** Pentru orice mulțime infinită de numere naturale  $N \subseteq \mathbb{N}$  există o unică bijecție strict crescătoare  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow N$ .

**Demonstrație.** Fie  $N \subseteq \mathbb{N}$  o mulțime infinită de numere naturale; deoarece  $N$  este nevidă și relația de ordine pe  $\mathbb{N}$  este o relație de bună ordonare, există un cel mai mic element  $l_0$  al mulțimii  $N$ ; mulțimea infinită  $N \setminus \{l_0\}$  este nevidă și deci are un prim element  $l_1$ . Evident  $l_0 < l_1$ . Continuăm inductiv acest



procedeu; presupunem că am determinat elementele  $l_0 < l_1 < l_2 < \dots < l_n$  ale mulțimii  $N$ , unde  $l_n = \min(N \setminus \{l_0, \dots, l_{n-1}\})$ . Mulțimea  $N \setminus \{l_0, \dots, l_n\}$  este nevidă (este o mulțime infinită) și deci are un prim element  $l_{n+1}$ ; evident  $l_n < l_{n+1}$ . Am definit astfel mulțimea  $\{l_0, \dots, l_n, \dots\} \subseteq N$  cu  $l_0 < l_1 < \dots < l_n < \dots$ . Prin inducție se poate arăta că  $l_n \geq n, \forall n \in \mathbb{N}$  și deci,  $\forall n \in N, n \in \{l_0, \dots, l_n\}$  ceea ce înseamnă că  $N = \{l_0, \dots, l_n, \dots\}$ . Astfel am introdus o funcție strict crescătoare și surjectivă  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow N, \varphi(n) = l_n, \forall n \in \mathbb{N}$ . Dacă  $\varphi_1 : \mathbb{N} \rightarrow N$  este o altă bijecție strict crescătoare,  $\varphi_1(0)$  va fi cel mai mic element al mulțimii  $N$  și astfel va coincide cu  $l_0$ .  $\varphi_1(1)$  este cel mai mic element al mulțimii  $N \setminus \{\varphi_1(0)\} = N \setminus \{l_0\}$  și astfel coincide cu  $l_1$  ș.a.m.d. În general demonstrăm că  $\varphi_1(n) = l_n, \forall n \in \mathbb{N}$  ceea ce arată că  $\varphi_1 = \varphi$ . ■

**1.3.7 Observație.** Lema precedentă afirmă de fapt că orice submulțime infinită a lui  $\mathbb{N}$  dotată cu ordinea naturală este “asemenea” mulțimii numerelor naturale (are același număr ordinal). Vom considera de acum fiecare mulțime infinită de numere naturale ordonată strict crescător.

**1.3.8 Propoziție.** *Orice subșir al șirului  $f$  este restricția funcției  $f$  la o submulțime infinită  $N \subseteq \mathbb{N}$ .*

**Demonstrație.** Dacă  $g$  este subșir al șirului  $f \equiv (x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $g = f \circ \varphi$ , unde  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  este o funcție strict crescătoare; atunci  $g \equiv (x^{l_n})_{n \in \mathbb{N}}$  unde  $l_n = \varphi(n), \forall n \in \mathbb{N}$ . Să observăm că mulțimea  $N = \varphi(\mathbb{N}) = \{l_n : n \in \mathbb{N}\}$  este o mulțime infinită de numere naturale și că  $g \equiv (x^n)_{n \in N} = f|_N$ .

Invers, fie  $N \subseteq \mathbb{N}$  a.î. este o mulțime infinită de numere naturale și fie  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow N$  unica bijecție strict crescătoare a cărei existență este asigurată de lema de mai sus; dacă  $g = f|_N$ , atunci  $g \equiv f \circ \varphi$  este un subșir al șirului  $f$ . ■

**1.3.9 Observație.** În cele ce urmează vom folosi noțiunea de subșir al unui șir  $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ , după cum va fi mai convenabil, în una din cele două accepțiuni:

1.  $(x^{l_n})_{n \in \mathbb{N}}$ , unde  $(l_n)$  este un șir strict crescător de numere naturale sau
2.  $(x^n)_{n \in N}$  unde  $N$  este o submulțime infinită de numere naturale.

# Capitolul 1

## Elemente de topologie în $\mathbb{R}^k$

### 1.3 Structura topologică uzuală pe $\mathbb{R}^k$

**1.3.10 Definiție.** Fie  $(x^n)_n \subseteq \mathbb{R}^k$  un șir de vectori și fie  $x \in \mathbb{R}^k$ ; vom spune că șirul  $(x^n)_n$  **converge la  $x$**  dacă oricare ar fi o vecinătate  $V \in \mathcal{V}(x)$  există un rang  $n_0 \in \mathbb{N}$  așa fel încât oricare ar fi  $n \geq n_0, x^n \in V$ ; vom nota aceasta prin  $x^n \rightarrow x$  sau, când vrem să marcăm spațiul în care are loc convergența,  $x^n \xrightarrow{\mathbb{R}^k} x$ .

Șirul  $(x^n) \subseteq \mathbb{R}^k$  este **convergent** dacă există  $x \in \mathbb{R}^k$  a.î.  $x^n \rightarrow x$ ; vectorul  $x$  se va numi **limita** șirului convergent  $(x^n)$ . Un șir care nu este convergent se numește **divergent**.

A stabili **natura** unui șir înseamnă a stabili dacă el este convergent sau dacă este divergent.

**1.3.11 Observație.** Formal, definiția coincide cu aceea de la șiruri de numere reale. De altfel, în orice spațiu abstract în care, printr-un procedeu oarecare, am definit noțiunea de vecinătate putem defini similar noțiunea de șir convergent.

**1.3.12 Propoziție.** Un șir  $(x^n) \subseteq \mathbb{R}^k$  este convergent la  $x$  dacă și numai dacă șirul de numere reale  $(\|x^n - x\|)_{n \in \mathbb{N}}$  este convergent la zero.

**Demonstrație.** ( $\Rightarrow$ ) Presupunem că  $x^n \rightarrow x$  și fie  $\varepsilon > 0$  arbitrar; atunci sfera  $S(x, \varepsilon) \in \mathcal{V}(x)$  și deci există  $n_0 \in \mathbb{N}$  a.î.  $\forall n \geq n_0, x^n \in S(x, \varepsilon)$  ceea ce este echivalent cu  $\|x^n - x\| < \varepsilon$ . Deci  $\|x^n - x\| \rightarrow 0$ .

( $\Leftarrow$ ) Presupunem că  $\|x^n - x\| \rightarrow 0$  și fie  $V$  o vecinătate arbitrară a lui  $x$ . Din definiția vecinătăților, există  $r > 0$  a.î.  $S(x, r) \subseteq V$  și astfel există  $n_0 \in \mathbb{N}$  a.î.  $\|x^n - x\| < r, \forall n \geq n_0$ . De aici rezultă că pentru orice  $n \geq n_0$ ,  $x^n \in S(x, r) \subseteq V$ . ■

Convergența unui șir de vectori din  $\mathbb{R}^k$  se reduce la convergența șirurilor de coordonate asociate lui.

**1.3.13 Teoremă.** Fie șirul  $(x^n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^k, x^n = (x_1^n, \dots, x_k^n), \forall n \in \mathbb{N}$  și fie  $x = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$ ;

$$x^n \xrightarrow{\mathbb{R}^k} x \iff x_i^n \xrightarrow{\mathbb{R}} x_i, \forall i \in \{1, \dots, k\}.$$

**Demonstrație.** Demonstrația teoremei rezultă din inegalitățile:

$$(*) \quad |x_i^n - x_i| \leq \|x^n - x\| \leq \sqrt{k} \cdot \max\{|x_i^n - x_i| : i = 1, \dots, k\}.$$

Într-adevăr, dacă presupunem că  $x^n \xrightarrow{\mathbb{R}^k} x$  atunci  $\|x^n - x\| \rightarrow 0$  și, din prima inegalitate a relației (\*),  $x_i^n \rightarrow x_i, \forall i = 1, \dots, k$ .

Reciproc, dacă  $\forall i \in \{1, \dots, k\}, x_i^n \xrightarrow{\mathbb{R}} x_i$ , atunci  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_i \in \mathbb{N}$  a.î.

$$(i) \quad |x_i^n - x_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{k}}, \forall n \geq n_i.$$

Fie  $n_0 = \max\{n_i : i = 1, \dots, k\}$ ;  $\forall n \geq n_0$  și  $\forall i = 1, \dots, k, n \geq n_i$  și atunci, din relația (i),

$$|x_i^n - x_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{k}}$$

de unde

$$\sqrt{k} \cdot \max\{|x_i^n - x_i| : i = 1, \dots, k\} < \varepsilon.$$

Utilizînd inegalitatea din dreapta relației (\*) rezultă că  $\|x^n - x\| \rightarrow 0$  și deci  $x^n \rightarrow x$ . ■

Propoziția următoare pune în evidență cîteva proprietăți generale ale șirurilor convergente; vom face observația că acestea sînt asemănătoare proprietăților generale ale convergenței șirurilor de numere reale.

#### 1.3.14 Propoziție.

- 1). *Limita unui șir convergent este unică.*
- 2). *Orice șir convergent este mărginit.*

$$3). \quad x^n \xrightarrow{\mathbb{R}^k} x \implies \|x^n\| \xrightarrow{\mathbb{R}} \|x\|.$$

4). Dacă într-un şir schimbăm ordinea termenilor natura sa nu se schimbă iar în cazul în care este convergent limita sa rămîne aceeaşi.

5). Dacă unui şir îi adăugăm sau îi suprimăm un număr finit de termeni natura şirului nu se schimbă iar în caz de convergenţă nici limita.

6). Orice subşir al unui şir convergent converge la aceeaşi limită.

**Demonstraţie.** Deoarece convergenţa şirurilor în  $\mathbb{R}^k$  este echivalentă cu convergenţa şirurilor de coordonate, demonstraţia proprietăţilor 1), 4), 5) şi 6) se bazează pe proprietăţile similare ale şirurilor de numere reale.

2). Fie  $(x^n) \in \mathbb{R}^k$  convergent şi fie  $x \in \mathbb{R}^k$  limita sa; atunci  $\|x^n - x\| \rightarrow 0$ . Pentru  $\varepsilon = 1, \exists n_1 \in \mathbb{N}$  a.î.  $\|x^n - x\| < 1, \forall n \geq n_1$ . Notăm cu

$$r = \max\{\|x^0\|, \|x^1\|, \dots, \|x^{n_1-1}\|, \|x\| + 1\};$$

atunci,  $\forall n \in \mathbb{N}, \|x^n\| \leq r$ . Într-adevăr, dacă  $n < n_1$ , atunci este evidentă inegalitatea iar dacă  $n \geq n_1$ ,  $\|x^n\| \leq \|x^n - x\| + \|x\| < 1 + \|x\| \leq r$ .

Rezultă că  $\{x^n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq T(0, r)$  şi deci  $(x^n)$  este un şir mărginit (mulţimea termenilor săi este o mulţime mărginită).

3). Presupunem că  $x^n \xrightarrow{\mathbb{R}^k} x$ ; atunci, cum

$$|\|x^n\| - \|x\|| \leq \|x^n - x\|, \forall n \in \mathbb{N},$$

rezultă că  $\|x^n\| \xrightarrow{\mathbb{R}} \|x\|$ . ■

## Operaţii cu şiruri convergente

**1.3.15 Propoziţie.** Fie  $(x^n), (y^n) \subseteq \mathbb{R}^k, x, y \in \mathbb{R}^k, (t_n) \subseteq \mathbb{R}$  şi  $t \in \mathbb{R}$ ; atunci:

- 1).  $\left. \begin{array}{l} x^n \rightarrow x \\ y^n \rightarrow y \end{array} \right\} \implies x^n + y^n \rightarrow x + y.$
- 2).  $\left. \begin{array}{l} x^n \rightarrow x \\ t_n \rightarrow t \end{array} \right\} \implies t_n \cdot x^n \rightarrow t \cdot x.$
- 3).  $\left. \begin{array}{l} x^n \rightarrow x \\ y^n \rightarrow y \end{array} \right\} \implies (x^n, y^n) \rightarrow (x, y).$

**Demonstrație.**

1). Deoarece  $x^n \rightarrow x$  și  $y^n \rightarrow y$ ,  $\|x^n - x\| \rightarrow 0$  și  $\|y^n - y\| \rightarrow 0$ ; concluzia este o consecință a inegalității:

$$\|(x^n + y^n) - (x + y)\| \leq \|x^n - x\| + \|y^n - y\|.$$

2).  $\|t_n \cdot x^n - t \cdot x\| \leq \|t_n \cdot x^n - t_n \cdot x\| + \|t_n \cdot x - t \cdot x\| = |t_n| \cdot \|x^n - x\| + |t_n - t| \cdot \|x\|$ . Deoarece  $(t_n)$  este convergent la  $t$  (deci este și mărginit !) iar  $(x^n)$  este convergent la  $x$ , din inegalitatea de mai sus rezultă că  $t_n \cdot x^n \rightarrow t \cdot x$ .

3).  $|(x^n, y^n) - (x, y)| \leq |(x^n - x, y^n)| + |(x, y^n - y)| \leq \|x^n - x\| \cdot \|y^n\| + \|x\| \cdot \|y^n - y\|$ . Deoarece  $(x^n)$  este convergent la  $x$  și  $(y^n)$  este convergent la  $y$  (deci și mărginit !), rezultă din relația de mai sus că  $(x^n, y^n) \rightarrow (x, y)$ . ■

**Teoreme fundamentale**

Rezultatele următoare reprezintă instrumente fundamentale ale teoriei convergenței în  $\mathbb{R}^k$ ; formal ele sînt identice cu rezultatele similare de pe  $\mathbb{R}$ .

**1.3.16 Teoremă.** *Orice șir monoton crescător și mărginit converge la marginea superioară a mulțimii termenilor săi.*

*Orice șir monoton descrescător și mărginit converge la marginea inferioară a mulțimii termenilor săi.*

**Demonstrație.** Fie  $(x^n) \subseteq \mathbb{R}^k$  un șir crescător și mărginit, unde  $\forall n \in \mathbb{N}, x^n = (x_1^n, \dots, x_k^n)$ . Ținînd cont de definiția relației de ordine rezultă că  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall i \in \{1, \dots, k\}, x_i^n \leq x_i^{n+1}$ . În plus  $(x^n)$  fiind și mărginit, există  $x = (x_1, \dots, x_k) = \sup\{x^n : n \in \mathbb{N}\}$ . Așa cum a rezultat din demonstrația teoremei 1.2.4,  $x_1 = \sup\{x_1^n : n \in \mathbb{N}\}, \dots, x_k = \sup\{x_k^n : n \in \mathbb{N}\}$ . Rezultă atunci din teorema de convergență a șirurilor monotone de numere reale că  $x_1 = \lim_n x_1^n, \dots, x_k = \lim_n x_k^n$  și astfel, utilizînd teorema 1.3.13,  $x^n \rightarrow x$ .

Pentru șiruri descrescătoare demonstrația este asemănătoare. ■

**1.3.17 Corolar.** *Orice șir monoton și mărginit în  $\mathbb{R}^k$  este convergent.*

**1.3.18 Teoremă** (lema lui Cesàro). *Orice șir mărginit în  $\mathbb{R}^k$  are subșiruri convergente.*

**Demonstrație.** Vom face demonstrația în cazul particular  $k = 2$ . Fie  $(x^n)$  un șir mărginit din  $\mathbb{R}^2, x^n = (x_1^n, x_2^n), \forall n \in \mathbb{N}$  și fie  $x^0 = (x_1^0, x_2^0)$  un

minorant iar  $y^0 = (y_1^0, y_2^0)$  un majorant al mulțimii termenilor șirului; atunci,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , rezultă  $x_1^0 \leq x_1^n \leq y_1^0$  și  $x_2^0 \leq x_2^n \leq y_2^0$ .

Șirul  $(x_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$  fiind mărginit în  $\mathbb{R}$ , varianta scalară a lemei lui Cesàro ne asigură existența unei mulțimi infinite  $N_1 \subseteq \mathbb{N}$  și a unui punct  $x_1 \in \mathbb{R}$  a.î.  $(x_1^n)_{n \in N_1} \rightarrow x_1$ .  $(x_2^n)_{n \in N_1}$  este subșir al șirului  $(x_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ; fiind la rândul său mărginit, există o mulțime infinită  $N_2 \subseteq N_1$  și un punct  $x_2 \in \mathbb{R}$  a.î.  $(x_2^n)_{n \in N_2} \rightarrow x_2$ . Șirul  $(x_1^n)_{n \in N_2}$  este subșir al șirului  $(x_1^n)_{n \in N_1}$  și deci  $(x_1^n)_{n \in N_2} \rightarrow x_1$ . Rezultă atunci că șirul  $(x^n)_{n \in N_2}$  este un subșir al șirului  $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$  convergent la  $x = (x_1, x_2)$ .

În cazul general demonstrația este similară.

① Fie  $(x^n)$  un șir mărginit din  $\mathbb{R}^k$ ,  $x^n = (x_1^n, \dots, x_k^n)$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  și fie  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_k^0)$  un minorant iar  $y^0 = (y_1^0, \dots, y_k^0)$  un majorant al mulțimii termenilor șirului;  $\forall n \in \mathbb{N}$  și  $\forall i \in \{1, \dots, k\}$  rezultă  $x_i^0 \leq x_i^n \leq y_i^0$ .

Șirul  $(x_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$  fiind mărginit în  $\mathbb{R}$ , varianta scalară a lemei lui Cesàro ne asigură existența unei mulțimi infinite  $N_1 \subseteq \mathbb{N}$  și a unui punct  $x_1 \in \mathbb{R}$  a.î.  $(x_1^n)_{n \in N_1} \rightarrow x_1$ . Subșirul  $(x_2^n)_{n \in N_1}$  al șirului  $(x_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$  fiind la rândul său mărginit, există o mulțime infinită  $N_2 \subseteq N_1$  și un punct  $x_2 \in \mathbb{R}$  a.î.  $(x_2^n)_{n \in N_2} \rightarrow x_2$ . În același mod obținem mulțimile infinite  $N_2 \supseteq N_3 \supseteq \dots \supseteq N_k$  și punctele  $x_3, \dots, x_k \in \mathbb{R}$  a.î.  $(x_3^n)_{n \in N_3} \rightarrow x_3, \dots, (x_k^n)_{n \in N_k} \rightarrow x_k$ . Șirurile  $(x_i^n)_{n \in N_k}$  sînt subșiruri ale șirurilor  $(x_i^n)_{n \in N_i}$ ,  $\forall i \in \{1, \dots, k\}$  și deci  $(x_i^n)_{n \in N_k} \rightarrow x_i$ ,  $\forall i \in \{1, \dots, k\}$ . Rezultă atunci că șirul  $(x^n)_{n \in N_k}$  este un subșir al șirului  $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$  convergent la  $x = (x_1, \dots, x_k)$ . ■

Înainte de a enunța următoarea teoremă vom defini noțiunea de șir Cauchy.

**1.3.19 Definiție.** Un șir  $(x^n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^k$  se numește **șir Cauchy** sau **șir fundamental** dacă  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$  a.î.,  $\forall n, m \geq n_0, \|x^n - x^m\| < \varepsilon$ .

Rezultă imediat că un șir  $(x^n)$  este șir Cauchy dacă și numai dacă  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$  a.î.  $\forall n \geq k_0, \forall p \in \mathbb{N}, \|x^{n+p} - x^n\| < \varepsilon$ .

În teorema 1.3.13 am arătat că un șir de vectori este convergent dacă și numai dacă sînt convergente toate șirurile sale de coordonate. O proprietate similară are loc și pentru șirurile Cauchy.

**1.3.20 Propoziție.** Fie  $(x^n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^k$ ,  $x^n = (x_1^n, \dots, x_k^n)$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ; șirul  $(x^n)$  este șir Cauchy în  $\mathbb{R}^k$  dacă și numai dacă șirurile sale de coordonate  $(x_1^n)_n, \dots, (x_k^n)_n$  sînt șiruri Cauchy în  $\mathbb{R}$ .

**Demonstrație.** Demonstrația este o consecință imediată a inegalităților:

$$(*) \quad |x_i^n - x_i^m| \leq \|x^n - x^m\| \leq \sqrt{k} \cdot \max\{|x_i^n - x_i^m| : i = 1, \dots, k\}, \forall n, m \in \mathbb{N}.$$

Într-adevăr, dacă  $(x^n)_n$  este șir Cauchy, atunci  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$  a.î.,  $\forall n, m \geq n_0, \|x^n - x^m\| < \varepsilon$ . Din prima inegalitate din (\*) rezultă că,  $\forall i = 1, \dots, k, |x_i^n - x_i^m| \leq \|x^n - x^m\| < \varepsilon$  deci șirurile  $(x_i^n)_n$  sînt șiruri Cauchy în  $\mathbb{R}$ ,  $\forall i = 1, \dots, k$ .

Reciproc, dacă presupunem că,  $\forall i = 1, \dots, k$ , șirul  $(x_i^n)_n$  este șir Cauchy în  $\mathbb{R}$ , atunci  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_i \in \mathbb{N}$  a.î.  $\forall n, m \geq n_i, |x_i^n - x_i^m| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{k}}$ . Fie atunci  $n_0 = \max\{n_1, \dots, n_k\}$ ;  $\forall n, m \geq n_0, \sqrt{k} \cdot \max\{|x_i^n - x_i^m| : i = 1, \dots, k\} < \varepsilon$  și utilizînd inegalitatea a doua din (\*) obținem  $\|x^n - x^m\| < \varepsilon$  ceea ce arată că șirul  $(x^n)_n$  este șir Cauchy în  $\mathbb{R}^k$ . ■

**1.3.21 Teoremă** (teorema lui Cauchy). *Un șir  $(x^n) \subseteq \mathbb{R}^k$  este convergent dacă și numai dacă este șir Cauchy.*

**Demonstrație.** Teorema se poate demonstra ușor pe baza propoziției precedente și a variantei scalare a teoremei fundamentale a lui Cauchy. Astfel un șir de vectori  $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$  din  $\mathbb{R}^k$  este convergent dacă și numai dacă șirurile sale de coordonate sînt convergente (teorema 1.3.13); teorema lui Cauchy pentru șiruri de numere reale ne asigură atunci că  $(x^n)_n$  converge dacă și numai dacă șirurile sale de coordonate sînt șiruri Cauchy și, conform propoziției precedente, aceasta are loc dacă și numai dacă  $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$  este șir Cauchy.

Putem să prezentăm și o variantă directă de demonstrație care urmează aceeași linie cu demonstrația teoremei lui Cauchy din  $\mathbb{R}$  (să se compare !).

Ⓢ Necesitatea. Presupunem că șirul  $(x^n)$  este șir convergent în  $\mathbb{R}^k$ ; atunci există un  $x$  unic în  $\mathbb{R}^k$  a.î.  $x^n \rightarrow x$ . Rezultă că  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$  a.î.  $\forall n \geq n_0, \|x^n - x\| < \frac{1}{2}\varepsilon$ . Atunci  $\forall n, m \geq n_0, \|x^n - x^m\| \leq \|x^n - x\| + \|x^m - x\| < \varepsilon$ .

Suficiența.

1. Fie  $(x^n) \subseteq \mathbb{R}^k$  un șir Cauchy; vom arăta întîi că  $(x^n)$  este mărginit. Într-adevăr, pentru  $\varepsilon = 1, \exists n_0 \in \mathbb{N}$  a.î.  $\forall n \geq n_0, \|x^n - x^{n_0}\| < 1$ . Rezultă că  $\|x^n\| \leq \|x^n - x^{n_0}\| + \|x^{n_0}\| < 1 + \|x^{n_0}\|$ . Atunci,  $\forall n \in \mathbb{N}, \|x^n\| \leq M = \max\{\|x^0\|, \|x^1\|, \dots, \|x^{n_0-1}\|, 1 + \|x^{n_0}\|\}$  ceea ce arată că  $(x^n)$  este mărginit.

2. Deoarece  $(x^n)$  este mărginit putem utiliza lema lui Cesàro pentru a pune în evidență un subșir  $(x^{l_n})_{n \in \mathbb{N}}$  convergent la un element  $x \in \mathbb{R}^k$  (aici  $(l_n)_n$  este un șir strict crescător de numere naturale).

Fie  $\varepsilon > 0$  arbitrar.

Deoarece  $(x^n)$  este șir Cauchy, există  $n_1 \in \mathbb{N}$  a.î.

$$(1) \quad \|x^n - x^m\| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n, m \geq n_1.$$

Deoarece  $(x^{l_n})_{n \in \mathbb{N}}$  converge la  $x$ , există  $n_2 \in \mathbb{N}$  a.î.

$$(2) \quad \|x^{l_n} - x\| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n \geq n_2.$$

Fie  $n_3 = \max\{n_1, n_2\}$ ;  $\forall n \geq n_3$  rezultă  $l_n \geq n \geq n_1$  și  $n \geq n_2$  și astfel din (1) și (2) obținem:

$$\|x^n - x\| \leq \|x^n - x^{l_n}\| + \|x^{l_n} - x\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

ceea ce arată că  $x^n \rightarrow x$ . ■

**1.3.22 Teoremă** (teorema lui Cantor). *Fie  $(x^n) \subseteq \mathbb{R}^k$  și  $(r_n) \in (0, +\infty)$ ; dacă sînt îndeplinite condițiile:*

1).  $T(x^n, r_n) \supseteq T(x^{n+1}, r_{n+1}), \forall n \in \mathbb{N}$ ,

2).  $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$ ,

atunci există  $x \in \mathbb{R}^k$  a.î.

$$\bigcap_{n=0}^{\infty} T(x^n, r_n) = \{x\}.$$

**Demonstrație.**  $\forall n, p \in \mathbb{N}, x^{n+p} \in T(x^{n+p}, r_{n+p}) \subseteq T(x^n, r_n)$  de unde

$$(*) \quad \|x^{n+p} - x^n\| \leq r_n.$$

Cum  $r_n \rightarrow 0$ , rezultă că  $(x^n)$  este șir Cauchy. Teorema lui Cauchy ne asigură existența unui element  $x \in \mathbb{R}^k$  a.î.  $x^n \rightarrow x$ . Dacă în relația (\*) trecem la limită pentru  $p \rightarrow \infty$  obținem, ținînd cont de proprietatea de continuitate a normei,  $\|x - x^n\| \leq r_n, \forall n \in \mathbb{N}$  ceea ce arată că  $x \in T(x^n, r_n), \forall n \in \mathbb{N}$ .

Dacă  $\bigcap_{n=0}^{\infty} T(x^n, r_n)$  ar mai conține un element  $y$ , atunci  $\|x^n - y\| \leq r_n, \forall n \in \mathbb{N}$ ; rezultă că  $x^n \rightarrow y$ . Cum limita unui șir convergent este unică,  $x = y$ . ■

**1.3.23 Observație.** Vom prezenta o variantă a acestei teoreme în care sferile închise vor fi înlocuite cu mulțimi dintr-o clasă mai largă. Pentru aceasta avem nevoie să introducem și alte elemente de topologie în  $\mathbb{R}^k$ .

## Alte elemente de topologie pe $\mathbb{R}^k$

**1.3.24 Definiție.** *Fie  $x \in \mathbb{R}^k, A \subseteq \mathbb{R}^k$ ; spunem că:*

1).  $x$  este punct **aderent** pentru mulțimea  $A$  dacă  $V \cap A \neq \emptyset, \forall V \in \mathcal{V}(x)$ ;



vom nota cu  $\bar{A}$  mulțimea punctelor aderente ale mulțimii  $A$  și o vom numi **aderența** sau **închiderea** mulțimii  $A$ .

2).  $x$  este punct **de acumulare** pentru mulțimea  $A$  dacă  $V \cap A \setminus \{x\} \neq \emptyset, \forall V \in \mathcal{V}(x)$ ; vom nota cu  $A'$  mulțimea punctelor de acumulare ale mulțimii  $A$  și o vom numi mulțimea **derivată** a mulțimii  $A$ .

3).  $x$  este punct **interior** pentru mulțimea  $A$  dacă  $A \in \mathcal{V}(x)$ ; mulțimea punctelor interioare mulțimii  $A$  se numește **interiorul** mulțimii  $A$  și se notează cu  $\overset{\circ}{A}$ .

4).  $x$  este punct **izolat** al mulțimii  $A$  dacă există o vecinătate  $V \in \mathcal{V}(x)$  a.î.  $V \cap A = \{x\}$ .

5). Mulțimea  $A$  este mulțime **închisă** dacă  $A = \bar{A}$ .

6). Mulțimea  $A$  este mulțime **deschisă** dacă  $A = \overset{\circ}{A}$ .

# Capitolul 1

## Elemente de topologie în $\mathbb{R}^k$

### 1.3 Structura topologică uzuală pe $\mathbb{R}^k$

**1.3.25 Observație.** Noțiunile introduse în definiția precedentă cu ajutorul vecinătăților pot fi prezentate echivalent în limbajul unui sistem fundamental de vecinătăți; vom folosi mulțimea sferelor deschise drept astfel de sistem fundamental de vecinătăți pentru a obține următoarele enunțuri echivalente:

- 1).  $x \in \bar{A} \iff \forall \varepsilon > 0, S(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ .
- 2).  $x \in A' \iff \forall \varepsilon > 0, S(x, \varepsilon) \cap A \setminus \{x\} \neq \emptyset$ .
- 3).  $x \in \mathring{A} \iff \exists \varepsilon > 0$  a.î.  $S(x, \varepsilon) \subseteq A$ .
- 4).  $x$  este punct izolat pentru  $A$  dacă  $\exists \varepsilon > 0$  a.î.  $S(x, \varepsilon) \cap A = \{x\}$ .

Ținând cont de faptul că fiecare punct din  $\mathbb{R}^k$  admite un sistem fundamental de vecinătăți numărabil, putem caracteriza principalele noțiuni topologice introduse prin definiția 1.3.23 cu ajutorul șirurilor.

**1.3.26 Teoremă.** Fie  $x \in \mathbb{R}^k, A \subseteq \mathbb{R}^k$ ; atunci:

- 1).  $x$  este punct aderent pentru  $A$  dacă și numai dacă există un șir  $(x^n) \subseteq A$  a.î.  $x^n \rightarrow x$ .
- 2).  $x$  este punct de acumulare pentru  $A$  dacă și numai dacă există un șir  $(x^n) \subseteq A \setminus \{x\}$  a.î.  $x^n \rightarrow x$ .
- 3).  $A$  este mulțime închisă dacă și numai dacă oricare ar fi un șir convergent  $(x^n) \subseteq A, \lim_n x^n \in A$ .

**Demonstrație.** 1). Fie  $x \in \bar{A}$ ;  $\forall n \in \mathbb{N}^*, S(x, \frac{1}{n}) \in \mathcal{V}(x)$  și deci  $\exists x^n \in$

$S(x, \frac{1}{n}) \cap A$ . Atunci  $(x^n)$  este un șir de puncte din  $A$  și  $\|x^n - x\| < \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ , de unde  $x^n \rightarrow x$ .

Reciproc, dacă există un șir  $(x^n) \subseteq A$  convergent la  $x$ , atunci,  $\forall V \in \mathcal{V}(x), \exists n_0 \in \mathbb{N}$  a.î.,  $\forall n \geq n_0, x^n \in V$ . În particular,  $x^{n_0} \in V \cap A$  de unde  $V \cap A \neq \emptyset$ . Rezultă că  $x \in \bar{A}$ .

2). Caracterizarea este evidentă dacă ținem cont de punctul 3). al propoziției 1.3.25.


3). Fie  $A$  o mulțime închisă, deci  $A = \bar{A}$ , și fie  $(x^n) \subseteq A$  un șir convergent la  $x$ ; din punctul 1).  $x \in \bar{A} = A$ . Reciproc, presupunem că orice șir convergent din  $A$  are limita în  $A$ . Știm că  $A \subseteq \bar{A}$  (vezi propoziția 1.3.26 punctul 1).);  $\forall x \in \bar{A}, \exists (x^n) \subseteq A$  a.î.  $x^n \rightarrow x$  (punctul 1).) și astfel  $x \in A$ . Rezultă că  $A = \bar{A}$  deci  $A$  este mulțime închisă. ■

### 1.3.27 Exemple.

1). Sferele închise sînt mulțimi închise; sferele deschise sînt mulțimi deschise. Într-adevăr, dacă am presupune că există o sferă închisă  $T(x, r)$  care nu este mulțime închisă ar rezulta că  $\exists y \in \overline{T(x, r)} \setminus T(x, r)$ ; atunci  $\varepsilon = \|x - y\| - r > 0$  și deci  $S(y, \varepsilon) \cap T(x, r) \neq \emptyset$ . Fie  $z$  un punct din intersecție; atunci  $\|x - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| < r + \varepsilon = \|x - y\|$  ceea ce este absurd.

Fie acum  $S(x, r)$  o sferă deschisă arbitrară din  $\mathbb{R}^k$ ; să arătăm că este vecinătate pentru orice punct al ei. Fie  $y \in S(x, r)$  și  $\varepsilon = r - \|x - y\| > 0$ . Vom demonstra că  $S(y, \varepsilon) \subseteq S(x, r)$  de unde va rezulta că  $S(x, r)$  este vecinătate pentru  $y$ .  $\forall z \in S(y, \varepsilon), \|z - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < \varepsilon + \|x - y\| = r$  ceea ce arată că  $z \in S(x, r)$ .

2). Fie  $A = A_1 \cup A_2 \cup \{(0, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^2$  unde  $A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 1\}$  iar  $A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq -x^2 - 1\}$ . Imaginea mulțimii  $A$  este schițată în imaginea de mai jos.



Atunci  $\bar{A} = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \{(0, 0)\}$  unde  $\bar{A}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 1\}$ ,  $\bar{A}_2 = A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq -x^2 - 1\}$ ,  $A' = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2$ ,  $\dot{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 1, \text{ sau } y < -x^2 - 1\}$ ; punctul  $(0, 0)$  este singurul punct izolat al mulțimii  $A$ . Mulțimea  $A_1$  este mulțime deschisă iar mulțimea  $A_2$  este mulțime închisă. Mulțimea  $A$  nu este nici deschisă nici închisă.

Remarcăm aici că dacă o mulțime nu este deschisă nu rezultă că ar fi închisă !!

3). Dreapta ce trece prin punctele  $x$  și  $y$  din  $\mathbb{R}^k$ ,

$$(x, y) = \{x + t \cdot (y - x) : t \in \mathbb{R}\}$$

este o mulțime închisă în  $\mathbb{R}^k$  care nu are puncte interioare. Pentru a demonstra că  $(x, y)$  este mulțime închisă este suficient să arătăm că orice punct care nu aparține dreptei nu este punct aderent pentru aceasta.

Fie  $z \notin (x, y)$ ;  $\forall t \in \mathbb{R}$ , fie  $u = x + t \cdot (y - x) \in (x, y)$ . Atunci

$$\begin{aligned} (*) \quad \|z - u\|^2 &= (z - u, z - u) = (z - x, z - x) - 2t \cdot (z - x, y - x) + t^2 \cdot (y - x, y - x) = \\ &= \|x - y\|^2 \cdot t^2 - 2t \cdot (z - x, y - x) + \|z - x\|^2. \end{aligned}$$

Trinomul de gradul doi în  $t$  de mai sus are discriminantul

$$\Delta = 4 [(z - x, y - x)^2 - \|z - x\|^2 \cdot \|x - y\|^2] \leq 0$$

(inegalitatea lui Cauchy  $|(z - x, y - x)| \leq \|z - x\| \cdot \|y - x\|$  din propoziția 1.1.18). Mai mult, discriminantul  $\Delta < 0$  deoarece  $(z - x, y - x) = \|z - x\| \cdot \|y - x\|$  are loc dacă și numai dacă există  $t \in \mathbb{R}$  a.î.  $z - x = t(y - x)$  ceea ce este imposibil ( $z \notin (x, y)$ ). Atunci din (\*)

$$\|z - u\|^2 \geq -\frac{\Delta}{4 \cdot \|x - y\|^2} = \frac{\|z - x\|^2 \cdot \|x - y\|^2 - (z - x, y - x)^2}{\|x - y\|^2} = r^2 > 0.$$

Din cele de mai sus rezultă că sfera deschisă  $S(z, r)$  nu întâlnește  $(x, y)$  și deci  $z \notin \overline{(x, y)}$ .

Segmentul închis  $[x^0, y^0] = \{x^0 + t \cdot (y^0 - x^0) : t \in [0, 1]\}$  este de asemenea mulțime închisă. Trebuie să menționăm aici că segmentul deschis  $]x^0, y^0[ = \{x^0 + t \cdot (y^0 - x^0) : t \in ]0, 1[ \}$  nu este însă mulțime deschisă în cazul  $k \geq 2$ . Dacă  $x^0 < y^0$ , mulțimea  $\{x \in \mathbb{R}^k : x^0 < x < y^0\}$  (paralelipipedul deschis) este mulțime deschisă.

4). Mulțimea  $A = \{tx + sy + (1 - t - s)z : t, s \in \mathbb{R}\}$  din  $\mathbb{R}^3$  (graficul unui plan care trece prin punctele  $x, y, z$ ) este o mulțime închisă în  $\mathbb{R}^3$  fără puncte interioare.

Prezentăm mai jos câteva relații imediate între noțiunile introduse:

### 1.3.28 Propoziție.

- 1).  $\overset{\circ}{A} \subseteq A \subseteq \bar{A}, A' \subseteq \bar{A}, \bar{A} = A \cup A'$ .
- 2). Mulțimea punctelor izolate ale mulțimii  $A$  este egală cu  $\bar{A} \setminus A'$  și deci cu  $A \setminus A'$  (un punct aderent pentru  $A$  este sau punct de acumulare sau punct izolat al mulțimii  $A$ ).
- 3).  $x \in A' \iff x \in \overline{A \setminus \{x\}}$ .
- 4). O mulțime  $A$  este închisă dacă și numai dacă  $A' \subseteq A$ .
- 5). O mulțime  $A$  este deschisă dacă și numai dacă  $A$  este vecinătate pentru orice punct al ei.

**Demonstrație.** 1).  $\forall x \in \overset{\circ}{A}, A \in \mathcal{V}(x)$  și deci  $x \in A$ ;  $\forall x \in A, \forall V \in \mathcal{V}(x), x \in A \cap V$ , deci  $V \cap A \neq \emptyset$  ceea ce spune că  $x \in \bar{A}$ .

Am arătat deci că:  $\overset{\circ}{A} \subseteq A \subseteq \bar{A}$ .

$A' \subseteq \bar{A}$  rezultă imediat din definiția punctelor de acumulare.

Din cele demonstrate pînă acum rezultă că  $A \cup A' \subseteq \bar{A}$ . Fie acum un element arbitrar  $x \in \bar{A}$ ; dacă  $x \in A$  atunci  $x \in A \cup A'$ . Dacă  $x \notin A, \forall V \in \mathcal{V}(x), V \cap A \setminus \{x\} = V \cap A \neq \emptyset$  ( $x$  este punct aderent pentru  $A$ ). Rezultă că  $x \in A'$ . Aceasta demonstrează incluziunea inversă  $\bar{A} \subseteq A \cup A'$ .

2). Fie  $x$  un punct izolat al mulțimii  $A$  și fie  $V$  o vecinătate a sa a.î.  $V \cap A = \{x\}$ ; atunci  $x \in A \subseteq \bar{A}$  și evident că  $x \notin A'$ . Invers, dacă  $x \in \bar{A} \setminus A'$  atunci din 1)  $x \in A$ ; cum  $x \notin A'$  există o vecinătate a sa  $V$  a.î.  $V \cap A \setminus \{x\} = \emptyset$ ; atunci  $V \cap A = \{x\}$  și deci  $x$  este punct izolat al mulțimii  $A$ .

3). Este evidentă.

4). Din 1).  $\bar{A} = A \cup A'$ ;  $A$  este închisă dacă și numai dacă  $A = \bar{A} = A \cup A'$  ceea ce este echivalent cu  $A' \subseteq A$ .

5). Este o consecință imediată a definițiilor mulțimilor deschise și a punctelor interioare. ■

Propoziția următoare prezintă câteva proprietăți ale mulțimilor închise și ale celor deschise.

### 1.3.29 Propoziție. Fie $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ; atunci:

- 1).  $A$  este mulțime închisă dacă și numai dacă  $\mathbb{R}^k \setminus A$  este mulțime deschisă.
- 2).  $\bar{A}$  este mulțime închisă (cea mai mică mulțime închisă care conține

mulțimea  $A$ ).

3).  $\overset{\circ}{A}$  este mulțime deschisă (cea mai mare mulțime deschisă conținută în mulțimea  $A$ ).

Ⓢ **Demonstrație.** 1). Presupunem că  $A$  este mulțime închisă ( $A = \bar{A}$ ); pentru a demonstra că  $\overset{\circ}{\mathbb{R}^k \setminus A}$  este deschisă trebuie să arătăm că  $\overset{\circ}{\mathbb{R}^k \setminus A} = \mathbb{R}^k \setminus \bar{A}$ . Incluziunea  $\overset{\circ}{\mathbb{R}^k \setminus A} \subseteq \mathbb{R}^k \setminus \bar{A}$  este asigurată de punctul 1). al propoziției 1.3.26. Fie acum  $x \in \mathbb{R}^k \setminus \bar{A}$ ; rezultă că  $x \notin A = \bar{A}$ . Există deci o vecinătate  $V$  a lui  $x$  a.i.  $V \cap A = \emptyset$  sau, echivalent,  $V \subseteq \mathbb{R}^k \setminus A$ . Ultima incluziune ne asigură că  $\mathbb{R}^k \setminus A$  este vecinătate a punctului  $x$  și deci că  $x \in \overset{\circ}{\mathbb{R}^k \setminus A}$ .

Reciproc, fie  $\mathbb{R}^k \setminus A$  mulțime deschisă și  $x \in \bar{A}$ ; dacă presupunem că  $x \notin A$  atunci  $x \in \overset{\circ}{\mathbb{R}^k \setminus A} = \mathbb{R}^k \setminus \bar{A}$  și deci  $\mathbb{R}^k \setminus A \in \mathcal{V}(x)$ . Cum  $x \in \bar{A}$  ar trebui ca  $(\mathbb{R}^k \setminus A) \cap A \neq \emptyset$  ceea ce este absurd. Deci ipoteza  $x \notin A$  este falsă, de unde rezultă că  $A = \bar{A}$  și deci  $A$  este mulțime închisă.

2).  $A$  arăta că  $\bar{A}$  este închisă revine la a demonstra că  $\bar{A} = \bar{\bar{A}}$ ; din propoziția 1.3.26 punctul 1). știm că  $\bar{A} \subseteq \bar{\bar{A}}$ . Presupunem că incluziunea inversă nu are loc și fie atunci  $x \in \bar{A} \setminus \bar{\bar{A}}$ . Deoarece  $x$  nu este punct aderent pentru  $A$ , există o vecinătate  $V$  a sa a.i.  $V \cap A = \emptyset$ . Din proprietatea ( $V_4$ ) a teoremei 1.3.2 există o vecinătate  $W \in \mathcal{V}(x)$  a.i.  $V \in \mathcal{V}(y), \forall y \in W$ . Deoarece  $x \in \bar{A}, W \cap \bar{A} \neq \emptyset$ . Fie atunci  $y \in W \cap \bar{A}$ . Rezultă că  $V \in \mathcal{V}(y)$  și, cum  $y \in \bar{A}, V \cap A \neq \emptyset$  ceea ce reprezintă o contradicție.

Fie acum  $F = \bar{F}$  o altă mulțime închisă ce conține  $A$ ;  $\forall x \in \bar{A}, \exists (x^n) \subseteq A \subseteq F$  a.i.  $x^n \rightarrow x$ . Caracterizarea mulțimilor închise dată în teorema 1.3.28 punctul 3). ne permite să afirmăm că  $x = \lim_k x^n \in F$ . Deci  $\bar{A} \subseteq F$ .

3). Demonstrația este asemănătoare celei de la punctul precedent; se arată că  $\overset{\circ}{A} = \overset{\circ}{\bar{A}}$ . ■

Putem acum extinde teorema lui Cantor (teorema 1.3.22) de la clasa sferelor închise la aceea a mulțimilor închise; să definim întâi diametrul unei mulțimi mărginite.

**1.3.30 Definiție.** Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime mărginită; după propoziția 1.2.8 există  $r > 0$  a.i.  $A \subseteq T(0, r)$ ; atunci,  $\forall x, y \in A, d(x, y) = \|x - y\| \leq \|x\| + \|y\| \leq 2 \cdot r$ . Deci mulțimea  $\{d(x, y) = \|x - y\| : x, y \in A\}$  este mărginită în  $\mathbb{R}$  și deci există

$$\delta(A) = \sup\{\|x - y\| : x, y \in A\} \in \mathbb{R}_+$$

Numărul  $\delta(A)$  se numește **diametrul** mulțimii  $A$ .

**1.3.31 Teoremă** (teorema lui Cantor). Fie  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  un șir de mulțimi închise nevide din  $\mathbb{R}^k$ ; dacă sînt îndeplinite condițiile:

1).  $F_n \supseteq F_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$ ,

2).  $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta(F_n) = 0$ ,

atunci există  $x \in \mathbb{R}^k$  a.î.

$$\bigcap_{n=0}^{\infty} F_n = \{x\}.$$

Ⓢ **Demonstrație.** Demonstrația este asemănătoare demonstrației teoremei 1.3.22. Fie  $x^n \in F_n, \forall n \in \mathbb{N}$  ( $F_n$  sînt mulțimi nevide). Atunci,  $\forall n, p \in \mathbb{N}, x^{n+p} \in F_{n+p} \subseteq F_n$  de unde  $\|x^{n+p} - x^n\| \leq \delta(F_n) \rightarrow 0$ . Rezultă că  $(x^n)$  este șir Cauchy în  $\mathbb{R}^k$  și deci converge la un  $x \in \mathbb{R}^k$ . Dar,  $\forall n \in \mathbb{N}, (x^m)_{m \geq n} \subseteq F_n$  de unde rezultă că  $x \in F_n, \forall n \in \mathbb{N}$ . Deoarece  $\delta(F_n) \rightarrow 0$ , intersecția acestor mulțimi nu poate conține și alte puncte. ■

Vom introduce acum o noțiune topologică de mare importanță în întreaga analiză matematică: noțiunea de mulțime compactă.

**1.3.32 Definiție.** O mulțime  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  se numește mulțime **compactă** dacă pentru orice șir de elemente din  $A$  se poate găsi un subșir convergent la un punct din  $A$ .

Înainte de a da exemple de mulțimi compacte vom prezenta o caracterizare importantă a acestor mulțimi în  $\mathbb{R}^k$ .

**1.3.33 Teoremă.** O submulțime din  $\mathbb{R}^k$  este compactă dacă și numai dacă este mărginită și închisă.

**Demonstrație.** Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime compactă; să presupunem întâi că  $A$  nu este mărginită. Rezultă din propoziția 1.2.8 că nu există nici-o sferă închisă centrată în origine care să conțină mulțimea  $A$ . Deci  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x^n \in A \setminus T(0, n)$ . Atunci șirul  $(x^n) \subseteq A$  și, cum  $A$  este compactă, există  $(x^{l_n})_{n \in \mathbb{N}}$  un subșir al său convergent la un punct din  $A$ . Pe de altă parte,  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \|x^{l_n}\| > l_n \geq n$  ceea ce conduce la concluzia absurdă că acest subșir este nemărginit. Deci ipoteza că  $A$  este nemărginită este falsă.

Să arătăm că  $A$  este închisă. Vom folosi punctul 3). al teoremei 1.3.28. Fie deci  $(x^n) \subseteq A$  un șir convergent și fie  $x = \lim_n x^n$ ; deoarece  $A$  este compactă există un subșir  $(x^{l_n})$  al șirului  $(x^n)$  convergent la un punct  $y \in A$ .

Rezultă că  $x^{l_n} \rightarrow x$  și, cum limita unui șir convergent este unică,  $x = y$ . Deci  $\lim_n x^n \in A$  ceea ce arată că  $A$  este închisă.

Reciproc, să presupunem că  $A$  este o mulțime mărginită și închisă din  $\mathbb{R}^k$  și să considerăm un șir  $(x^n) \subseteq A$ . Rezultă că  $(x^n)$  este mărginit și atunci, din lema lui Cesàro (teorema 1.3.18), el are un subșir  $(x^{l_n}) \subseteq A$  convergent. Deoarece  $A$  este închisă  $\lim_n x^{l_n} \in A$ . Deci  $A$  este compactă. ■

**1.3.34 Exemple.** 1). Submulțimile finite ale lui  $\mathbb{R}^k$  sînt mulțimi compacte (orice șir de elemente dintr-o astfel de mulțime conține un subșir constant).  
2). Sferele închise sînt mulțimi compacte (sînt mulțimi mărginite și închise - vezi punctul 1) de la exemplul 1.3.27).  
3). Segmentele închise sînt mulțimi compacte (vezi punctul 3) de la exemplul 1.3.27); semidreptele sau dreptele nu sînt compacte.



## Capitolul 2

# Funcții de mai multe variabile

### 2.1 Definiții. Exemple.

**2.1.1 Definiție.** Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  și  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^l$ ;

- dacă  $k = l = 1$ ,  $f$  este o funcție reală de o variabilă reală,
- dacă  $k > 1$  și  $l = 1$ ,  $f$  este o funcție reală sau **scalară** de mai multe variabile,
- dacă  $k = 1$  și  $l > 1$ ,  $f$  este o funcție **vectorială** de o variabilă reală,
- în sfârșit în cazul  $k > 1, l > 1$ ,  $f$  este o funcție vectorială de mai multe variabile reale.

Mulțimea  $G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l \equiv \mathbb{R}^{k+l}$  se numește **graficul** funcției  $f$ .

#### 2.1.2 Exemple.


1). Fie  $x^0, y^0 \in \mathbb{R}^k$ ; funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^k, f(t) = x^0 + t(y^0 - x^0), \forall t \in \mathbb{R}$ , este o funcție vectorială de o variabilă. Graficul lui  $f$  este dreapta care trece prin punctele  $x^0$  și  $y^0$ .  $f|_{[0,1]}$  - restricția acestei funcții la intervalul închis  $[0, 1]$  - are drept grafic segmentul de capete  $x^0$  și  $y^0$ .

2). Fie  $x^0, y^0, z^0 \in \mathbb{R}^3$ ; funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(t, s) = t \cdot x^0 + s \cdot y^0 + (1 - t - s) \cdot z^0, \forall (t, s) \in \mathbb{R}^2$ , are drept grafic planul care trece prin  $x^0, y^0$  și  $z^0$ .

3). Aplicația  $f : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$  definită prin  $f(r, u) = (x, y)$  unde 
$$\begin{cases} x = r \cos u, \\ y = r \sin u \end{cases}$$
 este o surjecție; ea reprezintă trecerea de la coordonatele carteziene în plan la cele polare. Restricția ei la  $(0, +\infty) \times [0, 2\pi)$  este o bijecție pe  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ .

4). Aplicația  $f : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) \times [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}^3$  definită prin  $f(r, u, v) = (x, y, z)$  unde 
$$\begin{cases} x = r \cos u \cos v, \\ y = r \sin u \cos v \\ z = r \sin v \end{cases}$$
 este o surjecție; ea reprezintă trecerea de

la coordonatele carteziene la coordonatele polare în spațiu. Semnificația variabilelor  $r$ ,  $u$  și  $v$  este redată în schița de mai jos.



Restricția acestei aplicații la  $(0, +\infty) \times [0, 2\pi) \times (-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2})$  este o bijecție pe  $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$

5). Norma  $\|\cdot\|$  pe  $\mathbb{R}^k$  este o aplicație scalară de mai  $n$  variabile reale. Produsul scalar  $(\cdot, \cdot)$  pe  $\mathbb{R}^k$  este o aplicație scalară de  $2 \cdot k$  variabile.

**2.1.3 Definiție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ ;  $\forall x \in A, f(x) \in \mathbb{R}^l$  deci  $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$  unde  $f_1, \dots, f_m : A \rightarrow \mathbb{R}$  sînt funcții scalare. Funcțiile  $f_1, \dots, f_m$  se numesc **funcțiile de coordonate** ale lui  $f$ . Dacă  $e_1, \dots, e_m$  este baza canonică în  $\mathbb{R}^l$  ( $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ , unde cifra 1 este plasată pe locul  $i$ ) atunci,  $\forall x \in \mathbb{R}^k, \forall i \in \{1, \dots, m\}, f_i(x) = (f(x), e_i)$  sau, scris funcțional,  $f_i = (f, e_i)$ .

Vom mai scrie  $f = (f_1, \dots, f_m)$  pentru a nota că  $f_1, \dots, f_m$  sînt funcțiile scalare de coordonate ale funcției  $f$ .

## Operații cu funcții

Fie  $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $t \in \mathbb{R}$ ; definim atunci funcțiile sumă, produs cu scalar și produs scalar în felul următor:

- $f + g : A \rightarrow \mathbb{R}^l, (f + g)(x) = f(x) + g(x), \forall x \in A$ ;
- $t \cdot f : A \rightarrow \mathbb{R}^l, (t \cdot f)(x) = t \cdot f(x), \forall x \in A$ ;
- $(f, g) : A \rightarrow \mathbb{R}, (f, g)(x) = (f(x), g(x)), \forall x \in A$ .

Primele două sînt funcții vectoriale iar ultima este funcție scalară.

Dacă  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l, f = (f_1, \dots, f_m)$  iar  $g : B \subseteq \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^p, g = (g_1, \dots, g_p)$  și dacă este îndeplinită condiția de compunere  $f(A) \subseteq B$  atunci putem defini funcția compusă:

•  $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}^p, (g \circ f)(x) = g(f(x)), \forall x \in A$ . Funcția  $g \circ f$  se reprezintă prin funcțiile sale de coordonate prin:

$$g \circ f = (g_1(f_1, \dots, f_m), \dots, g_p(f_1, \dots, f_m)).$$

## 2.2 Limite de funcții

În cele ce urmează vom defini noțiunea de limită a unei funcții de mai multe variabile într-un punct de acumulare a mulțimii de definiție.

**2.2.1 Definiție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $a \in A'$  (a punct de acumulare pentru  $A$ ); spunem că elementul  $L \in \mathbb{R}^l$  este **limita** funcției  $f$  în punctul  $a$  dacă pentru orice șir  $(x^n) \subseteq A \setminus \{a\}, x^n \xrightarrow{\mathbb{R}^k} a, f(x^n) \xrightarrow{\mathbb{R}^l} L$ .

Vom nota această situație cu  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ .

Vom spune că o funcție  $f$  are limită într-un punct de acumulare  $a \in A'$  dacă există  $L \in \mathbb{R}^l$  a.î.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ .

**2.2.2 Observație.** Ca și în cazul funcțiilor de o variabilă reală apare restricția  $x^n \neq a, \forall k \in \mathbb{N}$ ; această precauție se datorează următoarei situații: este posibil să avem  $a \in A$  și  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$ . Dacă nu am folosi restricția menționată, printre șirurile  $(x^n) \subseteq A$  cu  $x^n \rightarrow a$  ar putea figura și șirul constant  $x^n = a, \forall k \in \mathbb{N}$  iar pentru acest șir  $f(x^n) \rightarrow f(a)$  !

Ca și în cazul convergenței șirurilor, existența limitei unei funcții vectoriale se reduce la existența limitelor funcțiilor sale scalare de coordonate.

**2.2.3 Teoremă.** Fie  $f = (f_1, \dots, f_m) : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l, a \in A'$  și  $L = (L_1, \dots, L_m) \in \mathbb{R}^l$ ; funcția vectorială  $f$  are limita  $L$  în  $a$  dacă și numai dacă,  $\forall i \in \{1, \dots, m\}$ , funcția scalară  $f_i$  are limita  $L_i$  în  $a$ .

Demonstrația este o consecință imediată a definiției și a teoremei 1.3.13.

**2.2.4 Propoziție.** Fie  $f : (\alpha_1, \alpha_2) \times (\beta_1, \beta_2) \rightarrow \mathbb{R}, a \in (\alpha_1, \alpha_2), b \in (\beta_1, \beta_2)$ . Presupunem că sînt îndeplinite condițiile:

- 1).  $\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = l$ ,
  - 2).  $\forall x \in (\alpha_1, \alpha_2), \exists \lim_{y \rightarrow b} f(x, y) = g(x)$ ,
  - 3).  $\forall y \in (\beta_1, \beta_2), \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = h(y)$ .
- Atunci  $\exists \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$  și  $\exists \lim_{y \rightarrow b} h(y) = l$ .

**Demonstrație.** Într-adevăr, condițiile 2). și 3). definesc funcțiile scalare  $g : (\alpha_1, \alpha_2) \rightarrow \mathbb{R}$  și  $h : (\beta_1, \beta_2) \rightarrow \mathbb{R}$ .

Din 1).,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  a.i.  $\forall (x, y) \in (\alpha_1, \alpha_2) \times (\beta_1, \beta_2) \setminus \{(a, b)\}$  cu  $|x - a| < \delta$  și  $|y - b| < \delta$  rezultă  $|f(x, y) - l| < \frac{\varepsilon}{2}$ ; alegem  $\delta$  destul de mic pentru ca  $(a - \delta, a + \delta) \subseteq (\alpha_1, \alpha_2)$  și  $(b - \delta, b + \delta) \subseteq (\beta_1, \beta_2)$ .

Fie  $x \in (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$  arbitrar, dar momentan fixat; deoarece  $g(x) = \lim_{y \rightarrow b} f(x, y)$ ,  $\exists \delta_x > 0$  a.i.  $\forall y \in (b - \delta_x, b + \delta_x)$  cu  $y \neq x$ ,  $|f(x, y) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ ; evident putem alege  $\delta_x < \delta$ .

Fie un  $y \in (b - \delta_x, b + \delta_x) \subseteq (b - \delta, b + \delta)$  cu  $y \neq x$ ; cum  $x \in (a - \delta, a + \delta)$  și  $(x, y) \neq (a, b)$ ,  $|f(x, y) - l| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Atunci  $|g(x) - l| \leq |g(x) - f(x, y)| + |f(x, y) - l| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ .

Rezultă că există  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$ . Similar se arată că  $\lim_{y \rightarrow b} h(y) = l$ . ■

**2.2.5 Definiție.** Limitele  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left[ \lim_{y \rightarrow b} f(x, y) \right]$  și  $\lim_{y \rightarrow b} h(y) = \lim_{y \rightarrow b} \left[ \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \right]$  se numesc **limite iterate** ale funcției  $f$  în punctul  $(a, b)$ .

**2.2.6 Observație.** Dacă limitele iterate ale unei funcții într-un punct de acumulare a mulțimii sale de definiție există și nu sînt egale, funcția nu poate avea limită în acel punct. Este însă posibil ca limitele iterate să existe, să fie egale, și totuși funcția să nu aibă limită. Să se studieze în acest sens exemplul următor.

Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & , (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Să se arate că  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right] = 0 = \lim_{y \rightarrow 0} \left[ \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right]$  dar funcția nu are limită în  $(0, 0)$ .

## Capitolul 2

# Funcții de mai multe variabile

### 2.2 Limite de funcții

Următorul rezultat este o caracterizare de tip  $\varepsilon - \delta$  pentru limita unei funcții.

**2.2.7 Teoremă.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ ,  $a \in A'$  și  $L \in \mathbb{R}^l$ ;  
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  dacă și numai dacă

$$(\varepsilon - \delta) \quad \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ a.î. } \forall x \in A \setminus \{a\}, \|x - a\| < \delta, \|f(x) - L\| < \varepsilon.$$

**Demonstrație.** ( $\implies$ ): Presupunem că  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  și totuși condiția  $(\varepsilon - \delta)$  nu are loc; atunci există  $\varepsilon > 0$  a.î.  $\forall k \in \mathbb{N}^*, \exists x^n \in A \setminus \{a\}$  cu  $\|x^n - a\| < \frac{1}{k}$  și  $\|f(x^n) - L\| \geq \varepsilon$ . Rezultă că  $(x^n) \subseteq A \setminus \{a\}$ ,  $x^n \rightarrow a$  și totuși  $f(x^n) \not\rightarrow L$  ceea ce contrazice ipoteza.

( $\impliedby$ ): Presupunem că este îndeplinită condiția  $(\varepsilon - \delta)$  și fie  $(x^n) \subseteq A \setminus \{a\}$ ,  $x^n \rightarrow a$ ;  $\forall \varepsilon > 0$  fie  $\delta > 0$  numărul a cărui existență este asigurată de condiția  $(\varepsilon - \delta)$ . Deoarece  $x^n \rightarrow a$ ,  $\exists k_0 \in \mathbb{N}$  a.î.  $\forall k \geq k_0, \|x^n - a\| < \delta$ . Rezultă atunci că  $\|f(x^n) - L\| < \varepsilon$  ceea ce arată că  $f(x^n) \rightarrow L$ . ■

**2.2.8 Observație.** Teorema precedentă poate fi reformulată astfel:  
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff$  pentru orice sferă  $S(L, \varepsilon) \subseteq \mathbb{R}^l$  există o sferă  $S(a, \delta) \subseteq \mathbb{R}^k$  așa fel încât, oricare ar fi  $x \in A \cap S(a, \delta) \setminus \{a\}$ ,  $f(x) \in S(L, \varepsilon)$ .

Putem formula o condiție echivalentă în limbajul vecinătăților.

**2.2.9 Propoziție.**  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \forall V \in \mathcal{V}(L), \exists U \in \mathcal{V}(a)$  a.î.  $\forall x \in A \cap U \setminus \{a\}, f(x) \in V$ .

Putem acum prezenta o condiție de existență a limitei unei funcții într-un punct de acumulare a mulțimii sale de definiție.

**2.2.10 Teoremă** (teorema lui Cauchy). *O funcție  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  admite limită într-un punct de acumulare  $a \in A'$  dacă și numai dacă*

(C)

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in A \setminus \{a\}, \|x - a\| < \delta, \|y - a\| < \delta, \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

**Demonstrație.** Necesitatea. Presupunem că funcția  $f$  are limită în  $a$ ; deci există  $L \in \mathbb{R}^l$  a.î.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ . Utilizând condiția  $(\varepsilon - \delta)$  din teorema 2.1.7,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  a.î.  $\forall x, y \in A \setminus \{a\}, \|x - a\| < \delta, \|y - a\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - L\| < \frac{\varepsilon}{2}, \|f(y) - L\| < \frac{\varepsilon}{2}$  de unde  $\|f(x) - f(y)\| < \varepsilon$ .

① Suficiența.

a). Presupunem condiția (C) îndeplinită și fie  $(x^n) \in A \setminus \{a\}, x^n \rightarrow a$ ; atunci  $\exists k_0 \in \mathbb{N}$  a.î.  $\forall k, l \geq k_0, \|x^k - a\| < \delta, \|x^l - a\| < \delta$ . Rezultă că  $\|f(x^k) - f(x^l)\| < \varepsilon$ . Atunci  $(f(x^n))$  este un șir Cauchy în spațiul  $\mathbb{R}^l$  și deci este convergent (teorema 1.3.20).

b). Fie acum două șiruri  $(x^n), (y^n) \subseteq A \setminus \{a\}$  convergente la  $a$ ; construim atunci șirul  $(z^n) \subseteq A \setminus \{a\}$  punând  $z^{2k} = x^k$  și  $z^{2k+1} = y^k, \forall k \in \mathbb{N}$ . Șirul  $(z^n)$  este convergent la  $a$  și atunci, procedînd în același fel ca în a).,  $(f(z^n))$  este convergent în  $\mathbb{R}^l$ . Atunci există un element  $L \in \mathbb{R}^l$  a.î.  $f(x^n) \rightarrow L$  și  $f(y^n) \rightarrow L$ .

Deci pentru orice șir din  $(x^n) \subseteq A \setminus \{a\}$  convergent la  $a$  șirul  $(f(x^n))$  converge la același element  $L \in \mathbb{R}^l$ ; atunci  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ . ■

## Operații cu funcții cu limită

Demonstrația propoziției următoare se bazează pe definiția limitei unei funcții într-un punct de acumulare și pe operațiile corespunzătoare cu limite de șiruri.

**2.2.11 Propoziție.** *Fie  $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $a \in A'$  a.î.  $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}^l$  și  $\exists \lim_{x \rightarrow a} g(x) \in \mathbb{R}^l$ ; atunci:*

- 1).  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x),$
- 2).  $\lim_{x \rightarrow a} (t \cdot f(x)) = t \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x),$
- 3).  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x), g(x)) = \left( \lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x) \right),$
- 4).  $\lim_{x \rightarrow a} \|f(x)\| = \|\lim_{x \rightarrow a} f(x)\|.$   
Dacă  $m = 1, f(A) \subseteq \mathbb{R}^*$  și  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0,$
- 5).  $\lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{1}{f(x)} \right) = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}.$

**2.2.12 Propoziție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l, a \in A', g : B \subseteq \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^p, b \in B'$  și  $f(A) \subseteq B.$

Dacă există  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b,$  există  $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = l$  și  $f(x) \neq b, \forall x \in A \setminus \{a\}$  atunci există  $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = l.$

**Demonstrație.** Fie  $(x^k) \subseteq A \setminus \{a\}, x^k \rightarrow a;$  deoarece  $f(A) \subseteq B,$  șirul  $(y^k) = (f(x^k)) \subseteq B.$  Cum  $f(x) \neq b, \forall x \in A \setminus \{a\}, y^k \neq b, \forall k \in \mathbb{N}.$  În sfârșit din  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$  rezultă că  $y^k \rightarrow b.$  Dar  $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = l$  și deci  $(g \circ f)(x^k) = g(y^k) \rightarrow l.$  Rezultă atunci că există  $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = l.$  ■

## Semnul unei funcții cu limită

**2.2.13 Propoziție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  și  $a \in A';$  dacă există  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \neq 0$  atunci  $\exists \delta > 0$  a.î.  $\forall x \in S(a, \delta) \cap A \setminus \{a\}, f(x) \cdot L > 0$  (funcția  $f$  are același semn cu limita sa  $L$  pe o vecinătate a punctului  $a$ ).

**Demonstrație.** Deoarece  $L \neq 0, \varepsilon = \frac{|L|}{2} > 0;$  utilizând condiția  $(\varepsilon - \delta)$  din teorema 2.2.4,  $\exists \delta > 0$  a.î.  $\forall x \in A \setminus \{a\}$  cu  $\|x - a\| < \delta, |f(x) - L| < \varepsilon.$  Rezultă deci că  $\forall x \in S(a, \delta) \cap A \setminus \{a\},$

$$L - \frac{|L|}{2} < f(x) < L + \frac{|L|}{2}.$$

Dacă  $L > 0$  rezultă că  $f(x) > \frac{L}{2} > 0$  iar dacă  $L < 0, f(x) < \frac{L}{2} < 0.$  În ambele cazuri  $f(x)$  are același semn cu  $L$  și deci  $f(x) \cdot L > 0.$  ■

## 2.3 Funcții continue

**2.3.1 Definiție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $a \in A;$  spunem că funcția  $f$  este continuă în  $a$  dacă  $\forall (x^n) \subseteq A, x^n \rightarrow a \implies f(x^n) \rightarrow f(a).$

Funcția  $f$  este **continuă pe mulțimea  $A$**  dacă este continuă în toate punctele mulțimii  $A$ .

Dacă  $f$  nu este continuă într-un punct  $b \in A$  spunem că  $f$  este **discontinuu în  $b$** .

**Exemplu.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & , (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \forall (x^n, y^n) \rightarrow (a, b), f(x^n, y^n) \rightarrow f(a, b)$ . Astfel  $f$  este continuă în  $(a, b)$ .

Dacă  $(a, b) = (0, 0)$  și considerăm un șir  $(x^n) \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\}, x^n \rightarrow 0$  și un  $t \in \mathbb{R}$  atunci șirul  $(x^n, t \cdot x^n) \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  converge la  $(0, 0)$  iar  $f(x^n, t \cdot x^n) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$ . Rezultă că limita lui  $(f(x^n, y^n))$  depinde de  $t$  și deci  $f$  este discontinuu în  $(0, 0)$ .

Remarcăm din definiție că problema continuității se pune în toate punctele mulțimii de definiție a unei funcții: și în punctele de acumulare și în cele izolate; în propoziția următoare stabilim legătura între existența limitei și continuitatea unei funcții într-un punct.

**2.3.2 Propoziție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  și fie  $a \in A$ ;

1). Dacă  $a$  este punct izolat pentru  $A$  atunci  $f$  este continuă în  $a$  (fără nici-o altă condiție).

2). Dacă  $a \in A \cap A'$  atunci condiția necesară și suficientă ca  $f$  să fie continuă în  $a$  este ca să existe  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

**Demonstrație.** 1). Dacă  $a$  este punct izolat al mulțimii  $A$  atunci există o vecinătate  $V \in \mathcal{V}(a)$  a.î.  $V \cap A = \{a\}$ . Atunci,  $\forall (x^n) \subseteq A$  cu  $x^n \rightarrow a$ ,  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$  a.î.  $\forall n \geq n_0, x^n = a$ . Rezultă că șirul  $(f(x^n))$  este constant (cu excepția unui număr finit de termeni) și deci converge la constanta  $f(a)$ .

2). Fie acum  $a \in A \cap A'$ . Presupunem întâi că  $f$  este continuă în  $a$  și că  $(x^n) \subseteq A \setminus \{a\}, x^n \rightarrow a$ ; din definiția continuității,  $f(x^n) \rightarrow f(a)$ . Rezultă că există  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

Să presupunem acum că există  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ . Dacă  $(x^n) \subseteq A$  este un șir arbitrar cu  $x^n \rightarrow a$  atunci putem avea următoarele trei situații:

a). Șirul  $(x^n)$  are toți termenii (cu excepția eventuală a unui număr finit dintre ei) diferiți de  $a$ ; din definiția limitei rezultă atunci că  $f(x^n) \rightarrow f(a)$ .



b). Șirul  $(x^n)$  are toți termenii (cu excepția eventuală a unui număr finit dintre ei) egali cu  $a$ ; atunci șirul  $(f(x^n))$  este un șir constant și deci converge la valoarea constantei  $f(a)$ .

c). Șirul  $(x^n)$  are o infinitate de termeni egali cu  $a$  și o infinitate de termeni diferiți de  $a$ ; fie  $N, M \subseteq \mathbb{N}, N \cup M = \mathbb{N}$  două mulțimi infinite a.î.  $x^n \neq a, \forall n \in N$  și  $x^n = a, \forall n \in M$ . Atunci  $(x^n)_{n \in N} \subseteq A \setminus \{a\}$  este un subșir al șirului  $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$  și deci este convergent la  $a$ ; cum  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ,  $(f(x^n))_{n \in N} \rightarrow f(a)$ . Șirul  $(x^n)_{n \in M}$  este constant și deci și  $(f(x^n))_{n \in M}$  este constant egal cu  $f(a)$  și astfel converge la  $f(a)$ . Rezultă că  $(f(x^n))_{n \in \mathbb{N}}$  are două subșiruri convergente la aceeași limită  $f(a)$ , subșiruri ce epuizează șirul; atunci  $(f(x^n))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f(a)$ .

În toate cele trei situații posibile  $f(x^n) \rightarrow f(a)$  și astfel  $f$  este continuă în  $a$ . ■

Propoziția următoare reduce studiul continuității unei funcții vectoriale la studiul continuității funcțiilor scalare de coordonate.

**2.3.3 Propoziție.** Fie  $f = (f_1, \dots, f_l) : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $a \in A$ ;  $f$  este continuă în  $a$  dacă și numai dacă,  $\forall i \in \{1, \dots, l\}$ ,  $f_i$  este continuă în  $a$ .

**Demonstrație.** Demonstrația este o consecință a definiției continuității și a caracterizării convergenței șirurilor dată în teorema 1.3.13.

Teorema următoare dă caracterizări pentru continuitate asemănătoare celor date pentru limita unei funcții în teorema 2.2.4 și în propoziția 2.2.6.

**2.3.4 Teoremă.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $a \in A$ ; următoarele afirmații sînt echivalente:

- 1).  $f$  este continuă în  $a$ ;
- 2).  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  a.î.  $\forall x \in A$  cu  $\|x - a\| < \delta, \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon$ ;
- ③).  $\forall V \in \mathcal{V}(f(a)), \exists U \in \mathcal{V}(a)$  a.î.  $\forall x \in A \cap U, f(x) \in V$ .

**Demonstrație.** (1). $\iff$  2).): Dacă  $a \in A \cap A'$  afirmația este o consecință a punctului 2) din propoziția 2.3.2 și a teoremei 2.2.4 în care se dă caracterizarea  $(\varepsilon - \delta)$  pentru limita unei funcții într-un punct de acumulare.

Dacă  $a$  este punct izolat  $f$  este automat continuă; în mod asemănător condiția 2) este automat îndeplinită deoarece există o vecinătate și deci o sferă  $S(a, \delta)$  a.î.  $S(a, \delta) \cap A = \{a\}$  și pentru orice  $x \in S(a, \delta) \cap A, \|f(x) - f(a)\| = \|f(a) - f(a)\| = 0 < \varepsilon, \forall \varepsilon > 0$ .

Condiția 2). poate fi reformulată astfel:  $\forall S(f(a), \varepsilon), \exists S(a, \delta)$  a.î.  $\forall x \in S(a, \delta) \cap A, f(x) \in S(f(a), \varepsilon)$ .

Ținând cont că familia sferelor cu centrul într-un punct formează un sistem fundamental de vecinătăți pentru acel punct, 3). este echivalent cu 2). ■

## Operații cu funcții continue

Următoarea propoziție este o consecință a propozițiilor 2.2.11 și 2.3.2.

**2.3.5 Propoziție.** Fie  $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $a \in A$  a.î.  $f$  și  $g$  sînt continue pe  $A$ ; atunci:

- 1).  $f + g : A \rightarrow \mathbb{R}^l$  este continuă pe  $A$ ,
- 2).  $t \cdot f : A \rightarrow \mathbb{R}^l$  este continuă pe  $A$ ,  $\forall t \in \mathbb{R}$ ,
- 3).  $(f, g) : A \rightarrow \mathbb{R}^l$  este continuă pe  $A$ ,
- 4).  $\|f\| : A \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă pe  $A$ .  
Dacă  $l = 1$ , și  $f(A) \subseteq \mathbb{R}^*$
- 5).  $\frac{1}{f} : A \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă pe  $A$ .

Propoziția 2.2.12 are următoarea replică pentru continuitate:

**2.3.6 Propoziție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ ,  $a \in A$ ,  $g : B \subseteq \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $b \in B$  și  $f(A) \subseteq B$ .

Dacă  $f$  este continuă în  $a$  și  $g$  este continuă în  $b$  atunci  $g \circ f$  este continuă în  $a$ .

Dacă  $f$  este continuă pe  $A$  și  $g$  este continuă pe  $B$  atunci  $g \circ f$  este continuă pe  $A$ .

Demonstrația este o consecință imediată a definiției continuității.

În sfîrșit, avem pentru continuitate un rezultat asemănător propoziției 2.2.13 în care se precizează semnul local al unei funcții cu limită; demonstrația utilizează propoziția 2.2.13 și din nou propoziția 2.3.2.

**2.3.7 Propoziție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in A$  a.î.  $f$  este continuă în  $a$ ; dacă  $f(a) \neq 0$  atunci  $\exists \delta > 0$  a.î.  $\forall x \in S(a, \delta) \cap A$ ,  $f(x) \cdot f(a) > 0$  (funcția  $f$  are același semn cu  $f(a)$  pe o vecinătate a punctului  $a$ ).

## Proprietăți ale funcțiilor continue pe mulțimi

În această secțiune vom prezenta cîteva rezultate deosebit de importante privind comportarea funcțiilor continue pe diverse tipuri de mulțimi.

**2.3.8 Teoremă.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ ; dacă mulțimea  $A$  este compactă în  $\mathbb{R}^k$  și funcția  $f$  este continuă pe  $A$  atunci mulțimea valorilor lui  $f$ ,  $f(A)$ , este mulțime compactă în  $\mathbb{R}^l$ .

**Demonstrație.** Pentru a demonstra că mulțimea  $f(A)$  este compactă în  $\mathbb{R}^l$  trebuie să arătăm că  $f(A)$  este mărginită și închisă (vezi teorema de caracterizare 1.3.33).

Să presupunem prin reducere la absurd că  $f(A)$  nu este mărginită; rezultă că putem alege,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , un element  $x^n \in A$  a.i.  $\|f(x^n)\| \geq n$ . Șirul  $(x^n) \subseteq A$  admite un subșir  $(x^{l_n})$  convergent la un element  $x \in A$  ( $A$  este mulțime compactă). Deoarece  $f$  este continuă pe  $A$ ,  $f(x^{l_n}) \rightarrow f(x)$  și deci șirul  $(f^{l_n})$  este mărginit (propoziția 1.3.14). Aceasta intră în contradicție cu  $\|f(x^{l_n})\| \geq l_n \geq n, \forall n \in \mathbb{N}$ . Deci ipoteza că  $f(A)$  este nemărginită conduce la o contradicție.

Să arătăm acum că  $f(A)$  este mulțime închisă. Vom utiliza pentru aceasta caracterizarea mulțimilor închise prezentată în teorema 1.3.28, punctul 3). Fie deci  $(y^n) \subseteq f(A)$  un șir convergent la un element  $y \in \mathbb{R}^l$ ; atunci există șirul  $(x^n) \subseteq A$  a.i.,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $y^n = f(x^n)$ . Deoarece  $A$  este compactă șirul  $(x^n)$  admite un subșir  $(x^{l_n})$  convergent la un element  $x \in A$ . Cum funcția  $f$  este continuă în  $x$ ,  $\lim_n f(x^{l_n}) = f(x)$ . Pe de altă parte,  $f(x^{l_n}) = y^{l_n} \rightarrow y$ . Unicitatea limitei unui șir convergent ne conduce la concluzia  $y = f(x) \in f(A)$ . Deci orice șir convergent din  $f(A)$  are limita în  $f(A)$  ceea ce înseamnă că  $f(A)$  este mulțime închisă.

$f(A)$  fiind mulțime mărginită și închisă este mulțime compactă în  $\mathbb{R}^l$ . ■

Un corolar al acestei teoreme utilizează faptul că mulțimile compacte din  $\mathbb{R}$  admit un cel mai mic și un cel mai mare element (își ating marginile).

**2.3.9 Corolar** (teorema lui Weierstrass). Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ ; dacă  $A$  este compactă în  $\mathbb{R}^k$  și  $f$  este continuă pe  $A$  atunci există două elemente  $x_m, x_M \in A$  a.i.  $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M), \forall x \in A$ .

**2.3.10 Observație.** În cazul  $l > 1$  concluzia teoremei lui Weierstrass nu mai are loc; într-adevăr, așa cum se poate ușor verifica, aplicația identică  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}^2$  este continuă peste tot. Sfera închisă  $T((0,0),1) \subseteq \mathbb{R}^2$  (discul închis cu centrul în origine și de rază 1 din plan) este o mulțime compactă (mărginită și închisă) dar mulțimea  $f(T((0,0),1)) = T((0,0),1)$  nu are un cel mai mic și nici un cel mai mare element ( $\inf T((0,0),1) = (-1,-1)$  iar  $\sup T((0,0),1) = (1,1)$ ).

Ca și funcțiile reale de o variabilă reală, funcțiile vectoriale de mai multe variabile continue pe mulțimi compacte sînt continue uniform. Să precizăm sensul acestei continuități uniforme.

**2.3.11 Definiție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ ; spunem că funcția  $f$  este uniform continuă pe  $A$  dacă,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  a.î.  $\forall x, y \in A$  cu  $\|x - y\| < \delta$ , rezultă că  $\|f(x) - f(y)\| < \varepsilon$ .

**2.3.12 Observație.** Să observăm că dacă o funcție  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  este uniform continuă pe  $A$ :

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0$  a.î.  $\forall x \in A, \forall y \in A$  cu  $\|x - y\| < \delta, \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon \implies$   
 $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in A, \exists \delta_{\varepsilon, x} > 0$  a.î.  $\forall y \in A$  cu  $\|x - y\| < \delta, \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon \iff$   
 $\forall x \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_{\varepsilon, x} > 0$  a.î.  $\forall y \in A$  cu  $\|x - y\| < \delta, \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon \iff$   
 $\forall x \in A, f$  este funcție continuă în  $x \iff$   
 $f$  este continuă pe mulțimea  $A$ .

Așa cum se observă din cele de mai sus, alegerea lui  $\delta$  este, în cazul funcțiilor uniform continue, independentă de  $x \in A$  și deci, pentru astfel de funcții, continuitatea în fiecare punct  $x$  se scrie în mod uniform (cu același  $\delta$  dependent doar de  $\varepsilon$ ); de aici și denumirea de uniformă continuitate.

Rezultă că orice funcție uniform continuă pe o mulțime este continuă pe acea mulțime; reciproca acestei afirmații nu este adevărată nici pentru funcțiile reale de o variabilă reală și cu atît mai mult ea nu va funcționa pentru funcțiile de mai multe variabile.

Un exemplu remarcabil de funcții uniform continue îl constituie funcțiile lipschitziene.

**2.3.13 Definiție.** O funcție  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  este funcție **lipschitziană pe  $A$**  (sau verifică condiția lui Lipschitz pe mulțimea  $A$ ) dacă există un număr  $L > 0$  (constantă lui Lipschitz) a.î.  $\|f(x) - f(y)\| \leq L \cdot \|x - y\|, \forall x, y \in A$ .

**2.3.14 Propoziție.** Orice lipschitziană pe o mulțime este uniform continuă pe acea mulțime.

**Demonstrație.** Într-adevăr, fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  o funcție lipschitziană pe  $A$  cu constanta Lipschitz  $L$ ; atunci  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{L} > 0$  a.î.  $\forall x, y \in A$  cu  $\|x - y\| < \delta, \|f(x) - f(y)\| \leq L \cdot \|x - y\| < L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon$ . ■

În propoziția următoare dăm o caracterizare secvențială (cu ajutorul șirurilor) a uniforme continuități a unei aplicații.

**2.3.15 Propoziție.** *O funcție  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  este uniform continuă pe  $A$  dacă și numai dacă oricare ar fi două șiruri  $(x^n), (y^n) \subseteq A$  cu  $x^n - y^n \rightarrow 0_{\mathbb{R}^k}$ ,  $f(x^n) - f(y^n) \rightarrow 0_{\mathbb{R}^l}$  (primul 0 este elementul nul din  $\mathbb{R}^k$  iar al doilea 0 elementul nul din spațiul  $\mathbb{R}^l$ ).*

**Demonstrație.** ( $\Rightarrow$ ): Presupunem că  $f$  este uniform continuă și fie două șiruri  $(x^n), (y^n) \subseteq A$  cu  $x^n - y^n \rightarrow 0_{\mathbb{R}^k}$ ;  $\forall \varepsilon > 0$ , din condiția de uniformă continuitate,  $\exists \delta > 0$  a.î.  $\forall x, y \in A$  cu  $\|x - y\| < \delta$ ,  $\|f(x) - f(y)\| < \varepsilon$ . Deoarece  $x^n - y^n \rightarrow 0_{\mathbb{R}^k}$ ,  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$  a.î.  $\forall n \geq n_0$ ,  $\|x^n - y^n\| < \delta$  și atunci  $\|f(x^n) - f(y^n)\| < \varepsilon$ ,  $\forall n \geq n_0$ . Aceasta antrenează  $f(x^n) - f(y^n) \rightarrow 0_{\mathbb{R}^l}$ .

( $\Leftarrow$ ) Să presupunem că, deși condiția secvențială este îndeplinită,  $f$  nu este uniform continuă. Atunci există un număr  $\varepsilon_0 > 0$  a.î.,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  și deci pentru  $\delta = \frac{1}{n}$  există  $x^n, y^n \in A$  cu  $\|x^n - y^n\| < \frac{1}{n}$  și totuși  $\|f(x^n) - f(y^n)\| \geq \varepsilon_0$ . Rezultă atunci că  $x^n - y^n \rightarrow 0_{\mathbb{R}^k}$  și  $f(x^n) - f(y^n) \not\rightarrow 0_{\mathbb{R}^l}$  ceea ce contrazice ipoteza făcută. ■

Am observat că orice funcție uniform continuă este continuă; în situația în care mulțimea de definiție a funcției este compactă, are loc și reciproca acestei condiții.

**2.3.16 Teoremă** (teorema lui Cantor). *Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime compactă și  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^l$  o funcție continuă pe  $A$ ; atunci  $f$  este uniform continuă pe  $A$ .*

Ⓢ **Demonstrație.** Să presupunem prin reducere la absurd că  $f$  este continuă pe mulțimea compactă  $A$  dar că nu este uniform continuă; utilizând caracterizarea secvențială din propoziția precedentă, există două șiruri  $(x^n), (y^n) \subseteq A$  cu  $x^n - y^n \rightarrow 0_{\mathbb{R}^k}$  dar  $f(x^n) - f(y^n) \not\rightarrow 0_{\mathbb{R}^l}$ . Atunci  $\exists \varepsilon_0 > 0$  și există o mulțime infinită  $N \subseteq \mathbb{N}$  a.î.  $\|f(x^n) - f(y^n)\| \geq \varepsilon_0, \forall n \in N$ .

Deoarece  $A$  este compactă, există o mulțime infinită  $N_1 \subseteq N$  a.î. subșirul  $(x^n)_{n \in N_1}$  să fie convergent la un element  $x \in A$  și există o submulțime infinită  $N_2 \subseteq N_1$  a.î. subșirul  $(y^n)_{n \in N_2}$  să convergă la un element  $y \in A$ ; atunci  $(x^n)_{n \in N_2}$  converge la  $x$  (este un subșir al șirului  $(x^n)_{n \in N_1}$ ).

Deoarece  $(x^n - y^n)_{n \in N_2} \rightarrow 0_{\mathbb{R}^k}$  rezultă  $x = y$ . Funcția  $f$  este continuă pe  $A$  și deci este continuă în  $x$ ; cum  $(x^n)_{n \in N_2} \rightarrow x$  și  $(y^n)_{n \in N_2} \rightarrow x$ ,  $(f(x^n) - f(y^n))_{n \in N_2} \rightarrow f(x) - f(x) = 0_{\mathbb{R}^l}$ . Dar aceasta vine în contradicție cu condiția  $\|f(x^n) - f(y^n)\| \geq \varepsilon_0, \forall n \in N_2$ . Contradicția obținută arată că ipoteza că  $f$  nu este uniform continuă este falsă. ■

# Capitolul 2

## Funcții de mai multe variabile

### 2.3 Funcții continue

#### Proprietăți ale funcțiilor continue pe mulțimi

O altă proprietate remarcabilă a funcțiilor continue este aceea de a conserva conexiunea. Vom introduce întâi noțiunea de mulțime conexă prin arce în  $\mathbb{R}^k$ .

**2.3.17 Definiție.** Fie  $x, y \in \mathbb{R}^k$ ; o funcție  $\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^k$ , continuă pe segmentul  $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ , cu proprietatea că  $\psi(a) = x$  și  $\psi(b) = y$  se numește **drum** sau **arc** ce unește  $x$  cu  $y$ . Mulțimea  $G_\psi = \psi([a, b]) = \{\psi(t) \in \mathbb{R}^k : t \in [a, b]\}$  se numește **graficul** arcului  $\psi$ .

**2.3.18 Observație.** În definiția unui drum, intervalul  $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$  poate fi înlocuit cu oricare alt interval închis. De exemplu, dacă  $\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^k$  este un drum ce unește punctele  $x$  și  $y$  din  $\mathbb{R}^k$  și definim  $\varphi : [0, 1] \rightarrow [a, b]$  prin  $\varphi(t) = (1 - t) \cdot a + t \cdot b, \forall t \in [0, 1]$  atunci  $\psi \circ \varphi$  este de asemenea un drum ce unește  $x$  cu  $y$  și care are același grafic ( $G_\psi = G_{\psi \circ \varphi}$ ).

Mai exact, vom spune că două drumuri  $\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^k$  și  $\theta : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^k$  sînt **echivalente** dacă există o funcție surjectivă și strict crescătoare  $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$  a.î.  $\theta = \psi \circ \varphi$  (să observăm că o asemenea funcție  $\varphi$  este o bijecție continuă și cu inversă continuă, deci este un homeomorfism). Este clar că dacă  $\psi$  unește punctul  $x$  cu  $y$  atunci  $\theta$  are aceeași proprietate. Relația introdusă între drumuri este o relație de echivalență (reflexivă, simetrică și tranzitivă). O clasă de echivalență în raport cu această relație se numește

**curbă** în  $\mathbb{R}^k$ . Astfel în definiția de mai sus se poate înlocui drumul  $\psi$  cu orice alt drum echivalent.

**2.3.19 Exemple.** 1).  $\psi : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \psi(t) = (\cos t, \sin t), \forall t \in [0, \pi]$ , este un arc plan ce unește punctul  $(1, 0)$  cu  $(-1, 0)$ . Graficul acestui drum este un semicerc plasat pe cercul cu centrul în  $(0, 0)$  și de rază 1.

2).  $\forall x, y \in \mathbb{R}^k, \psi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^k, \psi(t) = (1 - t) \cdot x + t \cdot y, \forall t \in [0, 1]$ , este un drum ce unește punctele  $x$  și  $y$ ; graficul său este segmentul  $[x, y]$ .

**2.3.20 Definiție.** O mulțime  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  se numește mulțime **conexă prin arce** dacă pentru orice două puncte  $x, y \in A$  există un drum  $\psi$  care unește  $x$  cu  $y$  a.î.  $G_\psi \subseteq A$ .

O mulțime deschisă și conexă prin arce se numește **domeniu**.

$A \subseteq \mathbb{R}^k$  se numește mulțime **convexă** dacă pentru orice două puncte  $x, y \in A$  segmentul  $[x, y] \subseteq A$ .

**2.3.21 Observații.** 1). Intuitiv o mulțime conexă prin arce este o mulțime formată “dintr-o singură bucată”.

2). Așa cum am observat în exemplul de mai sus, un segment  $[x, y] \subseteq \mathbb{R}^k$  este graficul unui drum  $\psi$ ; rezultă de aici că orice mulțime convexă este conexă prin arce.

3). Singurele mulțimi conexe prin arce în  $\mathbb{R}$  sînt intervalele. Într-adevăr, fie  $A \subseteq \mathbb{R}$  conexă prin arce și fie  $x, y$  două puncte arbitrare în  $A$  și  $z$  a.î.  $x < z < y$ . Deoarece  $A$  este conexă prin arce există un drum, deci o funcție continuă  $\psi : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  care unește  $x$  cu  $y$  și al cărei grafic,  $G_\psi$ , este inclus în  $A$ . Atunci  $\psi(a) = x < z < y = \psi(b)$  și, deoarece aplicația  $\psi$  are proprietatea lui Darboux, există  $c \in [a, b]$  a.î.  $\psi(c) = z$ . Însă, cum  $\psi(c) \in G_\psi \subseteq A$ , rezultă că  $z \in A$ . Astfel, mulțimea  $A$ , odată cu două puncte, conține și orice punct aflat între ele; deci  $A$  este interval.

Deoarece intervalele sînt mulțimi convexe rezultă că, în  $\mathbb{R}$ , mulțimile conexe prin arce coincid cu mulțimile convexe.

În general însă, pentru  $k > 1$ , reciproca nu este adevărată după cum putem ușor remarca din exemplele următoare.

**2.3.22 Exemple.** 1). Orice sferă deschisă sau închisă din  $\mathbb{R}^k$  este mulțime convexă (și deci conexă prin arce). Într-adevăr, fie  $S(x, r) \subseteq \mathbb{R}^k$  o sferă deschisă cu centrul în  $x$  și de rază  $r$ ;  $\forall u, v \in S(x, r)$  vom demonstra că  $[u, v] \subseteq S(x, r)$ .  $\forall w \in [u, v], \exists t \in [0, 1]$  a.î.  $w = (1 - t) \cdot u + t \cdot v$ . Atunci

$\|w-x\| = \|((1-t)\cdot u+t\cdot v)-((1-t)\cdot x+t\cdot x)\| = \|(1-t)\cdot(u-x)+t\cdot(v-x)\| \leq (1-t)\cdot\|u-x\|+t\cdot\|v-x\| < (1-t)\cdot r+t\cdot r = r$  de unde  $w \in S(x, r)$ .

2). Un cerc din  $\mathbb{R}^2$  este o mulțime conexă prin arce care nu este convexă. Într-adevăr, fie  $C(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : \|y-x\| = r\}$ ;  $\forall u, v \in C(x, r), \exists \alpha, \beta \in [0, 2\pi)$  a.î.  $u = x + (r \cos \alpha, r \sin \alpha)$  și  $v = x + (r \cos \beta, r \sin \beta)$ ; vom presupune că  $\alpha \leq \beta$ . Atunci aplicația  $\psi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^2$  definită prin  $\psi(t) = x + (r \cos t, r \sin t), \forall t \in [\alpha, \beta]$  este un drum ce unește  $u$  și  $v$  și  $G_\psi \subseteq C(x, r)$ . Este evident că, pentru  $u \neq v, [u, v] \not\subseteq C(x, r)$ .

3). Graficul oricărui drum din  $\mathbb{R}^k$  este o mulțime conexă prin arce. Într-adevăr, fie  $\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^k$  un drum în  $\mathbb{R}^k$  și fie  $G_\psi = \{\psi(t) : t \in [a, b]\}$  graficul acestui drum. Oricare ar fi  $x, y \in G_\psi, \exists c, d \in [a, b]$  a.î.  $x = \psi(c), y = \psi(d)$ . Atunci aplicația  $\phi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^k$  definită prin  $\phi(t) = \psi(t), \forall t \in [c, d]$  (restricția funcției  $\psi$  la intervalul  $[c, d]$ ) este un drum care unește  $x$  cu  $y$  și al cărui grafic este conținut în  $G_\psi$ .

4). Fie  $x$  și  $y$  două puncte distincte din  $\mathbb{R}^k$ ; mulțimea formată din cele două puncte  $A = \{x, y\}$  nu este conexă prin arce.

5). Vom prezenta acum o mulțime ceva mai complicată care nu este conexă prin arce.

Fie  $A = \{(x, \sin \frac{1}{x}) : x \in (0, 1]\} \subseteq \mathbb{R}^2$ . Atunci  $A$  este conexă prin arce dar  $\bar{A}$  nu este conexă prin arce.

Fie  $u = (x, \sin \frac{1}{x}), v = (y, \sin \frac{1}{y}) \in A$  și să presupunem că  $x < y$ ; atunci aplicația  $\psi : [x, y] \rightarrow A$  definită prin  $\psi(t) = (t, \sin \frac{1}{t}), \forall t \in [x, y]$ , este continuă, are graficul în  $A$  și  $\psi(x) = u, \psi(y) = v$  deci este un arc ce unește  $u$  cu  $v$ . Rezultă că  $A$  este conexă prin arce.

Să notăm cu  $B = \{0\} \times [-1, 1]$ ; se poate ușor constata că  $\bar{A} = B \cup A$ . Să presupunem că  $\bar{A}$  este conexă prin arce; atunci există o funcție continuă  $\varphi : [0, 1] \rightarrow \bar{A}$  a.î.  $\varphi(0) = (0, 1)$  și  $\varphi(1) = (1, \sin 1)$  (un arc ce unește punctele  $(0, 1)$  și  $(1, \sin 1)$  din mulțimea  $\bar{A}$ ). Fie  $u : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, v : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  funcțiile de coordonate ale lui  $\varphi$ ; atunci  $u$  și  $v$  sînt continue pe  $[0, 1]$ . Mulțimea  $B$  este închisă în  $\mathbb{R}^2$  și atunci  $\varphi^{-1}(B)$  este închisă și mărginită în  $[0, 1]$  deci este compactă; fie atunci  $t_0 = \sup \varphi^{-1}(B) \in \varphi^{-1}(B)$ . Rezultă că  $u(t_0) = 0, v(t_0) \in [-1, 1]$  și  $\forall t > t_0, \varphi(t) \in A$  de unde  $u(t) > 0$  și  $v(t) = \sin \left( \frac{1}{u(t)} \right)$ .

Considerăm un șir arbitrar  $(x_n) \downarrow 0$ ; atunci, cum  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u(t_0 + \frac{1}{n}) > 0$ , există un șir strict crescător  $(k_n) \uparrow +\infty$  a.î.  $0 = u(t_0) < x_{k_n} < u(t_0 + \frac{1}{n})$ . Funcția  $u$  fiind continuă are proprietatea lui Darboux și deci există,  $\forall n \in \mathbb{N}^*, t_n \in (t_0, t_0 + \frac{1}{n})$  a.î.  $u(t_n) = x_{k_n}$ . Atunci  $t_n \rightarrow t_0$  și deci  $u(t_n) \rightarrow$



$u(t_0) = 0$  iar  $v(t_n) \rightarrow v(t_0)$ . Dacă alegem de exemplu  $x_n = \frac{1}{n\pi}$  atunci  $v(t_n) = \sin\left(\frac{1}{u(t_n)}\right) = \sin(k_n\pi) = 0$  și deci  $v(t_0) = 0$ ; pe de altă parte dacă  $x_n = \frac{2}{(4n+1)\pi}$  atunci  $v(t_n) = \sin\left(\frac{(4k_n+1)\pi}{2}\right) = 1$  de unde  $v(t_0) = 1$  ceea ce reprezintă o contradicție. Deci  $\bar{A}$  nu este conexă prin arce.

**2.3.23 Teoremă.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ ; dacă mulțimea  $A$  este conexă prin arce și funcția  $f$  este continuă pe  $A$  atunci mulțimea valorilor lui  $f$ ,  $f(A)$ , este conexă prin arce în  $\mathbb{R}^l$ .

**Demonstrație.** Fie  $u, v \in f(A)$  două puncte arbitrare și fie  $x, y \in A$  a.î.  $u = f(x)$  și  $v = f(y)$ . Deoarece  $A$  este conexă prin arce, există o funcție continuă  $\psi : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^k$  a.î.  $G_\psi \subseteq A$  și  $\psi(a) = x, \psi(b) = y$ . Atunci  $f \circ \psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^l$  este funcție continuă (compunerea a două funcții continue este funcție continuă - propoziția 2.3.6),  $u = f(x) = f(\psi(a)) = (f \circ \psi)(a), v = f(y) = f(\psi(b)) = (f \circ \psi)(b)$  și  $G_{f \circ \psi} = (f \circ \psi)([a, b]) = f(\psi([a, b])) \subseteq f(A)$ ; deci  $f \circ \psi$  este un arc ce unește  $u$  cu  $v$  și a cărui grafic este inclus în  $f(A)$ . ■

**2.3.24 Observație.** Trebuie să remarcăm aici că imaginea printr-o funcție continuă a unei mulțimi convexe este mulțime conexă prin arce dar nu este, în mod obligatoriu, convexă. De exemplu, la 2.3.19 punctul 1), funcția  $\psi$  duce mulțimea convexă  $[0, \pi]$  în semicercul  $\psi([0, \pi])$  care nu este mulțime convexă. În general un drum este o funcție continuă pe o mulțime convexă (un interval închis în  $\mathbb{R}$ ) a cărui imagine, graficul drumului, nu este în mod obligatoriu convexă. Conexiunea prin arce este o proprietate topologică (legată de structura topologică a spațiului) pe cînd convexitatea este legată de structura algebrică de spațiu liniar. În cazul particular al mulțimii  $\mathbb{R}$  mulțimile conexe prin arce coincid cu mulțimile convexe ale lui  $\mathbb{R}$  care sînt intervalele.

Vom prezenta în finalul acestei secțiuni o aplicație interesantă a teoremei de mai sus.

Fie  $C = C(x, r) = \{y : \|y - x\| = r\} \subseteq \mathbb{R}^2$  un cerc cu centrul în  $x$  și de rază  $r$  din  $\mathbb{R}^2$ ; aplicația  $s : C \rightarrow C$  definită prin  $s(y) = 2x - y, \forall y \in C$  asociază fiecărui punct de pe cercul  $C$  punctul său diametral opus; este evident că  $s$  este funcție continuă și că  $s \circ s$  este aplicația identică pe  $C$ .

**2.3.25 (Ⓢ) Teoremă.** Dacă  $f : C \rightarrow \mathbb{R}$  este o funcție reală continuă atunci există  $y \in C$  a.î.  $f(y) = f(s(y))$  (deci există două puncte diametral opuse în care  $f$  ia aceeași valoare).

**Demonstrație.** Definim funcția  $g : C \rightarrow \mathbb{R}$  prin  $g(y) = f(y) - f(s(y)), \forall y \in C$ ; se observă că  $g$  este o funcție continuă. Cum  $C$  este mulțime conexă prin arce (exemplul 2.3.22, punctul 2)), teorema 2.3.23 ne asigură că  $g(C)$  este conexă prin arce în  $\mathbb{R}$  deci este convexă și deci este un interval. Fie acum  $y^0 \in C$ ; dacă  $g(y^0) = 0$  rezultă că  $f(y^0) = f(s(y^0))$ . Dacă  $g(y^0) \neq 0$ ,  $g(s(y^0)) = f(s(y^0)) - f(s(s(y^0))) = f(s(y^0)) - f(y^0) = -g(y^0)$ ; atunci  $g(y^0)$  și  $-g(y^0)$  aparțin intervalului  $g(C)$  și au semne contrare. Rezultă că  $0 \in g(C)$  și deci există  $z^0 \in C$  a.î.  $f(z^0) = f(s(z^0))$ . ■

**2.3.26 ⓘ Observații.** 1). Dacă imaginăm un meridian (sau o paralelă) a globului pământesc ca un cerc și considerăm funcția care dă temperatura la un moment dat în fiecare punct al acestui meridian atunci este plauzibilă ipoteza că această funcție este continuă. Consecința acestei ipoteze este că există în fiecare moment pe fiecare meridian (ca și pe fiecare paralelă) două puncte diametral opuse cu aceeași temperatură.

2). Rezultatul stabilit în teorema precedentă este o variantă simplă a teoremei lui Borsuk-Ulam care afirmă că pentru orice funcție continuă definită pe  $C(x, r) = \{y : \|y - x\| = r\} \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  există două puncte diametral opuse în care  $f$  ia aceeași valoare.

## 2.4 Aplicații liniare

În această secțiune vom studia o clasă particulară de aplicații continue, aplicațiile liniare.

**2.4.1 Definiție.** O funcție  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  se numește **aplicație liniară** sau **operator liniar** dacă conservă structura de spațiu liniar, adică dacă verifică condițiile:

- 1).  $T(x + y) = T(x) + T(y), \forall x, y \in \mathbb{R}^k$ ,
- 2).  $T(t \cdot x) = t \cdot T(x), \forall x \in \mathbb{R}^k, \forall t \in \mathbb{R}$ .

**2.4.2 Lemă.** Fie  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l, T = (T_1, \dots, T_l)$  o aplicație liniară; atunci:

- 1).  $T(0) = 0$ ;
- 2).  $T(x - y) = T(x) - T(y), \forall x, y \in \mathbb{R}^k$ ;
- 3).  $\forall j \in \{1, \dots, l\}$ , funcțiile de coordonate  $T_j : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  sînt aplicații liniare.

**Demonstrație.** 1).  $T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0)$  de unde  $T(0) = 0$ .

2).  $T(x - y) = T(x + (-1) \cdot y) = T(x) + T((-1) \cdot y) = T(x) + (-1)T(y) = T(x) - T(y)$ .

3).  $\forall x, y \in \mathbb{R}^k$ , relația  $T(x + y) = T(x) + T(y)$  scrisă pe componente conduce la  $(T_1(x + y), \dots, T_l(x + y)) = (T_1(x) + T_1(y), \dots, T_l(x) + T_l(y))$  de unde rezultă că  $T_j(x + y) = T_j(x) + T_j(y), \forall j \in \{1, \dots, l\}$ . La fel se arată că  $T_j(tx) = tT_j(x), \forall j \in \{1, \dots, l\}$ . ■

Fie  $\{e_1, \dots, e_k\}$  baza canonică a spațiului  $\mathbb{R}^k$  și  $\{f_1, \dots, f_l\}$  baza canonică a lui  $\mathbb{R}^l$ ; reamintim că  $\forall i \in \{1, \dots, k\}, e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$  unde cifra 1 apare pe locul  $i$  iar,  $\forall j \in \{1, \dots, l\}, f_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$  unde cifra 1 apare pe locul  $j$ .

Dacă  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  este o aplicație liniară atunci,  $\forall x = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$ ,

$$(1) \quad T(x) = T\left(\sum_{i=1}^k x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^k x_i T(e_i).$$

$\forall i \in \{1, \dots, k\}, T(e_i) \in \mathbb{R}^l$  și deci  $T(e_i) = \sum_{j=1}^l a_j^i \cdot f_j$ .

Vom nota cu  $A_T = \begin{pmatrix} a_1^1 & a_1^2 & \cdots & a_1^k \\ a_2^1 & a_2^2 & \cdots & a_2^k \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_l^1 & a_l^2 & \cdots & a_l^k \end{pmatrix}_{l \times k}$  matricea cu  $l$  linii și  $k$  coloane

formată cu elementele  $a_j^i$  și o vom numi **matricea asociată** aplicației liniare  $T$ ; observăm că această matrice nu depinde decât de aplicația  $T$ .

Revenind în relația (1) obținem

$$(2) \quad T(x) = \sum_{i=1}^k \left( \sum_{j=1}^l a_j^i x_i f_j \right) = \sum_{j=1}^l \left( \sum_{i=1}^k a_j^i x_i \right) f_j.$$

Să notăm cu  $T_1, \dots, T_l$  funcțiile scalare de coordonate ale aplicației  $T$ ; atunci din (2),

$$(3) \quad T_j(x) = \sum_{i=1}^k a_j^i \cdot x_i, \forall j \in \{1, \dots, l\},$$

de unde, dacă scriem elementele din  $\mathbb{R}^k$  și pe cele din  $\mathbb{R}^l$  uni-colonar, obținem:

$$T(x) = \begin{pmatrix} T_1(x) \\ T_2(x) \\ \vdots \\ T_l(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^k a_1^i x_i \\ \sum_{i=1}^k a_2^i x_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^k a_l^i x_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^1 & a_1^2 & \dots & a_1^k \\ a_2^1 & a_2^2 & \dots & a_2^k \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_l^1 & a_l^2 & \dots & a_l^k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix}$$

și deci ajungem la formula de reprezentare a aplicației liniare  $T$ :

$$T(x) = A_T \cdot x, \forall x \in \mathbb{R}^k.$$

Reciproc, orice aplicație  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  definită prin  $T(x) = A \cdot x, \forall x \in \mathbb{R}^k$ , unde  $A$  este o matrice de tip  $l \times k$ , este o aplicație liniară.

**2.4.3 Exemple.** 1). Orice aplicație liniară  $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  este de forma  $T(x) = a \cdot x, \forall x \in \mathbb{R}$  unde  $a \in \mathbb{R}$  este un număr fixat. Matricea asociată lui  $T$  este o matrice de tip  $1 \times 1$  avînd ca singur element pe  $a$ .

2). Aplicațiile liniare scalare  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  sînt de forma  $T(x) = a_1 \cdot x_1 + \dots + a_k \cdot x_k, \forall x = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$  unde  $A_T = (a_1, \dots, a_k)_{1 \times k}$  este matricea asociată. Observăm că în cazul particular  $k = 2$ ,  $T^{-1}(0_{\mathbb{R}}) = \{x = (x_1, x_2) : a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 = 0\}$  este o dreaptă care trece prin origine. În cazul  $k = 3$ ,  $T^{-1}(0_{\mathbb{R}})$  reprezintă un plan care trece prin  $(0, 0, 0)$ .

**2.4.4 Propoziție.** Orice aplicație liniară  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  este funcție lipschitziană deci este funcție uniform continuă și deci continuă.

**Demonstrație.** Vom utiliza notațiile din relația (1) de mai sus;  $\forall x \in \mathbb{R}^k$ ,

$$\|T(x)\| = \left\| \sum_{i=1}^k x_i \cdot T(e_i) \right\| \leq \sum_{i=1}^k \|T(e_i)\| \cdot |x_i| \leq \sum_{i=1}^k \|T(e_i)\| \cdot \|x\|.$$

Dacă notăm  $L = \sum_{i=1}^k \|T(e_i)\|$  obținem  $\|T(x)\| \leq L \cdot \|x\|, \forall x \in \mathbb{R}^k$ . Atunci,  $\forall x, y \in \mathbb{R}^k, \|T(x) - T(y)\| = \|T(x - y)\| \leq L \cdot \|x - y\|$ , ceea ce arată că  $T$  este funcție lipschitziană. ■

În teorema următoare prezentăm comportarea aplicațiilor liniare față de operațiile uzuale.

**2.4.5 Teoremă.** 1). Fie  $T, S : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  două operații liniare; atunci:

a).  $T + S$  este operație liniară și  $A_{T+S} = A_T + A_S$ .

b).  $t \cdot T$  este operație liniară,  $\forall t \in \mathbb{R}$  și  $A_{t \cdot T} = t \cdot A_T$ .

2). Fie  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $S : \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^m$  două operații liniare; atunci  $S \circ T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$  este operație liniară și  $A_{S \circ T} = A_S \cdot A_T$ .

**Demonstrație.** 1). Este ușor de verificat că adunarea și înmulțirea cu scalari păstrează liniaritatea operațiilor. Să ne ocupăm de matricile asociate.

$\forall x \in \mathbb{R}^k$ ,  $(T + S)(x) = T(x) + S(x) = A_T \cdot x + A_S \cdot x = (A_T + A_S) \cdot x$ ; pe de altă parte,  $(T + S)(x) = A_{T+S} \cdot x$  de unde  $A_{T+S} = A_T + A_S$ .

La fel demonstrăm și b).

2). Se arată imediat că  $S \circ T$  este operație liniară de la  $\mathbb{R}^k$  la  $\mathbb{R}^m$ .

$\forall x \in \mathbb{R}^k$ ,  $(S \circ T)(x) = S(T(x)) = A_S \cdot T(x) = A_S \cdot A_T \cdot x$ ; pe de altă parte,  $(S \circ T)(x) = A_{S \circ T} \cdot x$  de unde rezultă că  $A_{S \circ T} = A_S \cdot A_T$ . ■

## Capitolul 3

# Diferențiabilitatea funcțiilor de mai multe variabile

### 3.1 Derivata după o direcție

Reamintim că dacă  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  și  $a \in \overset{\circ}{A}$  atunci  $f$  este derivabilă în  $a$  dacă există și este finită limita:  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t) - f(a)}{t}$ ; această limită se notează cu  $f'(a)$  și se numește derivata funcției  $f$  în punctul interior  $a$ .


În cazul funcțiilor de mai multe variabile această definiție nu poate fi adaptată fără anumite precauții.

Să ne imaginăm interiorul unei camere ca pe o mulțime din  $\mathbb{R}^3$  în care avem plasată o sursă de căldură. Ne punem problema studierii variației temperaturii în punctele interioare. Este evident că apropierea de sursa de căldură va fi marcată de o creștere a temperaturii iar depărtarea de această sursă va însemna o scădere a temperaturii deci că variația de temperatură depinde de direcția pe care ne deplasăm.

Să observăm întâi că, dacă  $a \in \mathbb{R}^k$  și  $u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ , atunci dreapta care trece prin  $a$  și are direcția  $u$  este dreapta care trece prin punctele  $a$  și  $a + u$ ; această dreaptă este deci  $(a, a + u) = \{(1 - t) \cdot a + t \cdot (a + u) : t \in \mathbb{R}\} = \{a + t \cdot u : t \in \mathbb{R}\}$ .

Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  și  $a \in \overset{\circ}{A}$ ; oricare ar fi un vector  $u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ , cum  $a \in \overset{\circ}{A}$ ,  $\exists \delta > 0$  a.î.  $a + tu \in A, \forall t \in \mathbb{R}$  cu  $|t| < \delta$ . Într-adevăr fie  $r > 0$  a.î.  $S(a, r) \subseteq A$  și fie  $t$  a.î.  $\|a + tu - a\| = |t| \cdot \|u\| < r$ ; atunci numărul  $\delta = \frac{r}{\|u\|}$

verifică cerința de mai sus.



Putem deci defini funcția  $g : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(t) = f(a + tu)$ ,  $\forall t \in (-\delta, \delta)$ ; funcția  $g$  este restricția funcției  $f$  la un segment de pe dreapta ce trece prin  $a$  și are direcția  $u$ . Vom spune că  $f$  are derivată în  $a$  după direcția  $u$  dacă  $g$  are derivată în origine. Mai precis:

**3.1.1 Definiție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \overset{\circ}{A}$  și  $u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ ; dacă există  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t} \in \mathbb{R}$  atunci spunem că funcția  $f$  are **derivată în  $a$  pe direcția  $u$**  și notăm

$$\frac{df}{du}(a) = f'_u(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t} \in \mathbb{R}.$$

**3.1.2 Observații.** (i).  $\frac{df}{du}(a) = g'(0)$ .

(ii). Fie  $v = \frac{1}{\|u\|} \cdot u$  versorul asociat direcției  $u$ ; atunci

$$\frac{df}{du}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + \frac{t}{\|u\|} \cdot u) - f(a)}{\frac{t}{\|u\|}} = \|u\| \cdot \frac{df}{dv}(a).$$

**3.1.3 Exemple.** 1). Fie  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  un operator liniar;  $\forall a \in \mathbb{R}^k, \forall u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ ,

$$\frac{dT}{du}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{T(a + tu) - T(a)}{t} = T(u).$$

Rezultă că un operator liniar are derivată în orice punct și după orice direcție. Această derivată nu depinde de punctul  $a$  ci numai de direcția  $u$ .

2). Fie  $\|\cdot\| : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  aplicația normă pe  $\mathbb{R}^k$  și fie  $a, u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ ;


$$\begin{aligned} \frac{d\|\cdot\|}{du}(a) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|a + tu\| - \|a\|}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(a + tu, a + tu)^{\frac{1}{2}} - (a, a)^{\frac{1}{2}}}{t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(a + tu, a + tu) - (a, a)}{t(\|a + tu\| + \|a\|)} = \frac{(a, u)}{\|a\|}. \end{aligned}$$

Pentru  $a = 0$ ,  $\frac{d\|\cdot\|}{du}(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|}{t}$  și această limită nu există. Deci  $\|\cdot\|$  nu are derivată în origine pe nici-o direcție.

Vom prezenta acum o interpretare geometrică a derivatei după o direcție.

Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a = (a_1, a_2) \in A$  și  $u = (u_1, u_2)$  un versor din  $\mathbb{R}^2$ ; presupunem că funcția  $f$  are derivata  $\frac{df}{du}(a)$  în  $a$  după direcția  $u$ .

În planul  $x_1 0 x_2$  considerăm semidreapta  $(d) : x = a + tu, t > 0$  care trece prin punctul  $a$  și are direcția  $u$ . Fie  $M = (a_1, a_2, 0)$  originea acestei semidrepte și fie  $N = (a_1 + tu_1, a_2 + tu_2, 0)$  un punct pe această semidreaptă. Așa cum se observă din figura următoare, punctele  $P = (a_1, a_2, f(a_1, a_2))$  și  $R = (a_1 + tu_1, a_2 + tu_2, f(a_1 + tu_1, a_2 + tu_2))$  aparțin graficului funcției  $f$ ,  $G_f = \{(x_1, x_2, f(x_1, x_2)) : (x_1, x_2) \in A\}$ .



Fie  $(\pi) : \frac{x_1 - a_1}{u_1} = \frac{x_2 - a_2}{u_2}$  planul care conține semidreapta  $(d)$  și este perpendicular pe planul  $x_1 0 x_2$ . Planul  $(\pi)$ , care în figura noastră conține punctele  $P$  și  $R$ , decupează în pînza  $G_f$  arcul de curbă  $PR = G_f \cap (\pi)$ . Fie  $Q = (a_1 + tu_1, a_2 + tu_2, f(a_1 + tu_1, a_2 + tu_2))$  proiecția lui  $P$  pe dreapta  $NR$ . În triunghiul  $PQR$ , dreptunghic în  $Q$ , vom nota cu  $\alpha_t$  măsura unghiului  $\widehat{QPR}$ ; atunci  $\operatorname{tg} \alpha_t = \frac{RQ}{PQ} = \frac{f(a_1 + tu_1, a_2 + tu_2) - f(a_1, a_2)}{t} = \frac{f(a + tu) - f(a)}{t}$ .



Trecînd la limită după  $t \rightarrow 0$ , rezultă că există  $\lim_{t \rightarrow 0} \alpha_t = \alpha_0$  și că, la limită, coarda  $PR$  tinde la tangenta în  $P$  la arcul de curbă  $G_f \cap (\pi)$ , tangentă care în figura de mai sus este notată cu  $PS$ . Atunci  $\operatorname{tg} \alpha_0 = \frac{df}{du}(a)$ .

Deci, în cazul particular în care  $u$  este un versor, derivata unei funcții într-un punct după direcția  $u$  este tangenta trigonometrică a unghiului făcut de tangenta geometrică în punct la curba  $G_f \cap (\pi)$  cu planul  $x_1 0 x_2$ .

Ecuția acestei tangente la curbă este ecuația parametrică a unei drepte ce trece prin punctul  $P$  și are direcția dată de vectorul  $(tu_1, tu_2, SQ) = (tu_1, tu_2, PQ \cdot \operatorname{tg} \alpha_0) = \left(tu_1, tu_2, t \cdot \frac{df}{du}(a)\right) \in \mathbb{R}^3$  ceea ce este echivalent cu direcția dată de vectorul  $v = \left(u_1, u_2, \frac{df}{du}(a)\right)$ .

Atunci ecuația parametrică a tangentei în  $P$  la arcul de curbă decupat de  $(\pi)$  în  $G_f$  va fi:

$$x = (a, f(a)) + t \left(u, \frac{df}{du}(a)\right) = (a_1, a_2, f(a_1, a_2)) + t \left(u_1, u_2, \frac{df}{du}(a)\right)$$

sau, dacă scriem pe coordonate:

$$(T_u) \quad \begin{cases} x_1 = a_1 + tu_1 \\ x_2 = a_2 + tu_2 \\ x_3 = f(a_1, a_2) + t \frac{df}{du}(a) \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

**3.1.4 Propoziție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \overset{\circ}{A}$  așa fel încît  $f$  are derivată în  $a$  după orice direcție  $u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ ; atunci operatorul  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  definit prin

$$T(u) = \begin{cases} \frac{df}{du}(a) & , \text{dacă } u \neq 0, \\ 0 & , \text{dacă } u = 0, \end{cases}$$

este un operator omogen, adică satisface proprietatea:

$$T(\lambda \cdot u) = \lambda \cdot T(u), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^k.$$

**Demonstrație.** Dacă  $\lambda = 0$  sau dacă  $u = 0$  condiția de omogenitate este evident îndeplinită.

Fie acum  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ ,

$$T(\lambda \cdot u) = \frac{df}{d(\lambda \cdot u)}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\lambda \cdot u) - f(a)}{t} =$$

$$= \lambda \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\lambda \cdot u) - f(a)}{t\lambda} = \lambda \cdot T(u).$$

**3.1.5 Observație.** În general, așa cum vom remarca în exemplul 3.1.6, acest operator nu este aditiv și astfel nu este un operator liniar. Acest fapt se poate interpreta geometric în cazul  $k = 2$  în felul următor: deși există tangente la curbele  $G_f \cap \pi_u$  în  $(a, f(a))$  pe toate direcțiile  $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  aceste tangente nu sînt plasate într-un același plan și deci nu există un plan tangent la graficul lui  $f$  în punctul  $(a, f(a))$ .

Cazul particular în care operatorul  $T$  este liniar (caz în care vom avea și un plan tangent la graficul funcției) joacă un rol deosebit în teoria diferențială a funcțiilor de mai multe variabile; acest caz va fi tratat în paragraful următor.

**3.1.6 Exemplu.** Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & , (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & , (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Dacă  $(x_k) \subseteq \mathbb{R}$  este un șir de numere reale strict pozitive convergent la 0 și  $\lambda > 0$ , șirul  $((x_k, \sqrt{\lambda x_k}))_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^2$  este convergent la  $(0, 0)$  iar  $f(x_k, \sqrt{\lambda x_k}) \rightarrow \frac{\lambda}{1 + \lambda^2}$ . Cum limita șirului valorilor depinde de parametru real  $\lambda$  rezultă că funcția  $f$  nu are limită în  $(0, 0)$  și deci nu este continuă în acest punct.

$$\begin{aligned} & \text{Pe de altă parte, } \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \frac{df}{d(u, v)}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t(u, v))}{t} = \\ & = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{tu \cdot t^2 v^2}{(t^2 u^2 + t^4 v^4)t} = \begin{cases} \frac{v^2}{u} & , u \neq 0, \\ 0 & , u = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Deci există derivata în origine a lui  $f$  pe orice direcție  $(u, v) \in \mathbb{R}^2$  fără ca  $f$  să fie continuă în  $(0, 0)$ .

Graficul funcției  $f$  are tangentă în  $(0, 0, 0)$  pe orice direcție  $(u, v) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ ; ecuațiile parametrice ale acesteia sînt:

$$\begin{cases} x = tu \\ y = tv \\ z = t \frac{v^2}{u} \end{cases}, t \in \mathbb{R}, \text{ dacă } u \neq 0 \text{ și } \begin{cases} x = tu \\ y = tv \\ z = 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R}, \text{ dacă } u = 0, v \neq 0.$$

Operatorul  $T$  nu este liniar; într-adevăr  $T((1, 0)) + T((0, 1)) = 0 \neq 1 = T((1, 1)) = T((1, 0) + (0, 1))$ . Evident că tangentele ale căror ecuații le-am scris mai sus nu sînt plasate în același plan.

**3.1.7 Teoremă** (teorema de medie). Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime deschisă și fie  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție care admite derivată în orice punct din  $A$  pe orice direcție. Oricare ar fi  $a, b \in A$  cu proprietatea că segmentul închis  $[a, b] \subseteq A$  există  $c \in [a, b]$  așa fel încît:

$$f(b) - f(a) = \frac{df}{d(b-a)}(c).$$

**Demonstrație.** Fie deci  $a, b \in A$  cu proprietatea că  $[a, b] \subseteq A$  și fie funcția reală de o variabilă reală  $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $g(t) = f(a + t(b-a))$ ,  $\forall t \in [0, 1]$ ; atunci  $g$  este derivabilă pe  $[0, 1]$ . Într-adevăr,  $x^0 = a + t_0(b-a) \in [a, b] \subseteq A$ ,  $\forall t_0 \in [0, 1]$ , și deci  $f$  are derivată în  $x^0$  pe direcția  $b-a$ . Atunci  $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{g(t) - g(t_0)}{t - t_0} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(a + t(b-a)) - f(a + t_0(b-a))}{t - t_0} =$   
 $= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(a + t_0(b-a) + (t - t_0)(b-a)) - f(a + t_0(b-a))}{t - t_0} =$   
 $= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + s(b-a)) - f(x^0)}{s} = \frac{df}{d(b-a)}(x^0)$ . Rezultă că  $g$  este derivabilă în orice punct  $t \in [0, 1]$  și  $g'(t) = \frac{df}{d(b-a)}(a + t(b-a))$ . Putem deci să aplicăm funcției  $g$  teorema creșterilor finite a lui Lagrange. Există atunci un punct  $\theta \in [0, 1]$  a.î.  $g(1) - g(0) = g'(\theta)$ . Fie  $c = a + \theta(b-a) \in [a, b]$ ; atunci, înlocuind în formula de mai sus pe  $g$ , obținem  $f(b) - f(a) = \frac{df}{d(b-a)}(c)$ . ■

**3.1.8 Corolar.** Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime deschisă și convexă; o funcție  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  care are derivata nulă în orice punct din  $A$  și pe orice direcție este constantă pe  $A$ .

**Demonstrație.** Într-adevăr,  $A$  fiind convexă, odată cu orice două puncte  $a, b \in A$ ,  $[a, b] \subseteq A$ ; rezultă din teorema precedentă că  $f(a) = f(b)$ . ■

Un rol important în studiul derivatelor unei funcții îl joacă derivatele după direcțiile particulare date de vectorii bazei canonice.

**3.1.9 Definiție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  și fie  $a \in A$ ;  $\forall i \in \{1, \dots, k\}$  fie  $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$  unde cifra 1 este plasată pe locul  $i$ . Dacă funcția  $f$  admite derivată în punctul  $a$  pe direcția  $e_i$  atunci aceasta se numește **derivata parțială** a funcției  $f$  în raport cu  $x_i$  și se notează:

$$\frac{df}{de_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = f'_{x_i}(a).$$

**3.1.10 Observații.** 1). Presupunem că  $a = (a_1, \dots, a_k) \in \mathring{A}$ ; atunci

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_k) - f(a_1, \dots, a_i, \dots, a_k)}{t} = \\ &= \lim_{x_i \rightarrow a_i} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_k) - f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_k)}{x_i - a_i}. \end{aligned}$$

Rezultă că derivata parțială în raport cu  $x_i$  se obține ca o derivată obișnuită a funcției  $f$  în care fixăm celelalte variabile și derivăm numai după  $x_i$ .

2). În cazul particular  $k = 2$  variabila curentă se notează cu  $(x, y)$  și atunci vom obține două derivate parțiale ale unei funcții:  $\frac{\partial f}{\partial x}$  și  $\frac{\partial f}{\partial y}$ .

În cazul  $k = 3$  avem trei derivate parțiale notate cu  $\frac{\partial f}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}$  și respectiv  $\frac{\partial f}{\partial z}$ .

**3.1.11 Definiție.** Să presupunem că  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  admite derivată parțială în raport cu o variabilă  $x_i$  în toate punctele interioare ale lui  $A$ ; dacă funcția  $\frac{\partial f}{\partial x_i} : \mathring{A} \rightarrow \mathbb{R}$  admite derivată parțială în raport cu variabila  $x_j$  în punctul  $a \in \mathring{A}$  atunci  $\frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$  se numește derivată parțială de ordin doi. Această derivată se numește mixtă dacă  $i \neq j$ . În cazul  $i = j$  ea se notează cu  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$ .

**3.1.12 Observații.** 1). Trebuie să atragem atenția asupra scrierii derivatele parțiale mixte  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ ; ordinea de la numitor  $\partial x_j \partial x_i$  înseamnă că prima derivare s-a făcut după  $x_i$  iar a doua după  $x_j$ . Este important de reținut că, în general, derivatele mixte nu sînt egale:  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ . Astfel o funcție de  $k$  variabile poate avea  $k^2$  derivate parțiale de ordin doi.

2). În cazul  $k = 2$  putem avea următoarele derivate parțiale de ordin doi:  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$  și  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ .

În cazul  $k = 3$  avem derivatele de ordin doi:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \text{ și } \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

Așa cum vom remarca în exemplul următor, o funcție care are derivată într-un punct după toate direcțiile nu este neapărat continuă.

## Capitolul 3

# Diferențiabilitatea funcțiilor de mai multe variabile

### 3.2 Diferențiala

Rezultă din exemplul 3.1.6 că noțiunea de derivată după o direcție nu este cel mai bun substitut multi-dimensional pentru derivatele funcțiilor reale de o variabilă. Vom introduce, ca și pentru funcții de o variabilă, noțiunea de funcție diferențiabilă de mai multe variabile.

**3.2.1 Definiție.** Funcția  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  este **diferențiabilă** în punctul  $a \in \overset{\circ}{A}$  dacă există un operator liniar  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  și o funcție  $\alpha : A \rightarrow \mathbb{R}$  continuă și nulă în  $a$  ( $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = \alpha(a) = 0$ ) a.î.

$$(D) \quad f(x) = f(a) + T(x - a) + \alpha(x) \cdot \|x - a\|, \forall x \in A.$$

Dacă  $f$  este diferențiabilă în  $a$  spunem că  $T$  este **diferențiala** funcției  $f$  în  $a$  și notăm aceasta cu  $df(a) = T$ .

**3.2.2 Observații.** 1). Condiția de diferențiabilitate este o condiție locală; astfel este suficient ca să existe operatorul liniar  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  și o funcție  $\alpha$  definită pe o vecinătate  $V \subseteq A$  a lui  $a$ , continuă și nulă în  $a$ , pentru care relația (D) să fie verificată. Într-adevăr, în această situație putem defini

$$\bar{\alpha} : A \rightarrow \mathbb{R} \text{ prin } \bar{\alpha}(x) = \begin{cases} \alpha(x) & , x \in V, \\ \frac{f(x) - f(a) - T(x - a)}{\|x - a\|} & , x \in A \setminus V \end{cases} \text{ așa fel}$$

încît relația (D) este verificată cu  $\bar{\alpha}$  pe toată mulțimea  $A$  și este evident că  $\bar{\alpha}$  este continuă și nulă în  $a$ .

2). Diferențiala unei funcții de mai multe variabile este un operator liniar, deci o funcție. Apelînd la reprezentarea operatorilor liniari de la  $\mathbb{R}^k$  la  $\mathbb{R}$  (vezi exemplul 2.4.3, 2).),  $\exists d = (d_1, \dots, d_k) \in \mathbb{R}^k$  a.î.,  $\forall h = (h_1, \dots, h_k) \in \mathbb{R}^k$ ,

$$df(a)(h) = T(h) = A_T \cdot h = (d_1, \dots, d_k) \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_k \end{pmatrix} = d_1 h_1 + \dots + d_k h_k = (d, h).$$

3). Dacă  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  este un operator liniar și  $a \in \mathbb{R}^k$  putem scrie:  $T(x) = T(a) + T(x - a) + 0 \cdot \|x - a\|, \forall x \in \mathbb{R}^k$ . Concluzia este că  $T$  este diferențiabil în toate punctele lui  $\mathbb{R}^k$  și diferențiala sa  $dfT(a) = T$  este aceeași în toate punctele  $a \in \mathbb{R}^k$ .

**3.2.3 Teoremă.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  și  $a = (a_1, \dots, a_k) \in \overset{\circ}{A}$ ; atunci următoarele afirmații sînt echivalente:

(i)  $f$  este diferențiabilă în  $a$ .

(ii)  $\exists d \in \mathbb{R}^k, \exists \beta : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  o funcție continuă și nulă în  $a$  a.î.:

$$f(x) = f(a) + (d, x - a) + (\beta(x), x - a), \forall x \in A.$$

**Demonstrație.**

(i)  $\implies$  (ii): Presupunem că  $f$  este diferențiabilă în  $a$  și fie  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  un operator liniar și  $\alpha : A \rightarrow \mathbb{R}$  continuă și nulă în  $a$  a.î.

$$(D) \quad f(x) = f(a) + T(x - a) + \alpha(x) \cdot \|x - a\|, \forall x \in A.$$

Atunci există  $d \in \mathbb{R}^k$  a.î.  $T(h) = (d, h), \forall h \in \mathbb{R}^k$  (vezi observația 3.2.2, 2).).

Fie  $\beta : A \rightarrow \mathbb{R}^k$  definită prin:

$$\beta(x) = \begin{cases} \frac{\alpha(x)}{\|x - a\|} \cdot (x - a) & , x \neq a \\ (0, \dots, 0) & , x = a \end{cases}, \forall x \in A.$$

Atunci  $\|\beta(x)\| = \frac{|\alpha(x)|}{\|x - a\|} \cdot \|x - a\| = |\alpha(x)| \rightarrow 0$ , deci  $\beta : A \rightarrow \mathbb{R}^k$  este o funcție continuă și nulă în  $a$ .

Deoarece  $(\beta(x), x - a) = \frac{\alpha(x)}{\|x - a\|} \cdot (x - a, x - a) = \alpha(x) \cdot \|x - a\|$ , atunci relația (D) ne conduce la (ii).

(ii)  $\implies$  (i): Din (ii) rezultă că putem construi operatorul liniar  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  definit prin  $T(h) = (d, h), \forall h \in \mathbb{R}^k$ .

Fie funcția  $\alpha : A \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$\alpha(x) = \begin{cases} \frac{1}{\|x-a\|} \cdot (\beta(x), x-a) & , x \neq a, \\ 0 & , x = a. \end{cases}$$

Remarcăm atunci că este verificată relația (D).

Folosind inegalitatea lui Cauchy (vezi ultima inegalitate din propoziția 1.1.18), obținem:

$$|\alpha(x)| \leq \frac{1}{\|x-a\|} \cdot \|\beta(x)\| \cdot \|x-a\|, \forall x \neq a$$

de unde rezultă că  $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$  și deci funcția  $f$  este diferențiabilă în  $a$ .

■

**3.2.4 Teoremă.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție diferențiabilă în  $a \in \overset{\circ}{A}$ ; atunci:

- 1).  $f$  este continuă în  $a$ .
- 2). Oricare ar fi  $u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$   $f$  are derivată în  $a$  după direcția  $u$  și  $\frac{df}{du}(a) = (df(a))(u)$ .

**Demonstrație.** Fie operatorul liniar  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  și funcția  $\alpha : A \rightarrow \mathbb{R}$  continuă și nulă în  $a$  a.î.

$$(D) \quad f(x) = f(a) + T(x-a) + \alpha(x) \cdot \|x-a\|, \forall x \in A.$$

1). Deoarece orice operator liniar este funcție lipschitziană, deci uniform continuă și deci continuă pe  $\mathbb{R}^k$  (propoziția 2.4.4), din relația (D) obținem:  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} T(x-a) + \lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) \cdot \|x-a\| = 0$ . Rezultă că  $f$  este continuă în  $a$ .

2). Oricare ar fi  $u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$  există  $\delta > 0$  a.î. oricare ar fi  $t \in \mathbb{R}$  cu  $|t| < \delta, a + tu \in A$ ; din relația (D) obținem atunci

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tu) - f(a)}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{T(tu) + \alpha(a+tu) \cdot \|tu\|}{t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left( T(u) + \frac{|t|}{t} \cdot \alpha(a+tu) \cdot \|u\| \right) = T(u). \end{aligned}$$

Deoarece  $T$  este diferențiala funcției  $f$  în  $a$  rezultă că  $\frac{df}{du}(a) = (df(a))(u)$ . ■

**3.2.5 Observație.** Funcția din exemplul 3.1.6 are derivată în origine după orice direcție  $(u, v) \in \mathbb{R}^2$  însă această derivată nu este funcție liniară de  $(u, v)$  și deci  $f$  nu este diferențiabilă în  $(0, 0)$ .

**3.2.6 Corolar.** Dacă  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  este diferențiabilă în  $a \in \overset{\circ}{A}$  atunci  $f$  are derivate parțiale în  $a$  în raport cu oricare variabilă  $x_i$  și

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = (df(a))(e_i), \forall i = 1, \dots, k.$$

**3.2.7 Observații.** 1). Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție diferențiabilă în  $a \in \overset{\circ}{A}$  și fie  $T = df(a)$ ; atunci  $\exists d = (d_1, \dots, d_k) \in \mathbb{R}^k$  a.î.  $T(h) = (d, h), \forall h \in \mathbb{R}^k$ . Rezultă că  $T(e_i) = (d, e_i) = d_i, \forall i = 1, \dots, k$ . Din corolarul precedent obținem că  $d_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a), \forall i = 1, \dots, k$ . Atunci matricea de reprezentare a operatorului liniar  $T$  este  $A_T = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \right)_{1 \times k}$ . Această matrice se mai notează cu  $\nabla f(a)$  și se numește **gradientul** lui  $f$  în  $a$ . Rezultă atunci că diferențiala lui  $f$  în  $a$  se reprezintă prin:

$$df(a)(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)h_k = (\nabla f(a), h), \forall h = (h_1, \dots, h_k) \in \mathbb{R}^k.$$

2). Dacă o funcție este diferențiabilă într-un punct atunci diferențiala ei este unică; într-adevăr, din observația precedentă, diferențiala este unic determinată de derivatele parțiale ale funcției.

3). Definim  $\forall i = 1, \dots, k$ , funcțiile  $f_i : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  prin  $f_i(x) = (x, e_i) = x_i, \forall x = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$ . Atunci fiecare  $f_i$  este un operator liniar și deci este diferențiabil în orice punct iar  $df_i(a) = f_i$  în orice punct  $a \in \mathbb{R}^k$  (vezi observația 3.2.2, 3).). Vom conveni să notăm  $df_i(a) = dx_i, \forall i = 1, \dots, k$  și atunci  $dx_i(h) = h_i, \forall i = 1, \dots, k$ .

Atunci diferențiala unei funcții  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  într-un punct interior al mulțimii  $A$  se va scrie:

$$df(a)(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)dx_1(h) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)dx_k(h), \forall h \in \mathbb{R}^k$$

sau, dacă o scriem funcțional,

$$df(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)dx_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)dx_k.$$



4). În teorema 3.2.4 am remarcat că o funcție  $f$  diferențiabilă într-un punct  $a$  interior mulțimii sale de definiție  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  admite derivată după orice direcție  $u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ . Utilizînd observațiile de mai sus putem scrie:

$$\frac{df}{du}(a) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) u_i = (\nabla f(a), u) = \|\nabla f(a)\| \cdot \|u\| \cdot \cos \theta$$

unde  $\theta$  este unghiul dintre vectorul gradient  $\nabla f(a)$  și vectorul direcție  $u \in \mathbb{R}^k$ .

Vom prezenta acum o interpretare geometrică a diferențialei unei funcții de două variabile.

Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  și  $a = (a_1, a_2) \in \overset{\circ}{A}$ ; presupunem că funcția  $f$  este diferențiabilă în  $a$ ; atunci după corolarul 3.2.4,  $f$  are derivată în  $a$  după orice versor  $u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  și  $\frac{df}{du}(a) = df(a)(u)$

Ca și atunci cînd am prezentat o interpretare geometrică a derivatei după o direcție, vom considera în planul  $x_1 0 x_2$  semidreapta  $(d) : x = a + tu, t > 0$  care trece prin punctul  $a$  și are direcția  $u$ .

Fie  $(\pi) : \frac{x_1 - a_1}{u_1} = \frac{x_2 - a_2}{u_2}$  planul care conține această semidreaptă și este perpendicular pe planul  $x_1 0 x_2$ . Planul  $(\pi)$  decupează în pînza  $G_f$  un arc de curbă care pleacă din punctul  $P = (a_1, a_2, f(a_1, a_2)) \in G_f$  și care este plasat pe  $G_f$ . Așa cum am observat, există tangenta la acest arc de curbă și are direcția dată de vectorul  $v = \left(u_1, u_2, \frac{df}{du}(a)\right)$ . Deoarece funcția este diferențiabilă în  $a$ ,  $\frac{df}{du}(a)$  variază liniar cu  $u$  (corolarul 3.2.4) și atunci direcțiile  $v$  se plasează pe un plan cînd vectorul  $u$  parcurge versorii lui  $\mathbb{R}^2$ .

Într-adevăr, în acest caz:  $v = \left(u_1, u_2, \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \cdot u_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \cdot u_2\right) =$   
 $= u_1 \cdot \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)\right) + u_2 \cdot \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)\right) + (1 - u_1 - u_2) \cdot (0, 0, 0)$ , adică  
 $v$  descrie un plan care trece prin origine și prin punctele  $\left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)\right)$  și  
 $\left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)\right)$ .

Dacă eliminăm parametrii  $u_1$  și  $u_2$  din ecuația parametrică a acestui plan obținem ecuația sa explicită

$$(\Delta) \quad \boxed{x_3 = df(a)(x_1, x_2) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \cdot x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \cdot x_2.}$$

Deoarece direcțiile tangentelor în  $P$  la arcele de curbă de pe graficul lui  $f$  (după toate direcțiile  $u$  posibile) sînt coplanare, aceste tangente sînt și ele coplanare și generează planul tangent la suprafața  $G_f$  în punctul  $P$ .

*Rezultă că dacă o funcție  $f$  este diferențiabilă într-un punct  $a$  atunci graficul său admite un plan tangent în punctul  $(a, f(a))$  și acesta este paralel cu planul  $(\Delta) : x_3 = df(a)(x_1, x_2)$ .*

Ecuația planului tangent în  $P$  se obține prin translația planului  $(\Delta)$  cu vectorul  $(a_1, a_2, f(a_1, a_2))$  ceea ce ne conduce la ecuațiile parametrice:

$$\begin{cases} x_1 = a_1 + u_1 \\ x_2 = a_2 + u_2 \\ x_3 = f(a_1, a_2) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \cdot u_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \cdot u_2 \end{cases}, u_1, u_2 \in \mathbb{R}$$

Dacă eliminăm parametrii obținem ecuația explicită a acestui plan tangent:

$$(T) \quad \boxed{x_3 - f(a_1, a_2) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \cdot (x_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \cdot (x_2 - a_2).}$$

Așa cum am observat, existența derivatelor parțiale ale unei funcții (chiar existența derivatelor după toate direcțiile) într-un punct nu antrenează diferențiabilitatea funcției. Putem totuși formula o condiție suficientă de diferențiabilitate în limbajul derivatelor parțiale.

**3.2.8 Teoremă** (criteriul de diferențiabilitate). *Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \overset{\circ}{A}$  și  $r > 0$  a.î. sfera deschisă  $S(a, r) \subseteq A$ . Dacă  $f$  admite derivate parțiale în raport cu toate variabilele în toate punctele sferei  $S(a, r)$  și acestea sînt continue în  $a$  atunci  $f$  este diferențiabilă în  $a$ .*

**Demonstrație.** Vom face demonstrația în cazul particular  $k = 2$ ; în cazul general demonstrația nu comportă decît dificultăți de scriere.

Presupunem deci că  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(a, b) \in \overset{\circ}{A}$  și  $S((a, b), r) \subseteq A$ ; de asemenea presupunem că există  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} : S(a, r) \rightarrow \mathbb{R}$  și că

$$(1) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \text{ și } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b).$$


Fie  $(x, y) \in S((a, b), r) \setminus \{(a, b)\}$  un punct fixat pentru moment; atunci:

$$(2) \quad f(x, y) - f(a, b) = [f(x, y) - f(x, b)] + [f(x, b) - f(a, b)].$$

Funcția de o variabilă  $g = f(x, \cdot) : [b, y] \rightarrow \mathbb{R}$  este derivabilă pe  $[b, y]$  și  $g'(t) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, t), \forall t \in [b, y]$ . Atunci putem să aplicăm acestei funcții teorema lui Lagrange; deci există  $d(x, y) \in ]b, y[$  a.î.

$$(3) \quad f(x, y) - f(x, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, d(x, y)) \cdot (y - b).$$

Schițăm mai jos poziția punctelor care apar în demonstrație.



În mod asemănător considerăm funcția de o variabilă  $h = f(\cdot, b) : [x, a] \rightarrow \mathbb{R}$ ;  $h$  este derivabilă pe  $[x, a]$  și  $h'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, b), \forall t \in [x, a]$ . Deci există  $c(x) \in ]x, a[$  a.î.

$$(4) \quad f(x, b) - f(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x}(c(x), b) \cdot (x - a).$$

Înlocuind (3) și (4) în (2) obținem:

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(a, b) &= \frac{\partial f}{\partial x}(c(x), b) \cdot (x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, d(x, y)) \cdot (y - b) = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \cdot (x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \cdot (y - b) + \\ &+ \left[ \frac{\partial f}{\partial x}(c(x), b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \right] \cdot (x - a) + \left[ \frac{\partial f}{\partial y}(x, d(x, y)) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right] \cdot (y - b). \end{aligned}$$

Deoarece  $(x, y)$  este arbitrar în  $S((a, b), r) \setminus \{(a, b)\}$ , putem defini acum:

$$\beta_1(x, y) = \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(c(x), b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) & , (x, y) \neq (a, b) \\ 0 & , (x, y) = (a, b) \end{cases} \text{ și}$$

$$\beta_2(x, y) = \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial y}(x, d(x, y)) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) & , (x, y) \neq (a, b) \\ 0 & , (x, y) = (a, b) \end{cases}.$$

Astfel există  $d = \left( \frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right) \in \mathbb{R}^2$  și o funcție vectorială

$\beta : S((a, b), r) \rightarrow \mathbb{R}^2, \beta = (\beta_1, \beta_2)$  a.î.,  $\forall (x, y) \in S((a, b), r)$ ,

$$f(x, y) = f(a, b) + (d, (x - a, y - b)) + (\beta(x, y), (x - a, y - b)).$$

Așa cum am remarcat în observația 3.2.2, 1)., condiția de diferențiabilitate este locală; deci este suficient ca relația de mai sus să fie verificată pe o vecinătate a lui  $(a, b)$ .

Atunci este suficient să demonstrăm că  $\beta$  este continuă în  $(a, b)$  pentru ca să rezulte, din teorema 3.2.3, (ii), că  $f$  este diferențiabilă în  $(a, b)$ .

Din (1),  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \delta < r$  a.î.  $\forall (x, y) \in S((a, b), \delta)$ ,

$$(5) \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \right| < \varepsilon$$

și

$$(6) \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right| < \varepsilon.$$

Dar  $\forall (x, y) \in S((a, b), \delta), (c(x), b) \in S((a, b), \delta)$  și  $(x, d(x, y)) \in S((a, b), \delta)$ . Rezultă atunci din definiția funcțiilor  $\beta_1$  și  $\beta_2$  și din relațiile (5) și (6) că

$$|\beta_1(x, y) - \beta_1(a, b)| < \varepsilon \text{ și } |\beta_2(x, y) - \beta_2(a, b)| < \varepsilon,$$

ceea ce arată că  $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} \beta_1(x, y) = \beta_1(a, b) = 0$  și  $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} \beta_2(x, y) = \beta_2(a, b) = 0$ . ■

Criteriul de diferențiabilitate din teorema precedentă sugerează introducerea unei clase importante de funcții diferențiabile.

**3.2.9 Definiție.** Fie  $D \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime deschisă; spunem că o funcție  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  este de **clasă  $C^1$**  pe  $D$  sau că  $f \in C^1(D)$  dacă toate derivatele parțiale ale lui  $f$  există și sînt continue în toate punctele mulțimii  $D$ .

Utilizînd criteriul de diferențiabilitate din teorema 3.2.8, obținem:

**3.2.10 Corolar.** O funcție de clasă  $C^1$  pe  $D$  este diferențiabilă în toate punctele mulțimii  $D$ .

## Capitolul 3

# Diferențiabilitatea funcțiilor de mai multe variabile

### 3.2 Diferențiala

#### Diferențiabilitatea funcțiilor vectoriale

Să considerăm acum pe rînd conceptele de derivată după o direcție, diferențiabilitate și diferențială pentru funcțiile vectoriale. Aceasta oferă un bun prilej de reluare și de fixare a noțiunilor și rezultatelor deja prezentate pentru funcțiile scalare.

#### Derivata după o direcție

**3.2.11 Definiție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ ,  $a \in \mathring{A}$  și  $u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ ; spunem că  $f$  are derivată în  $a$  după direcția  $u$  dacă există

$$\frac{df}{du}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [f(a + tu) - f(a)] \in \mathbb{R}^l.$$

Expresia din paranteza pătrată de mai sus este un vector iar fracția din față este un scalar; vom conveni totuși, pentru asemănarea cu cazul scalar, să scriem  $\frac{df}{du}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t}$ .

**3.2.12 Observații.** 1). Dacă  $(f_1, \dots, f_l)$  sînt funcțiile scalare de coordonate ale lui  $f$  atunci, din teorema 2.2.3 știm că limita funcției vectoriale

$\frac{f(a+tu) - f(a)}{t}$  există dacă și numai dacă,  $\forall j \in \{1, \dots, l\}$ , există limita funcției scalare  $\frac{f_j(a+tu) - f_j(a)}{t}$ , pentru  $t \rightarrow 0$ , deci dacă și numai dacă  $f_j$  are derivată în  $a$  după direcția  $u$  și în plus:

$$\frac{df}{du}(a) = \begin{pmatrix} \frac{df_1}{du}(a) \\ \vdots \\ \frac{df_l}{du}(a) \end{pmatrix}.$$

2). În cazul particular cînd  $u = e_i, i = 1, \dots, k$ , obținem

$$\frac{df}{de_i}(a) = \begin{pmatrix} \frac{df_1}{de_i}(a) \\ \vdots \\ \frac{df_l}{de_i}(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_i}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_i}(a) \end{pmatrix}$$

3). Dacă  $k = 1$  atunci  $\forall j = 1, \dots, l$ ,

$$\frac{df_j}{de_1}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_j(a+t) - f_j(a)}{t} = f'_j(a) \text{ și deci } \frac{df}{de_1}(a) = \begin{pmatrix} f'_1(a) \\ \vdots \\ f'_l(a) \end{pmatrix}.$$

În acest caz vom conveni să spunem că funcția  $f$  este **derivabilă** în  $a$ ; notăm

$$f'(a) = \frac{df}{de_1}(a) = \begin{pmatrix} f'_1(a) \\ \vdots \\ f'_l(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^l \text{ și o numim } \mathbf{derivata} \text{ funcției } f \text{ în } a.$$

**3.2.13 Definiție.** Să presupunem că funcția vectorială  $f$  are derivate după toți vectorii bazei canonice  $\{e_1, \dots, e_k\}$  în  $a$ ; atunci matricea

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_k}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_l}{\partial x_k}(a) \end{pmatrix}_{l \times k}$$

se numește **matricea jacobiană** atașată funcției  $f$  în punctul  $a$  (numele este dat în onoarea matematicianului german CARL JACOBI).

În cazul particular  $l = k$  această matrice este pătratică; determinantul asociat ei

$$\det J_f(a) = \frac{D(f_1, \dots, f_k)}{D(x_1, \dots, x_k)}(a) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_k}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_k}{\partial x_k}(a) \end{vmatrix}$$

se numește **determinantul funcțional** sau **jacobianul** lui  $f$  în  $a$ .

Este evident că, și pentru funcțiile vectoriale, existența derivatelor după orice direcție într-un punct nu va antrena, în general, continuitatea.

### Diferențiabilitatea

**3.2.14 Definiție.** O funcție  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  este **diferențiabilă** în  $a \in \overset{\circ}{A}$  dacă există un operator liniar  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  și o funcție  $\alpha : A \rightarrow \mathbb{R}^l$  continuă și nulă în  $a$  a.î.

$$(D) \quad f(x) = f(a) + T(x - a) + \|x - a\| \cdot \alpha(x), \forall x \in A.$$

Operatorul  $T$  se numește **diferențiala** lui  $f$  în  $a$  și se notează  $df(a) = T$ .

**3.2.15 Observații.** 1). Relația (D) de mai sus este vectorială (o relație între vectori din  $\mathbb{R}^l$ ).

2). Funcția  $f$  este diferențiabilă în  $a$  dacă și numai dacă există un operator liniar  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  a.î.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - T(x - a)}{\|x - a\|} = 0$ .

Dacă în relația (D) egalăm componentele vectorilor din cei doi membri obținem:

**3.2.16 Teoremă.** Funcția  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l, f = (f_1, \dots, f_l)$ , este diferențiabilă în  $a \in \overset{\circ}{A}$  dacă și numai dacă,  $\forall j \in \{1, \dots, l\}$ ,  $f_j$  este diferențiabilă în  $a$  și

$$df(a)(h) = \begin{pmatrix} df_1(a)(h) \\ \vdots \\ df_l(a)(h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^k \frac{\partial f_1}{\partial x_i}(a) h_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^k \frac{\partial f_l}{\partial x_i}(a) h_i \end{pmatrix} =$$



$$= \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_k}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_l}{\partial x_k}(a) \end{pmatrix}_{l \times k} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_k \end{pmatrix}_{k \times 1} = J_f(a) \cdot h, \forall h \in \mathbb{R}^k.$$

**3.2.17 Observații.** 1). Matricea jacobiană a funcției  $f$  în  $a$  este chiar matricea asociată diferențialului lui  $f$  în  $a$  (diferențială privită ca operator liniar). Rezultă că diferențiabilitatea într-un punct antrenează existența matricii jacobiene în acel punct.

2). Dacă  $k = 1$  atunci  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^l$ ,  $f = (f_1, \dots, f_l)$  este diferențiabilă în  $a \in \mathring{A}$  dacă și numai dacă,  $\forall j = 1, \dots, l$ ,  $f_j : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  este diferențiabilă în  $a$  deci dacă și numai dacă  $f_j$  este derivabilă în  $a$  și

$$df(a)(h) = \begin{pmatrix} f'_1(a) \\ \vdots \\ f'_l(a) \end{pmatrix} \cdot h, \forall h \in \mathbb{R}.$$

Rezultă că, în acest caz,  $f$  este diferențiabilă în  $a$  dacă și numai dacă  $f$  este derivabilă în  $a$  și  $df(a)(h) = f'(a) \cdot h$ ,  $\forall h \in \mathbb{R}$  (vezi observația 3.2.12, 3)).

În cazul  $k > 1$  existența matricii jacobiene într-un punct nu antrenează, în general, diferențiabilitatea în acel punct; totuși ținând cont de teorema de mai sus și de criteriul scalar de diferențiabilitate, putem obține varianta vectorială a acestui criteriu.

**3.2.18 Teoremă** (criteriul de diferențiabilitate). *Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $a \in \mathring{A}$ ; dacă matricea jacobiană a lui  $f$  există pe o vecinătate a lui  $a$  și este continuă în  $a$  (toate derivatele parțiale care formează această matrice sînt continue în  $a$ ) atunci  $f$  este diferențiabilă în  $a$ .*

**3.2.19 Definiție.** *O funcție vectorială  $f$  definită pe o mulțime deschisă  $D \subseteq \mathbb{R}^k$  este de clasă  $C^1$  pe  $D$ , sau  $f \in C^1(D)$ , dacă matricea jacobiană a funcției  $f$  există și este continuă în toate punctele lui  $D$ .*

**3.2.20 Corolar.** *O funcție vectorială de clasă  $C^1$  pe mulțimea deschisă  $D \subseteq \mathbb{R}^k$  este diferențiabilă în toate punctele lui  $D$ .*

**3.2.21 Exemple.** 1). Fie  $f : [0, +\infty[ \times [0, 2\pi[ \rightarrow \mathbb{R}^2$ , definită prin  $f(r, u) = (r \cos u, r \sin u)$ ,  $\forall (r, u) \in [0, +\infty[ \times [0, 2\pi[$ ;  $f$  reprezintă trecerea de la coordonatele polare la cele carteziane în plan;  $f$  este diferențiable pe  $]0, +\infty[ \times ]0, 2\pi[$ . Matricea jacobiană a lui  $f$  este  $J_f = \begin{pmatrix} \cos u & -r \sin u \\ \sin u & r \cos u \end{pmatrix}$ , jacobianul lui  $f$  este  $\det J_f = r$  iar diferențiala lui  $f$  într-un punct  $(r, u)$  va fi:

$$df(r, u) = \begin{pmatrix} \cos u \cdot dr - r \sin u \cdot du \\ \sin u \cdot dr + r \cos u \cdot du \end{pmatrix}.$$

2). Trecerea de la coordonatele polare la cele carteziane în spațiu este dată de funcția  $f : [0, +\infty[ \times [0, 2\pi[ \times [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  
 $f(r, u, v) = (r \cos u \cos v, r \sin u \cos v, r \sin v)$ ,  
 $\forall (r, u, v) \in [0, +\infty[ \times [0, 2\pi[ \times [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$   
 $f$  este o funcție diferențiable pe  $]0, +\infty[ \times ]0, 2\pi[ \times ]-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}[$ . Matricea

jacobiană a lui  $f$  este  $J_f = \begin{pmatrix} \cos u \cos v & -r \sin u \cos v & -r \cos u \sin v \\ \sin u \cos v & r \cos u \cos v & -r \sin u \sin v \\ \sin v & 0 & r \cos v \end{pmatrix}$ .

Jacobianul transformării este  $\det J_f = r^2 \cos v$ . Diferențiala funcției  $f$  este

$$df(r, u, v) = \begin{pmatrix} \cos u \cos v \cdot dr - r \sin u \cos v \cdot du - r \cos u \sin v \cdot dv \\ \sin u \cos v \cdot dr + r \cos u \cos v \cdot du - r \sin u \sin v \cdot dv \\ \sin v \cdot dr + r \cos v \cdot dv \end{pmatrix}.$$

## Operații cu funcții diferențiable

**3.2.22 Teoremă.** Fie  $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  două funcții diferențiable în  $a \in \mathring{A}$ ; atunci:

- 1).  $f + g$  este diferențiable în  $a$  și  $d(f + g)(a) = df(a) + dg(a)$ .
- 2).  $t \cdot f$  este diferențiable în  $a$  și  $d(t \cdot f)(a) = t \cdot df(a)$ .
- 3).  $(f, g) : A \rightarrow \mathbb{R}$  este diferențiable în  $a$  și

$$d(f, g)(a) = (df(a), dg(a)) + (f(a), dg(a)).$$

**Demonstrație.** Fie  $T = df(a) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  diferențiala lui  $f$  în  $a$  și  $S = dg(a) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  diferențiala lui  $g$  în  $a$ ;  $T$  și  $S$  sînt operatori liniari. Fie  $\alpha : A \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $\beta : A \rightarrow \mathbb{R}^l$  două funcții continue și nule în  $a$  a.î.:

$$(D_f) \quad f(x) = f(a) + T(x - a) + \|x - a\| \cdot \alpha(x), \forall x \in A.$$

$$(D_g) \quad g(x) = g(a) + S(x-a) + \|x-a\| \cdot \beta(x), \forall x \in A.$$

Atunci  $(f+g)(x) = (f+g)(a) + (T+S)(x-a) + \|x-a\| \cdot (\alpha+\beta)(x)$ ,  $\forall x \in A$ . Deoarece  $T+S$  este operator liniar iar funcția  $\alpha+\beta$  este continuă și nulă în  $a$  rezultă că  $f+g$  este diferențiabilă în  $a$  și că  $d(f+g)(a) = T+S = df(a) + dg(a)$ .

La fel se demonstrează și 2).

3). Din  $(D_f)$  și  $(D_g)$  obținem,  $\forall x \in A \setminus \{a\}$ ,

$$(f(x), g(x)) = (f(a), g(a)) + (f(a), S(x-a)) + (T(x-a), g(a)) + \gamma(x) \cdot \|x-a\|,$$

unde

$$\begin{aligned} \gamma(x) = (f(a), \beta(x)) + \frac{1}{\|x-a\|} \cdot (T(x-a), S(x-a)) + (T(x-a), \beta(x)) + \\ + (\alpha(x), g(a)) + (\alpha(x), S(x-a)) + (\alpha(x), \beta(x)) \cdot \|x-a\|. \end{aligned}$$

Definim  $\gamma(a) = 0$  și atunci  $\gamma : A \rightarrow \mathbb{R}$ .

Fie  $R : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $R(h) = (f(a), S(h)) + (T(h), g(a))$ ; atunci  $R$  este operator liniar și

$$(f, g)(x) = (f, g)(a) + R(x-a) + \gamma(x) \cdot \|x-a\|, \forall x \in A.$$

Rămîne să demonstrăm că  $\gamma$  este continuă în  $a$ .  $\forall x \in A \setminus \{a\}$ ,

$$\begin{aligned} |\gamma(x)| \leq \|f(a)\| \cdot \|\beta(x)\| + \frac{1}{\|x-a\|} \cdot \|T(x-a)\| \cdot \|S(x-a)\| + \|T(x-a)\| \cdot \|\beta(x)\| + \\ + \|\alpha(x)\| \cdot \|g(a)\| + \|\alpha(x)\| \cdot \|S(x-a)\| + \|\alpha(x)\| \cdot \|\beta(x)\| \cdot \|x-a\| \end{aligned}$$

În propoziția 2.4.4 am arătat că orice operație liniară este lipschitziană; fie deci  $L_T, L_S > 0$  a.î.  $\|T(x-a)\| \leq L_T \cdot \|x-a\|$  și  $\|S(x-a)\| \leq L_S \cdot \|x-a\|$ .

Deoarece  $\alpha$  și  $\beta$  sînt funcții continue și nule în  $a$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} \|\alpha(x)\| = \|\alpha(a)\| = 0$  și  $\lim_{x \rightarrow a} \|\beta(x)\| = \|\beta(a)\| = 0$ . Rezultă imediat că  $\lim_{x \rightarrow a} \gamma(x) = 0 = \gamma(a)$  ceea ce arată că  $(f, g)$  este diferențiabilă în  $a$ .

$$d(f, g)(a) = R = (f(a), S) + (T, g(a)) = (f(a), dg(a)) + (df(a), g(a)). \quad \blacksquare$$

**3.2.23 Teoremă.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $g : B \subseteq \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^m$  a.î.  $f(A) \subseteq B$ ; dacă  $f$  este diferențiabilă în  $a \in A$  iar  $g$  este diferențiabilă în  $b = f(a) \in B$  atunci  $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  este diferențiabilă în  $a$  și

$$d(g \circ f)(a) = [dg(f(a))] \circ df(a).$$

**Demonstrație.** Fie  $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ ,  $S : \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^m$  operatori liniari a.î.  $df(a) = T$  și  $dg(f(a)) = S$ ; fie  $\alpha : A \rightarrow \mathbb{R}^l$  continuă și nulă în  $a$  și  $\beta : B \rightarrow \mathbb{R}^m$  continuă și nulă în  $b = f(a)$  a.î.

$$(1) \quad f(x) = f(a) + T(x - a) + \|x - a\| \cdot \alpha(x), \forall x \in A,$$

$$(2) \quad g(y) = g(b) + S(y - b) + \|y - b\| \cdot \beta(y), \forall y \in B,$$

$\forall x \in A, y = f(x) \in B$  și atunci, din (2),

$$(3) \quad g(f(x)) = g(f(a)) + S(f(x) - f(a)) + \|f(x) - f(a)\| \cdot \beta(f(x)).$$

În (3) înlocuim  $f(x) - f(a)$  cu valoarea sa obținută din (1) și ținem cont de liniaritatea lui  $S$ ; atunci,  $\forall x \in A \setminus \{a\}$ ,

$$(4) \quad \begin{aligned} g(f(x)) &= g(f(a)) + S[T(x - a) + \|x - a\| \cdot \alpha(x)] + \\ &+ \|T(x - a) + \|x - a\| \cdot \alpha(x)\| \cdot \beta(f(x)) = g(f(a)) + S(T(x - a)) + \\ &+ \|x - a\| \cdot \left( S(\alpha(x)) + \left\| \frac{1}{\|x - a\|} \cdot T(x - a) + \alpha(x) \right\| \cdot \beta(f(x)) \right). \end{aligned}$$

Fie atunci  $\gamma : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  definită prin

$$\gamma(x) = \begin{cases} S(\alpha(x)) + \left\| \frac{1}{\|x - a\|} \cdot T(x - a) + \alpha(x) \right\| \cdot \beta(f(x)) & , x \neq a \\ 0 & , x = a \end{cases}$$

Atunci (4) se scrie

$$(g \circ f)(x) = (g \circ f)(a) + (S \circ T)(x - a) + \|x - a\| \cdot \gamma(x), \forall x \in A.$$

Cum  $S \circ T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$  este operator liniar, pentru a demonstra că  $g \circ f$  este diferențiabilă în  $a$ , este suficient să arătăm că  $\gamma$  este continuă în  $a$ .

Deoarece  $\alpha$  este continuă și nulă în  $a$  iar  $S$  este continuu pe  $\mathbb{R}^l$  (propoziția 2.4.4) și se anulează în 0 rezultă că

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow a} S(\alpha(x)) = 0.$$

Utilizînd iar propoziția 2.4.4, rezultă că  $T$  este lipschitzian; există deci  $L > 0$  a.î.  $\|T(x - a)\| = \|T(x) - T(a)\| \leq L \cdot \|x - a\|, \forall x \in A$ . Atunci

$$(6) \quad \left\| \frac{1}{\|x - a\|} \cdot T(x - a) + \alpha(x) \right\| \cdot \|\beta(f(x))\| \leq (L + \|\alpha(x)\|) \cdot \|\beta(f(x))\|.$$

Funcția  $f$  este diferențiabilă în  $a$  și deci este continuă în  $a$  (corolarul 3.2.4, 1.); deoarece  $\beta$  este continuă și nulă în  $b = f(a)$ , rezultă că

$$(7) \quad \lim_{x \rightarrow a} \beta(f(x)) = \beta(f(a)) = 0.$$

Atunci, din (5), (6) și (7) rezultă că  $\lim_{x \rightarrow a} \gamma(x) = 0 = \gamma(a)$ . ■

**3.2.24 Corolar.** În ipotezele teoremei precedente

$$J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a)) \cdot J_f(a).$$

**Demonstrație.**

Din teorema 3.2.16 știm că  $d(g \circ f)(a)(h) = J_{g \circ f}(a) \cdot h, \forall h \in \mathbb{R}^k$ .

Din teorema precedentă,  $\forall h \in \mathbb{R}^k$ ,  $d(g \circ f)(a)(h) = [dg(f(a)) \circ df(a)](h) = dg(f(a))(df(a)(h)) = J_g(f(a)) \cdot J_f(a) \cdot h$ , de unde rezultă relația din corolar.

De altfel, rezultatul acestui corolar este și consecința imediată a teoremei 2.4.5, 2)., unde se arată că matricea asociată compunerii a două aplicații liniare este produsul matricilor asociate a celor două aplicații.

Să considerăm funcțiile de coordonate ale aplicațiilor vectoriale  $f$  și  $g$ :  $f = (f_1, \dots, f_l), g = (g_1, \dots, g_m)$ ; atunci relația din corolar se scrie:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial(g_1 \circ f)}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial(g_1 \circ f)}{\partial x_k}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial(g_m \circ f)}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial(g_m \circ f)}{\partial x_k}(a) \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1}(f(a)) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial y_l}(f(a)) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial y_1}(f(a)) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial y_l}(f(a)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_k}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_l}{\partial x_k}(a) \end{pmatrix}$$

Elementul de pe linia  $i$  și coloana  $j$  din matricea produs se obține înmulțind linia  $i$  din primul factor cu coloana  $j$  din factorul doi; astfel obținem,  $\forall i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, k$ :

$$(DC) \quad \boxed{\frac{\partial(g_i \circ f)}{\partial x_j}(a) = \frac{\partial g_i}{\partial y_1}(f(a)) \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_j}(a) + \dots + \frac{\partial g_i}{\partial y_m}(f(a)) \cdot \frac{\partial f_l}{\partial x_j}(a)}$$

### 3.2.25 Cazuri particulare.

1).  $\boxed{m = 1}$

În acest caz  $(g \circ f)(x_1, \dots, x_k) = g(f_1(x_1, \dots, x_k), \dots, f_l(x_1, \dots, x_k))$ .  
Formula (DC) devine

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_j}(a) = \frac{\partial g}{\partial y_1}(f(a)) \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_j}(a) + \dots + \frac{\partial g}{\partial y_l}(f(a)) \cdot \frac{\partial f_l}{\partial x_j}(a), \forall j = 1, \dots, k.$$

Fie acum  $k = l = 2$  și funcțiile  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, g : B \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  
 $(x, y) \xrightarrow{f} (u(x, y), v(x, y)) \in \mathbb{R}^2, (u, v) \xrightarrow{g} g(u, v) \in \mathbb{R}$ . Funcția compusă  
 $h = g \circ f$  este definită prin  $h(x, y) = g(f(x, y)) = g(u(x, y), v(x, y)), \forall (x, y) \in A$ . Dacă  $(a, b) \in \overset{\circ}{A}$ ,  $f$  este diferențiabilă în  $(a, b)$  și  $g$  este diferențiabilă în  
 $f(a, b) \in \overset{\circ}{B}$  atunci  $dh(a, b) = dg(f(a, b)) \circ df(a, b)$  ceea ce antrenează pentru  
matricile jacobiene:  $J_h(a, b)_{1 \times 2} = J_g(f(a, b))_{1 \times 2} \cdot J_f(a, b)_{2 \times 2}$ . Scriind explicit  
această ultimă relație, obținem:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x}(a, b) & \frac{\partial h}{\partial y}(a, b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial u}(f(a, b)) & \frac{\partial g}{\partial v}(f(a, b)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(a, b) & \frac{\partial u}{\partial y}(a, b) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(a, b) & \frac{\partial v}{\partial y}(a, b) \end{pmatrix}$$

de unde:

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial g}{\partial u}(f(a, b)) \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(a, b) + \frac{\partial g}{\partial v}(f(a, b)) \cdot \frac{\partial v}{\partial x}(a, b) \\ \frac{\partial h}{\partial y}(a, b) = \frac{\partial g}{\partial u}(f(a, b)) \cdot \frac{\partial u}{\partial y}(a, b) + \frac{\partial g}{\partial v}(f(a, b)) \cdot \frac{\partial v}{\partial y}(a, b) \end{cases}$$

Dacă am presupune, în plus, că există  $\frac{\partial g}{\partial u}(u, v), \frac{\partial g}{\partial v}(u, v)$  pe o întreagă  
vecinătate a lui  $f(a, b)$  și sînt la rîndul lor diferențiabile în  $f(a, b)$  iar  $f$   
admite derivate parțiale de ordin doi, atunci am putea aplica formula de  
derivare de la funcții compuse pentru a obține derivatele de ordin doi ale lui

$h$  în  $(a, b)$ ; vom prezenta mai jos calculul acestor derivate fără a mai pune în evidență punctele în care sînt calculate (derivatele lui  $h$  și cele ale lui  $u$  și  $v$  sînt calculate în  $(a, b)$  iar derivatele lui  $g$  în  $f(a, b)$ ):

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} &= \left( \frac{\partial^2 g}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \\
&\quad + \left( \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \\
\frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x} &= \left( \frac{\partial^2 g}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} + \\
&\quad + \left( \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} \\
\frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} &= \left( \frac{\partial^2 g}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \\
&\quad + \left( \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \\
\frac{\partial^2 h}{\partial y^2} &= \left( \frac{\partial^2 g}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \\
&\quad + \left( \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}
\end{aligned}$$

## Capitolul 3

# Diferențiabilitatea funcțiilor de mai multe variabile

### 3.2 Diferențiala

**3.2.26** 2).  $\boxed{k = m = 1}$

Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^l$  și  $g : B \subseteq \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}$  cu condiția de compunere  $f(A) \subseteq B$ ; atunci  $f(t) = (f_1(t), \dots, f_l(t))$ ,  $\forall t \in A$ , iar funcția compusă este  $h : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h(t) = g(f_1(t), \dots, f_l(t))$ ,  $\forall t \in A$ ;  $h$  este deci o funcție reală de o variabilă reală.

Fie  $a \in \overset{\circ}{A}$ ; dacă  $f$  este diferențiabilă în  $a$  și  $g$  este diferențiabilă în  $f(a) \in \overset{\circ}{B}$  atunci:  $dh(a) = dg(f(a)) \circ df(a)$  iar matricile jacobiene verifică relația  $J_h(a)_{1 \times 1} = J_g(f(a))_{1 \times l} \cdot J_f(a)_{l \times 1}$  ceea ce explicit se scrie:

$$(h'(a)) = \left( \frac{\partial g}{\partial y_1}(f(a)) \quad \dots \quad \frac{\partial g}{\partial y_l}(f(a)) \right) \cdot \begin{pmatrix} f'_1(a) \\ \vdots \\ f'_l(a) \end{pmatrix},$$

de unde obținem

$$h'(a) = \frac{\partial g}{\partial y_1}(f(a)) \cdot f'_1(a) + \dots + \frac{\partial g}{\partial y_l}(f(a)) \cdot f'_l(a).$$

O situație concretă în care putem întâlni o astfel de compunere este aceea în care  $A$  este un interval închis din  $\mathbb{R}$ ,  $f$  este o funcție continuă (deci un drum sau un arc) cu graficul într-o mulțime din  $\mathbb{R}^3$  (care poate fi gîndită



ca interiorul unei încăperi) iar  $g$  reprezintă temperatura în punctele acelei încăperi. Funcția  $g \circ f$  reprezintă temperatura de-a lungul drumului  $f$  iar derivata acesteia reprezintă variația temperaturii pe arcul  $f$ .

Fie  $l = 2$ ,  $\varphi : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\varphi(t) = (u(t), v(t))$  și  $f : B \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  a.î.  $\varphi(A) \subseteq B$ ; atunci funcția compusă este  $h = f \circ \varphi : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h(t) = f(u(t), v(t))$ ,  $\forall t \in A$ . Dacă  $\varphi$  este diferențiabilă pe  $\overset{\circ}{A}$  (ceea ce, după observația 3.2.17, 2), este echivalent cu a spune că  $\varphi$  este derivabilă pe  $\overset{\circ}{A}$ ),  $f$  este diferențiabilă pe  $\overset{\circ}{B}$  iar  $\varphi(\overset{\circ}{A}) \subseteq \overset{\circ}{B}$  atunci  $h$  este derivabilă pe  $\overset{\circ}{A}$  și

$$h'(t) = \frac{\partial f}{\partial u}(u(t), v(t)) \cdot u'(t) + \frac{\partial f}{\partial v}(u(t), v(t)) \cdot v'(t), \forall t \in \overset{\circ}{A}.$$

Dacă  $a = (a_1, a_2) \in \overset{\circ}{B}$  (deci  $\exists r > 0$  a.î.  $T(a, r) \subseteq A$ ),  $u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  și  $\delta = \frac{r}{\|u\|}$  atunci  $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2) : [-\delta, \delta] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\varphi(t) = a + tu$ ,  $\forall t \in [-\delta, \delta]$  este un drum al cărui grafic este un segment ce trece prin  $a$  și are direcția  $u$ . Dacă  $f$  este diferențiabilă în  $a$  atunci  $h = f \circ \varphi$  este derivabilă în 0 și, după formula de derivare de mai sus,

$$\begin{aligned} h'(0) &= \frac{\partial f}{\partial x}(a) \cdot \varphi'_1(0) + \frac{\partial f}{\partial y}(a) \cdot \varphi'_2(0) = \frac{\partial f}{\partial x}(a_1, a_2) \cdot u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a_1, a_2) \cdot u_2 = \\ &= df(a)(u) = \frac{df}{du}(a). \end{aligned}$$

Rezultă că derivata funcției  $f$  în  $a$  după direcția  $u$  este derivata unei funcții compuse.

3).  $\boxed{k=2, l=3, m=1}$

Fie  $f = (f_1, f_2, f_3) : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $g : B \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  cu  $f(A) \subseteq B$ ; dacă  $f$  este diferențiabilă în punctul  $a \in \overset{\circ}{A}$  și  $g$  este diferențiabilă în  $f(a) \in \overset{\circ}{B}$  atunci funcția compusă  $h = g \circ f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h(x, y) = g(f_1(x, y), f_2(x, y), f_3(x, y))$  este diferențiabilă în  $a$  și  $dh(a) = dg(f(a)) \circ df(a)$  de unde obținem  $J_h(a)_{1 \times 2} = J_g(f(a))_{1 \times 3} \cdot J_f(a)_{3 \times 2}$  sau scris dezvoltat (fără a mai pune în evidență punctele în care sînt calculate derivatele parțiale):

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial y_1} & \frac{\partial g}{\partial y_2} & \frac{\partial g}{\partial y_3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Putem atunci obține derivatele parțiale ale funcției compuse  $h$ :

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y_3} \cdot \frac{\partial f_3}{\partial x} \\ \frac{\partial h}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial y_3} \cdot \frac{\partial f_3}{\partial y} \end{cases}.$$

### 3.3 Diferențiale de ordin superior

#### Derivate mixte

Așa cum am menționat deja, derivatele parțiale mixte de ordin doi ale unei funcții de mai multe variabile nu sînt, în general, egale.

În teorema următoare prezentăm două criterii (condiții suficiente) pentru ca derivatele mixte să coincidă.

**3.3.1 Teoremă.** *Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  și  $a \in \overset{\circ}{A}$ .*

**1). Criteriul lui Schwarz.**

*Fie  $i, j \in \{1, \dots, k\}$ ; dacă există  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$  pe o vecinătate a punctului  $a$  și sînt continue în  $a$  atunci*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a).$$

**2). Criteriul lui Young.**

*Dacă,  $\forall i \in \{1, \dots, k\}$ , există  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$  pe o vecinătate a punctului  $a$  și este diferențiabilă în  $a$  atunci*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a), \forall i, j \in \{1, \dots, k\}.$$

Ⓢ **Demonstrație.** Observăm întîi că demonstrația se poate reduce la cea din cazul  $k = 2$ . Într-adevăr, în loc să studiem problema pentru funcția de  $k$  variabile  $f$  considerăm funcția de două variabile

$$(x_i, x_j) \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \dots, a_k)$$

ale cărei derivate de ordin doi după  $x_i$  și  $x_j$  în punctul  $a$  coincid cu cele ale lui  $f$ .

Fie deci  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  și  $(a, b) \in \mathring{A}$ . Considerăm  $S \subseteq A$  o sferă cu centrul în  $(a, b)$  și de rază  $r$  drept vecinătate pe care au loc condițiile din criteriul lui Schwarz, respectiv cele din criteriul lui Young.

Fie  $(x, y) \in S$  cu  $x \neq a$  și  $y \neq b$  un punct arbitrar dar fixat și fie expresia  $g(x, y) = f(x, y) - f(x, b) - f(a, y) + f(a, b)$ . Definim două funcții de o variabilă astfel:

$$\varphi : [a, x] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(t) = f(t, y) - f(t, b), \forall t \in [a, x] \text{ și}$$

$$\psi : [b, y] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \psi(s) = f(x, s) - f(a, s), \forall s \in [b, y].$$

$$\text{Atunci } g(x, y) = \varphi(x) - \varphi(a) = \psi(y) - \psi(b).$$

Din ipotezele ambelor criterii rezultă că există  $\frac{\partial f}{\partial x}$  și  $\frac{\partial f}{\partial y}$  pe  $S$  și astfel  $\varphi$  și  $\psi$  sînt derivabile pe intervalele lor de definiție și

$$\varphi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(t, b), \forall t \in [a, x],$$

$$\psi'(s) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, s) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, s), \forall s \in [b, y].$$

Putem astfel să aplicăm teorema creșterilor finite (teorema lui Lagrange) celor două funcții.

Deci există  $c \in (a, x)$  și  $d \in (b, y)$  a.î.

$$(1) \quad g(x, y) = \varphi'(c)(x - a) = \psi'(d)(y - b)$$

iar

$$(2) \quad \varphi'(c) = \frac{\partial f}{\partial x}(c, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(c, b),$$

$$(3) \quad \psi'(d) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, d) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, d).$$


1). Să presupunem acum că ne situăm în condițiile criteriului lui Schwarz; atunci există  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$  pe  $S$  și sînt continue în  $(a, b)$ .

În (2) și (3) putem aplica din nou teorema lui Lagrange și obținem punctele  $e \in [b, y]$  și  $f \in [a, x]$  a.î.

$$(4) \quad \varphi'(c) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(c, e)(y - b),$$

$$(5) \quad \psi'(d) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(f, d)(x - a).$$

Reprezentăm poziția posibilă a acestor puncte în figura următoare:



Din (1), (4) și (5) rezultă că,  $\forall (x, y) \in S, x \neq a, y \neq b$ , există două puncte,  $(c(x, y), e(x, y)), (f(x, y), d(x, y)) \in (a, x) \times (b, y)$ , a.î.

$$(6) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(c(x, y), e(x, y)) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(f(x, y), d(x, y)).$$

Trecem la limită pentru  $(x, y) \rightarrow (a, b)$  în (6) și, deoarece derivatele mixte sînt continue iar

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} c(x, y) &= a = \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y), \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} e(x, y) &= b = \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} d(x, y), \end{aligned}$$

rezultă că

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b).$$

2). Să presupunem acum că  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$  sînt definite pe  $S$  și sînt diferențiabile în  $(a, b)$ . Atunci există toate derivatele de ordin doi ale lui  $f$  pe  $S$  și există două funcții  $\alpha, \beta : S \rightarrow \mathbb{R}$  continue și nule în  $(a, b)$  a.î.

$$(7) \quad \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)(x - a) + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b)(y - b) + \\ &+ \alpha(x, y) \cdot \|(x, y) - (a, b)\|, \forall (x, y) \in S, \end{aligned}$$

$$(8) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)(x - a) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)(y - b) +$$

$$+\beta(x, y) \cdot \|(x, y) - (a, b)\|, \forall (x, y) \in S.$$

Deoarece  $(c, y), (c, b) \in S$ , din (2) și (7) obținem

$$(9) \quad \varphi'(c) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b)(y - b) + \alpha(c, y) \cdot \|(c, y) - (a, b)\| - \alpha(c, b) \cdot |c - a|,$$

și cum  $(x, d), (a, d) \in S$ , din (3) și (8) rezultă

$$(10) \quad \psi'(d) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)(x - a) + \beta(x, d) \cdot \|(x, d) - (a, b)\| - \beta(a, d) \cdot |d - b|.$$

Atunci, din (1), (9) și (10) rezultă că

$$(11) \quad \begin{aligned} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b)(y - b)(x - a) + \alpha(c, y) \cdot \|(c, y) - (a, b)\|(x - a) - \\ & - \alpha(c, b) \cdot |c - a|(x - a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)(x - a)(y - b) + \beta(x, d) \cdot \|(x, d) - (a, b)\|(y - b) - \\ & - \beta(a, d) \cdot |d - b|(y - b). \end{aligned}$$

Împărțim relația (11) cu  $(x - a)(y - b)$  și obținem:

$$(12) \quad \begin{aligned} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) + \alpha(c, y) \cdot \frac{\|(c, y) - (a, b)\|}{y - b} - \alpha(c, b) \cdot \frac{|c - a|}{y - b} = \\ & = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) + \beta(x, d) \cdot \frac{\|(x, d) - (a, b)\|}{x - a} - \beta(a, d) \cdot \frac{|d - b|}{x - a}. \end{aligned}$$

Deoarece  $(x, y)$  este arbitrar în  $S$  îl putem alege a.î.  $|x - a| = |y - b|$ ; în acest caz  $\frac{\|(c, y) - (a, b)\|}{|y - b|} \leq \frac{\|(x, y) - (a, b)\|}{|y - b|} \leq \sqrt{2}, \frac{\|(x, d) - (a, b)\|}{|x - a|} \leq \frac{\|(x, y) - (a, b)\|}{|x - a|} \leq \sqrt{2}, \frac{|c - a|}{|y - b|} \leq \frac{|x - a|}{|y - b|} = 1, \frac{|d - b|}{|x - a|} \leq \frac{|y - b|}{|x - a|} = 1$ .

Putem atunci trece la limită în relația (12) pentru  $(x, y) \rightarrow (a, b)$  cu condiția că  $|x - a| = |y - b|$ ; deoarece  $\alpha$  și  $\beta$  sînt continue și nule în  $(a, b)$  rezultă că

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b). \quad \blacksquare$$

**3.3.2 Definiție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  o funcție diferențiabilă în toate punctele interioare ale mulțimii  $A$ ; atunci,  $\forall h \in \mathbb{R}^k$ , putem defini funcția  $g^h : \mathring{A} \rightarrow \mathbb{R}^l$  prin  $g^h(x) = df(x)(h), \forall x \in \mathring{A}$ .

Dacă,  $\forall h \in \mathbb{R}^k$ , funcția  $g^h$  este diferențiabilă în punctul  $a \in \mathring{A}$ , spunem că funcția  $f$  este **diferențiabilă de două ori în  $a$** .

Diferențiala a doua a funcției  $f$  în  $a$  este prin definiție aplicația:

$$d^2 f(a) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l, d^2 f(a)(h) = dg^h(a)(h), \forall h \in \mathbb{R}^k.$$

În cazul particular  $k = 2, l = 1$ ,  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  este diferențiabilă de două ori în punctul interior  $(a, b) \in \mathring{A}$  dacă,  $\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ , aplicația  $g^{(h,k)} : \mathring{A} \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $g^{(h,k)}(x, y) = df(x, y)(h, k), \forall (x, y) \in \mathring{A}$ , este diferențiabilă în  $(a, b)$ .

**3.3.3 Propoziție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  o aplicație diferențiabilă în toate punctele mulțimii deschise  $A$ ;  $f$  este diferențiabilă de două ori în  $(a, b) \in \mathring{A}$  dacă și numai dacă  $\frac{\partial f}{\partial x}$  și  $\frac{\partial f}{\partial y}$  sînt funcții diferențiabile în  $(a, b)$ .

În acest caz

$$d^2 f(a, b)(h, k) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) \cdot h^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) \cdot hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) \cdot k^2.$$

**Demonstrație.** Să reamintim că,  $\forall (x, y) \in \mathring{A}, \forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$g^{(h,k)} : \mathring{A} \rightarrow \mathbb{R}, g^{(h,k)}(x, y) = df(x, y)(h, k) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \cdot h + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cdot k.$$

Dacă  $f$  este diferențiabilă de două ori în  $(a, b)$  atunci,  $\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, g^{(h,k)}$  este diferențiabilă în  $(a, b)$ .

Rezultă că  $g^{(1,0)} = \frac{\partial f}{\partial x}$  și  $g^{(0,1)} = \frac{\partial f}{\partial y}$  sînt diferențiabile în  $(a, b)$ .

Reciproc, dacă  $\frac{\partial f}{\partial x}$  și  $\frac{\partial f}{\partial y}$  sînt diferențiabile în  $(a, b)$  atunci  $\frac{\partial f}{\partial x} \cdot h + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot k$  este diferențiabilă în  $(a, b)$ ,  $\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$  (vezi teorema 3.2.22, punctele 1) și 2)). Rezultă că  $g^{(h,k)}$  este diferențiabilă în  $(a, b)$  și deci  $f$  este diferențiabilă de două ori în  $(a, b)$ .

În acest caz

$$d^2 f(a, b)(h, k) = dg^{(h,k)}(a, b)(h, k) = \frac{\partial g^{(h,k)}}{\partial x}(a, b) \cdot h + \frac{\partial g^{(h,k)}}{\partial y}(a, b) \cdot k =$$

$$= \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) \cdot h + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) \cdot k \right) \cdot h + \left( \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) \cdot h + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) \cdot k \right) \cdot k.$$

Criteriul lui Young ne asigură că derivatele parțiale mixte ale lui  $f$  în punctul  $(a, b)$  sînt egale; deci:

$$d^2 f(a, b)(h, k) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) \cdot h^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) \cdot hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) \cdot k^2. \quad \blacksquare$$

**3.3.4 Observații.** 1). Ținînd cont de notațiile  $dx(h, k) = h, dy(h, k) = k$  (vezi observația 3.2.7, 3)) putem scrie funcțional relația de mai sus:

$$d^2 f(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot (dx)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \cdot dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \cdot (dy)^2$$

unde toate derivatele de ordin doi ale lui  $f$  sînt calculate în punctul  $(a, b)$ .

2). Fie acum  $k$  oarecare și  $l = 1$ ; presupunem că  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  este diferențiabilă pe  $\mathring{A}$  și fie  $a \in \mathring{A}$ . Presupunem că,  $\forall h = (h_1, \dots, h_k) \in \mathbb{R}^k$

funcția  $g^h : \mathring{A} \rightarrow \mathbb{R}, g^h(x) = df(x)(h) = \sum_{j=1}^k \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \cdot h_j, \forall x \in \mathring{A}$ , este

diferențiabilă în  $a$  sau, echivalent, că,  $\forall j = 1, \dots, k$ , funcția  $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\cdot)$  este

diferențiabilă în  $a$ . Atunci  $d^2 f(a)(h) = dg^h(a)(h) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial g^h}{\partial x_i}(a) \cdot h_i$  de unde

$$d^2 f(a)(h) = \sum_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \cdot h_i h_j$$

Așa cum se constată diferențiala a doua este o formă pătratică în  $h$ .

Dacă trecem la scrierea funcțională

$$d^2 f(a) = \sum_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \cdot dx_i dx_j$$

3). În cazul general  $f = (f_1, \dots, f_l) : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l, \forall h \in \mathbb{R}^k$ , funcția  $g^h : \mathring{A} \rightarrow \mathbb{R}^l$  este definită prin  $g^h(x) = df(x)(h) = \begin{pmatrix} df_1(x)(h) \\ \vdots \\ df_l(x)(h) \end{pmatrix}$ . Rezultă

că funcția vectorială  $g^h$  are componentele scalare  $(g_1^h, \dots, g_l^h)$  unde,  $\forall j = 1, \dots, l, g_j^h(x) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) \cdot h_i$ . Funcția  $g^h$  este diferențiabilă în  $a$ ,  $\forall h \in \mathbb{R}^k$ , dacă și numai dacă  $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\cdot)$  este diferențiabilă în  $a$ ,  $\forall i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, l$ .

Atunci  $d^2 f(a)(h) = dg^h(a)(h) = J_{g^h}(a) \cdot h$ . Matricea jacobiană a funcției  $g^h$  este dată de

$$J_{g^h}(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1^h}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial g_1^h}{\partial x_k}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_l^h}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial g_l^h}{\partial x_k}(a) \end{pmatrix}$$

și deci

$$d^2 f(a)(h) = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^k \frac{\partial^2 f_1}{\partial x_1 \partial x_i}(a) \cdot h_i & \dots & \sum_{i=1}^k \frac{\partial^2 f_1}{\partial x_k \partial x_i}(a) \cdot h_i \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^k \frac{\partial^2 f_l}{\partial x_1 \partial x_i}(a) \cdot h_i & \dots & \sum_{i=1}^k \frac{\partial^2 f_l}{\partial x_k \partial x_i}(a) \cdot h_i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_k \end{pmatrix},$$

de unde

$$d^2 f(a)(h) = \begin{pmatrix} \sum_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f_1}{\partial x_i \partial x_j}(a) \cdot h_i h_j \\ \vdots \\ \sum_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f_l}{\partial x_i \partial x_j}(a) \cdot h_i h_j \end{pmatrix}, \forall h \in \mathbb{R}^k.$$

4). Așa cum am remarcat mai sus la punctele 2) și 3), diferențiabilitatea tuturor derivatelor parțiale de ordinul întâi ale unei funcții într-un punct echivalează cu faptul că funcția este diferențiabilă de două ori în acel punct. Atunci putem reformula criteriul lui Young:

*Dacă o funcție este diferențiabilă de două ori într-un punct atunci derivatele mixte de ordin doi ale funcției în acel punct coincid.*

5). Observăm o asemănare a formulei care dă diferențiala a doua cu formula de ridicare la pătrat și atunci introducem (pentru funcții scalare de



două variabile) notația:

$$d^2 f = \left( \frac{\partial}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial}{\partial y} \cdot dy \right)^{(2)} (f)$$

În formula de mai sus, numărul 2 de la exponent semnifică ridicarea la putere pentru  $dx$  și  $dy$  și derivatele de ordin doi ale lui  $f$  pentru  $\frac{\partial}{\partial x}$  și  $\frac{\partial}{\partial y}$ .

În cazul general se obține o formulă de diferențiere asemănătoare celei din cazul funcțiilor de două variabile

$$d^n f = \left( \frac{\partial}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial}{\partial y} \cdot dy \right)^{(n)} (f) = \sum_{i=0}^n C_n^i \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-i} \partial y^i} (dx)^{n-i} (dy)^i.$$

De exemplu, pentru  $n = 3$  obținem

$$d^3 f = \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} (dx)^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} (dx)^2 (dy) + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} (dx) (dy)^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} (dy)^3.$$

O formulă similară, care mimează ridicarea la putere, funcționează și în cazul general  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$d^n f = \left( \frac{\partial}{\partial x_1} \cdot dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_k} \cdot dx_k \right)^{(n)} (f).$$

6). Criteriile lui Schwarz și Young acoperă situații diferite. Astfel dacă o funcție îndeplinește condițiile din criteriul lui Young este diferențiabilă de două ori dar nu rezultă că derivatele sale mixte sînt continue. De asemenea este posibil ca o funcție să aibă derivate mixte continue într-un punct dar funcția să nu fie diferențiabilă de două ori.

O situație în care se aplică ambele criterii de egalitate a derivatelor parțiale mixte este prezentată mai jos.

**3.3.5 Definiție.** Fie  $D \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime deschisă; o funcție  $f : D \rightarrow \mathbb{R}^l$  este de clasă  $C^2$  pe  $D$  (notație:  $f \in C^2(D)$ ) dacă există toate derivatele parțiale de ordin doi ale tuturor funcțiilor de coordonate ale lui  $f$  și acestea sînt continue pe  $D$ .

Similar, spunem că  $f$  este de clasă  $C^n$  pe  $D$  și notăm  $f \in C^n(D)$  dacă funcțiile de coordonate ale lui  $f$  au toate derivatele parțiale pînă la ordinul  $n$  inclusiv și acestea sînt continue pe  $D$ .

**3.3.6 Observație.** Funcțiile de clasă  $C^2$  pe  $D$  îndeplinesc condițiile din criteriul lui Schwarz dar și pe acelea ale criteriului lui Young. Într-adevăr, putem aplica criteriul de diferențiabilitate (teorema 3.2.8) derivatelor parțiale de ordin întâi; rezultă că acestea sînt diferențiabile pe  $D$ . Deci pentru aceste funcții toate derivatele mixte de ordin doi coincid pe  $D$ .

**3.3.7 Teoremă.** *O funcție de clasă  $C^2$  pe  $D$  este diferențiabilă de două ori în toate punctele lui  $D$ .*

**Demonstrație.** Așa cum am remarcat mai sus, o funcție de clasă  $C^2$  are derivate parțiale de ordin întâi și acestea sînt diferențiabile în toate punctele lui  $D$ ; de aici rezultă că funcția este diferențiabilă de două ori pe  $D$ .

În mod similar se obține:

**3.3.8 Teoremă.** *O funcție de clasă  $C^n$  pe  $D$  este diferențiabilă de  $n$  ori în toate punctele mulțimii  $D$ .*

## 3.4 Formula lui Taylor

Vom începe cu o formă simplă a formulei lui Taylor, formă care este pusă în evidență de teorema lui Lagrange.

**3.4.1 Teoremă** (teorema lui Lagrange). *Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime deschisă și convexă și fie  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție diferențiabilă pe  $A$ ; atunci,  $\forall a, b \in A$ ,  $\exists c \in [a, b]$  a.î.*

$$\boxed{f(b) - f(a) = df(c)(b - a)}$$

**Demonstrație.** Deoarece  $f$  este diferențiabilă pe  $A$ , din corolarul 3.2.4, 2),  $f$  admite derivată în orice punct  $a \in A$  pe orice direcție  $u \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$  și  $\frac{df}{du}(a) = df(a)(u)$ .

Din teorema de medie (teorema 3.1.6),  $\forall a, b \in A$ ,  $\exists c \in [a, b]$  a.î.

$$f(b) - f(a) = \frac{df}{d(b-a)}(c)$$

( $A$  este mulțime convexă și deci condiția  $[a, b] \subseteq A$  este îndeplinită).

Rezultă că  $f(b) - f(a) = df(c)(b - a)$ . ■

**3.4.2 Observații.** 1). Dacă  $a = (a_1, \dots, a_k), b = (b_1, \dots, b_k)$ , relația din teoremă se poate scrie dezvoltat (vezi și observația 3.2.7, 1))

$$f(b) - f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(c)(b_1 - a_1) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_k}(c)(b_k - a_k).$$

Pentru cazul  $k = 2$  formula revine la

$$f(b) - f(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(c)(b_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(c)(b_2 - a_2).$$

2). Teorema lui Lagrange se poate reformula:

Fie  $a \in A; \forall x \in A, \exists c_x \in [a, x]$  a.î.

$$f(x) = f(a) + df(c_x)(x - a).$$

În această variantă obținem o formulă de tip Taylor de ordin zero cu restul  $R_0(f, x) = df(c_x)(x - a)$ .

Prezentăm acum formula lui Taylor în forma sa generală.

**3.4.3 Teoremă** (formula lui Taylor). Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime deschisă și convexă,  $a \in A$  și  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție diferențiabilă de  $(n + 1)$  ori pe  $A$  (în particular  $f \in C^{n+1}(A)$ );  $\forall x \in A, \exists c \in [a, x]$  a.î.

$$f(x) = f(a) + \frac{1}{1!}df(a)(x-a) + \dots + \frac{1}{n!}d^n f(a)(x-a) + \frac{1}{(n+1)!}d^{n+1}f(c)(x-a).$$

**Demonstrație.**  $\forall x \in A, [a, x] \subseteq A$ ; în plus, deoarece  $a$  și  $x$  sînt puncte interioare lui  $A$ ,  $\exists r > 0$  a.î.  $S(a, r) \subseteq A$  și  $S(x, r) \subseteq A$ . Atunci

$a + t(x - a) \in S(a, r) \subseteq A \Leftrightarrow -\frac{r}{\|x - a\|} < t < \frac{r}{\|x - a\|}$  iar  
 $a + t(x - a) \in S(x, r) \subseteq A \Leftrightarrow 1 - \frac{r}{\|x - a\|} < t < 1 + \frac{r}{\|x - a\|}$ ; fie intervalul  
 deschis  $I = \left] -\frac{r}{\|x - a\|}, 1 + \frac{r}{\|x - a\|} \right[ \subseteq \mathbb{R}$ . Definim  $\varphi : I \rightarrow A$ ,

$$\varphi(t) = a + t(x - a) = (a_1 + t(x_1 - a_1), \dots, a_k + t(x_k - a_k)), \forall t \in I;$$

$\varphi(I)$  este un segment deschis din  $A$  care conține segmentul închis  $\varphi([0, 1]) = [a, x]$ . Funcția  $\varphi$  este derivabilă pe  $I$  (vezi observația 3.2.12, 3)) și

$$\varphi'(t) = \begin{pmatrix} \varphi'_1(t) \\ \vdots \\ \varphi'_k(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_1 + t(x_1 - a_1))' \\ \vdots \\ (a_k + t(x_k - a_k))' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - a_1 \\ \vdots \\ x_k - a_k \end{pmatrix} = x - a, \forall t \in I.$$

Rezultă că  $\varphi$  este derivabilă de oricâte ori pe  $I$  și  $\varphi^{(n)}(t) = 0 \in \mathbb{R}^k, \forall n \geq 2$ .

Să considerăm acum funcția  $h : I \rightarrow \mathbb{R}, h = f \circ \varphi$ . Așa cum am constatat într-unul dintre cazurile particulare de derivare a funcțiilor compuse (vezi 3.2.25, 2))  $h$  este derivabilă și,  $\forall t \in I$ ,

$$\begin{aligned} h'(t) &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\varphi(t)) \cdot \varphi'_1(t) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_k}(\varphi(t)) \cdot \varphi'_k(t) = \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi(t)) \cdot (x_i - a_i) = df(\varphi(t))(x - a). \end{aligned}$$

Deoarece  $f$  este diferențiabilă de două ori,  $\forall i = 1, \dots, k, \frac{\partial f}{\partial x_i}$  este diferențiabilă și putem aplica iar formula de derivare a funcțiilor compuse; rezultă că  $h$  este derivabilă de două ori și,  $\forall t \in I$ ,

$$h''(t) = \sum_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\varphi(t)) \cdot (x_i - a_i)(x_j - a_j) = d^2 f(\varphi(t))(x - a).$$

Rezultă din aproape în aproape că  $h$  este derivabilă de  $(n+1)$  ori pe  $I$  și

$$h^{(i)}(t) = d^i f(\varphi(t))(x - a), \forall t \in I, \forall i = 1, \dots, n+1.$$

Putem atunci să aplicăm funcției  $h$  formula lui Maclaurin pe intervalul  $I$ ; cum  $0, 1 \in \overset{\circ}{I} = I, \exists \theta \in ]0, 1[$  a.î.

$$h(1) = h(0) + \frac{h'(0)}{1!} + \dots + \frac{h^{(n)}(0)}{n!} + \frac{h^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}.$$

Fie atunci  $c = \varphi(\theta) \in [a, x]$ . Înlocuind în relația precedentă  $h(1) = f(x), h(0) = f(a), h^{(i)}(0) = d^i f(a)(x - a), \forall i = 1, \dots, n$  și  $h^{(n+1)}(\theta) = d^{n+1} f(c)(x - a)$ , obținem formula din enunțul teoremei. ■

**3.4.4 Corolar.** Fie  $A$  deschisă și convexă în  $\mathbb{R}^k, a \in A$  și  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție diferențiabilă de două ori pe  $A$ ; atunci,  $\forall x \in A, \exists c \in [a, x]$  a.î.

$$f(x) = f(a) + \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)(x_i - a_i) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(c)(x_i - a_i)(x_j - a_j).$$

**Demonstrație.** Într-adevăr în acest caz formula lui Taylor se scrie:

$$f(x) = f(a) + \frac{1}{1!}df(a)(x-a) + \frac{1}{2!}d^2f(c)(x-a)$$

Utilizăm acum formulele care dau diferențiala de ordin 1 (observația 3.2.7, 1)) și diferențiala de ordin 2 (observația 3.3.24, 3)) și obținem relația din enunțul corolarului. ■

**3.4.5 Observație.** În cazul  $k = 2$  reformulăm corolarul precedent:  
Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  deschisă și convexă,  $(a, b) \in A$  și  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție diferențiabilă de două ori pe  $A$ ; atunci,  $\forall (x, y) \in A, \exists (c, d)$  pe segmentul ce unește  $(a, b)$  cu  $(x, y)$  a.î.

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y-b) + \\ & + \frac{1}{2} \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(c, d)(x-a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(c, d)(x-a)(y-b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(c, d)(y-b)^2 \right]. \end{aligned}$$

## Capitolul 3

# Diferențiabilitatea funcțiilor de mai multe variabile

### 3.5 Puncte de extrem

Problema existenței punctelor de extrem pentru o funcție reală se rezolvă cu mijloace topologice; de exemplu teorema lui Weierstrass (corolarul 2.3.9) este un instrument util în rezolvarea acestei probleme.

Pentru a găsi efectiv punctele de extrem ale unei funcții trebuie însă să utilizăm, ca și în cazul funcțiilor de o variabilă, aparatul diferențial. Așa cum vom remarca, diferențiala întâi ne va oferi condiții necesare de extrem iar diferențiala a doua va da condiții suficiente.

**3.5.1 Definiție.** Fie funcția  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ .

Un punct  $a \in A$  este un punct de **minim local** pentru  $f$  dacă există o vecinătate a sa,  $V \in \mathcal{V}(a)$ , a.î.,  $\forall x \in V \cap A, f(x) \geq f(a)$

Un punct  $a \in A$  este un punct de **maxim local** pentru  $f$  dacă există o vecinătate a sa,  $V \in \mathcal{V}(a)$ , a.î.,  $\forall x \in V \cap A, f(x) \leq f(a)$

$a \in A$  este punct de **extrem local** dacă este punct de minim local sau punct de maxim local.

În cele ce urmează vom detalia condițiile necesare pentru ca un punct să fie punct de extrem local pentru funcții de două variabile, marcînd modificările necesare în cazul  $k > 2$ .

**3.5.2 Teoremă** (teorema lui Fermat).

Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  și  $(a, b) \in \overset{\circ}{A}$  un punct de extrem local pentru  $f$ .

- 1). Dacă  $f$  are derivate parțiale în  $(a, b)$  atunci acestea sînt nule.
- 2). Dacă  $f$  este diferențiabilă în  $(a, b)$  atunci  $df(a, b) = \underline{0}$  ceea ce revine la  $df(a, b)(h, k) = 0, \forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ .

**Demonstrație.** Fie  $(a, b)$  un punct de minim local pentru  $f$ .

Deoarece  $(a, b)$  este punct interior pentru  $A$  și punct de minim local pentru  $f$  putem determina un număr  $r > 0$  a.î.

1.  $S((a, b), r) \subseteq A$  și
2.  $f(x, y) \geq f(a, b), \forall (x, y) \in S((a, b), r)$ .

1). Definim funcția  $g : ]a-r, a+r[ \rightarrow \mathbb{R}$  prin  $g(t) = f(t, b), \forall t \in ]a-r, a+r[$ ; observăm că  $\forall t \in ]a-r, a+r[, (t, b) \in S((a, b), r) \subseteq A$  și deci funcția  $g$  este bine definită.

Funcția  $g$  verifică ipotezele teoremei lui Fermat pentru funcții reale de o variabilă reală. Într-adevăr,  $a$  este punct interior pentru mulțimea de definiție a funcției  $g$ . Din condiția 2.  $g(t) \geq g(a), \forall t \in ]a-r, a+r[$ ; deci  $a$  este punct de minim local pentru  $g$ . În plus, deoarece  $f$  are derivate parțiale în  $(a, b)$ ,  $g$  este derivabilă în  $a$  și  $g'(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ .

Aplicăm atunci teorema lui Fermat pentru  $g$  și obținem  $g'(a) = 0$ .

Rezultă deci că  $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0$ .

În mod asemănător se definește  $h : ]b-r, b+r[ \rightarrow \mathbb{R}, h(t) = f(a, t), \forall t \in ]b-r, b+r[$ , și se arată că  $h'(b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$ .

2). Dacă  $f$  este diferențiabilă în  $(a, b)$  atunci  $f$  are derivate parțiale în  $(a, b)$  și  $df(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)dy$ . Folosind punctul 1). rezultă că  $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$  și deci  $df(a, b) = \underline{0}$ . ■

**3.5.3 Observație.** Rezultatul teoremei precedente se extinde evident în cazul  $k > 2$ . Astfel, dacă  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  are un punct de extrem local în  $a \in \overset{\circ}{A}$  și  $f$  este diferențiabilă în  $a$  atunci  $df(a) = \underline{0}$ .

**3.5.4 Definiție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  și  $a \in \overset{\circ}{A}$  a.î.  $df(a) = \underline{0}$ ; atunci  $a$  se numește **punct critic** al funcției.

**3.5.5 Observații.** 1). Teorema lui Fermat spune că punctele de extrem local, interioare mulțimii de definiție a unei funcții, se găsesc printre punctele critice ale funcției.

Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  și  $a \in \mathring{A}$ ;  $a$  este punct critic pentru  $f$  dacă  $df(a)(h) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i = 0, \forall h = (h_1, \dots, h_k) \in \mathbb{R}^k$ . Dacă înlocuim,  $\forall i = 1, \dots, k$ , pe  $h$  cu  $e_i$ , obținem  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$ . Rezultă că  $a$  este punct critic pentru  $f$  dacă și numai dacă  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \forall i = 1, \dots, k$ .

Concluzia este că punctele critice ale lui  $f$  se obțin rezolvînd sistemul de  $k$  ecuații cu  $k$  necunoscute

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_k) = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_k) = 0 \end{cases}.$$

2). În cazul  $k = 2$  ecuația planului tangent într-un punct  $(a, b)$  în care funcția  $f$  este diferențiabilă este

$$z - f(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b).$$

Dacă punctul  $(a, b)$  este punct critic atunci  $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$  și deci ecuația planului tangent revine la  $z = f(a, b)$  ceea ce reprezintă un plan paralel cu planul  $xOy$ .

Rezultă că într-un punct de extrem local planul tangent la graficul funcției este paralel cu planul  $xOy$ . Această interpretare geometrică este în concordanță cu aceea de la funcții reale de o variabilă; amintim că, în cazul unei funcții de o variabilă, într-un punct de extrem local tangenta la graficul funcției era paralelă cu axa  $Ox$ .

3). Ca și la funcții de o variabilă, condiția ca un punct să fie punct critic este doar o condiție necesară nu și suficientă pentru ca el să fie punct de extrem.


Dacă considerăm, de exemplu, funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = xy, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$  atunci  $\frac{\partial f}{\partial x} = y, \frac{\partial f}{\partial y} = x$  și astfel singurul punct critic al funcției  $f$  este



punctul  $(0, 0)$ . Observăm însă că, în orice vecinătate a originii, se găsesc puncte  $(x, y)$  cu  $f(x, y) > 0 = f(0, 0)$  și puncte  $(x, y)$  cu  $f(x, y) < 0 = f(0, 0)$ . Rezultă că punctul critic  $(0, 0)$  nu este punct de extrem local.

**3.5.6 Definiție.** *Un punct critic care nu este punct de extrem pentru o funcție  $f$  se numește punct **șa** pentru  $f$ .*

Graficul unei funcții în vecinătatea unui punct șa arată, în cazul  $k = 2$ , ca în figura de mai jos.



Se observă că, în orice vecinătate a punctului  $(a, b, f(a, b))$ , graficul funcției are puncte situate deasupra și sub planul tangent  $(T)$ .

Pentru a selecta punctele de extrem din mulțimea punctelor critice avem nevoie de condiții suplimentare, condiții exprimabile prin intermediul diferențialei a doua. Pentru aceasta vom studia semnul diferențialei de ordin doi. Remarcăm că rezultatele următoare sînt valabile în cazul mai general al teoriei formelor pătratice.

**3.5.7 Definiție.** *Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție de două ori diferențiabilă în  $a \in \mathring{A}$ ; diferențiala a doua,  $d^2f(a)$ , este **pozitiv definită** dacă*

$$d^2f(a)(h) > 0, \forall h \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}.$$

$d^2f(a)$  este **negativ definită** dacă

$$d^2f(a)(h) < 0, \forall h \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$$

deci dacă  $(-d^2f(a))$  este pozitiv definită.

$d^2f(a)$  este **nedefinită** dacă  $\exists h, h' \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$  a.î.  $d^2f(a)(h) > 0$  și  $d^2f(a)(h') < 0$ .

**3.5.8 Observație.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție diferențiabilă de două ori în  $(a, b) \in \mathring{A}$ ; atunci, după propoziția 3.3.3, diferențiala a doua în punctul  $(a, b)$  este definită prin:

$$d^2f(a, b)(h, k) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)h^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)k^2, \forall (h, k) \in \mathbb{R}^2.$$

$$\text{Fie } M = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b), N = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b), P = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b).$$

Ținând cont că  $d^2f(a, b)(h, k) = Mh^2 + 2Nhk + Pk^2$  este un trinom de gradul doi în  $h$  și  $k$  se verifică ușor că:

$$d^2f(a, b)(h, k) > 0, \forall (h, k) \neq (0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} N^2 - M \cdot P < 0, \\ M > 0. \end{cases}$$

Rezultă deci că

$$d^2f(a, b) \text{ este pozitiv definită} \Leftrightarrow \begin{cases} N^2 - M \cdot P < 0, \\ M > 0. \end{cases}$$

Similar se arată că

$$d^2f(a, b) \text{ este negativ definită} \Leftrightarrow \begin{cases} N^2 - M \cdot P < 0, \\ M < 0. \end{cases}$$

și că

$$d^2f(a, b) \text{ este nedefinită} \Leftrightarrow N^2 - M \cdot P > 0.$$

În cazul general putem demonstra următoarea propoziție:

**3.5.9 Propoziție.**  $d^2f(a)$  este pozitiv definită dacă și numai dacă există un număr  $m > 0$  a.î.

$$d^2f(a)(h) \geq m \cdot \|h\|^2, \forall h \in \mathbb{R}^k.$$

Ⓢ **Demonstrație.** Suficiența condiției este evidentă; într-adevăr, din relația  $d^2f(a)(h) \geq m \cdot \|h\|^2, \forall h \in \mathbb{R}^k$  rezultă că  $d^2f(a)(h) > 0, \forall h \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ .

Să presupunem acum că  $d^2f(a)$  este pozitiv definită.

Fie  $C = \{h \in \mathbb{R}^k : \|h\| = 1\}$  “cercul” cu centrul în origine și rază 1 din  $\mathbb{R}^k$ ;  $C$  este mulțime mărginită și închisă, deci este o mulțime compactă (teorema 1.3.33).

$$d^2f(a) : C \rightarrow \mathbb{R}, d^2f(a)(h) = \sum_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j, \forall h = (h_1, \dots, h_k) \in C,$$

este o funcție continuă pe  $C$ . Rezultă atunci din teorema lui Weierstrass (corolarul 2.3.9) că există  $h^0 \in C$  a.î.  $d^2f(a)(h) \geq d^2f(a)(h^0)$ . Deoarece  $h^0 \neq 0$  ( $\|h^0\| = 1$ ),  $m = d^2f(a)(h^0) > 0$ .

Fie acum  $h \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ ; atunci  $\frac{1}{\|h\|} \cdot h \in C$  de unde rezultă că

$$d^2f(a) \left( \frac{1}{\|h\|} \cdot h \right) \geq m.$$

Dar  $d^2f(a) \left( \frac{1}{\|h\|} \cdot h \right) = \frac{1}{\|h\|^2} \cdot d^2f(a)(h)$  de unde obținem

$$d^2f(a)(h) \geq m \cdot \|h\|^2, \forall h \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}.$$

Deoarece inegalitatea este evidentă pentru  $h = 0$ , rezultă că ea este verificată pentru orice  $h \in \mathbb{R}^k$ . ■

Sîntem acum în măsură să prezentăm condiții suficiente de extrem pentru funcții reale de mai multe variabile.

**3.5.10 Teoremă.** Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime deschisă și convexă, fie  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție de clasă  $C^2$  pe  $A$  și fie  $a \in A$  un punct critic pentru  $f$  ( $df(a) = \underline{0}$ ).

1). Dacă  $d^2f(a)$  este pozitiv definită atunci  $a$  este un punct de minim local pentru  $f$ .

2). Dacă  $d^2f(a)$  este negativ definită atunci  $a$  este un punct de maxim local pentru  $f$ .

3). Dacă  $d^2f(a)$  este nedefinită atunci  $a$  nu este un punct de extrem local pentru  $f$ .

**Demonstrație.** Aplicăm funcției  $f$  formula lui Taylor de ordin 1 (corolarul 3.4.4); rezultă că,  $\forall x \in A, \exists c_x \in [a, x]$  a.î.

$$f(x) - f(a) = df(a)(x - a) + \frac{1}{2} \cdot d^2f(c_x)(x - a).$$

Deoarece  $a$  este punct critic pentru  $f$ ,  $df(a) = \underline{0}$  și astfel relația de mai sus se scrie:

$$(1) \quad f(x) - f(a) = \frac{1}{2} \cdot d^2f(a)(x - a) + \frac{1}{2} \cdot \underbrace{[d^2f(c_x)(x - a) - d^2f(a)(x - a)]}_E.$$

Fie  $x \in A \setminus \{a\}$ ; vom exprima în alt fel paranteza pătrată  $E$  din relația (1) de mai sus.

$$\begin{aligned} E &= \sum_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(c_x)(x_i - a_i)(x_j - a_j) - \sum_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)(x_i - a_i)(x_j - a_j) = \\ &= \sum_{i,j=1}^k \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(c_x) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right] (x_i - a_i)(x_j - a_j) = \\ &= \sum_{i,j=1}^k \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(c_x) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right] \cdot \frac{x_i - a_i}{\|x - a\|} \cdot \frac{x_j - a_j}{\|x - a\|} \cdot \|x - a\|^2. \end{aligned}$$

Definim acum funcția  $\alpha : A \rightarrow \mathbb{R}$  prin

$$\alpha(x) = \begin{cases} \sum_{i,j=1}^k \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(c_x) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right] \cdot \frac{x_i - a_i}{\|x - a\|} \cdot \frac{x_j - a_j}{\|x - a\|} & , x \neq a \\ 0 & , x = a \end{cases}.$$

Atunci relația (1) se scrie

$$(2) \quad f(x) - f(a) = \frac{1}{2} \cdot d^2 f(a)(x - a) + \frac{1}{2} \cdot \alpha(x) \cdot \|x - a\|^2.$$

1). Să presupunem acum că  $d^2 f(a)$  este pozitiv definită; din propoziția 3.5.9, există  $m > 0$  a.î.  $d^2 f(a)(h) \geq m\|h\|^2, \forall h \in \mathbb{R}^k$ . Deoarece  $f \in C^2(A)$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(c_x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a), \forall i, j = 1, \dots, k$  și cum  $\frac{x_i - a_i}{\|x - a\|} \cdot \frac{x_j - a_j}{\|x - a\|} \leq 1$  rezultă că  $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = \alpha(a) = 0$ .

Atunci există o sferă deschisă  $S(a, r)$  a.î.,  $\forall x \in S(a, r), -\frac{m}{2} < \alpha(x) < \frac{m}{2}$ .

Din (2) obținem

$$f(x) - f(a) \geq \frac{m}{2}\|x - a\|^2 - \frac{m}{4}\|x - a\|^2 = \frac{m}{4}\|x - a\|^2 \geq 0, \forall x \in S(a, r),$$

ceea ce arată că  $a$  este un punct de minim local pentru  $f$ .

2). Cum  $d^2 f(a)$  este negativ definită,  $(-d^2 f(a))$  este pozitiv definită și deci există  $m > 0$  a.î.  $d^2 f(a)(h) \leq (-m)\|h\|^2, \forall h \in \mathbb{R}^k$ . În continuare demonstrația se face la fel ca la punctul precedent.

3).  $d^2f(a)$  fiind nedefinită, există  $h, h' \in \mathbb{R}^k$  a.î.  $d^2f(a)(h) > 0$  și  $d^2f(a)(h') < 0$ . Fie  $\delta > 0$  a.î.  $\forall t \in (-\delta, \delta), x = a + th, x' = a + th' \in A$  ( $a$  este punct interior pentru  $A$ ).

Înlocuind în relația (2) și ținând cont că  $d^2f(a)(th) = t^2 d^2f(a)(h), \forall t \in \mathbb{R}, \forall h \in \mathbb{R}^k$ , obținem,  $\forall t \in (-\delta, \delta)$ :

$$f(a + th) - f(a) = \frac{1}{2} \cdot d^2f(a)(h) \cdot t^2 + \frac{1}{2} \cdot \alpha(a + th) \cdot t^2 \cdot \|h\|^2,$$

$$f(a + th') - f(a) = \frac{1}{2} \cdot d^2f(a)(h') \cdot t^2 + \frac{1}{2} \cdot \alpha(a + th') \cdot t^2 \cdot \|h'\|^2.$$

Deoarece  $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$ , putem găsi  $r$  a.î.  $0 < r < \delta$  și  $\forall t \in (-r, r)$ ,  $-\frac{1}{2} \cdot d^2f(a)(h) < \alpha(a + th) \cdot \|h\|^2$  iar  $\alpha(a + th') \cdot \|h'\|^2 < -\frac{1}{2} \cdot d^2f(a)(h')$ . Rezultă atunci că  $\forall t \in (-r, r)$ ,

$$f(a + th) - f(a) > \frac{1}{4} \cdot d^2f(a)(h) \cdot t^2 > 0$$

iar

$$f(a + th') - f(a) < \frac{1}{4} \cdot d^2f(a)(h') \cdot t^2 < 0.$$

Deci în orice vecinătate a punctului  $a$  găsim și valori ale lui  $f$  mai mari ca  $f(a)$  și valori mai mici ca  $f(a)$ . Rezultă că  $a$  nu este punct de extrem local pentru  $f$ . ■

În cazul particular  $k = 2$  condițiile din teorema precedentă se pot pune sub o formă ușor de verificat în cazuri concrete.

**3.5.11 Corolar.** Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  o mulțime deschisă și convexă,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție de clasă  $C^2$  pe  $A$  și fie  $(a, b) \in A$  un punct critic pentru  $f$ .

$$\text{Notăm } M = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b), N = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b), P = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b).$$

- 1). Dacă  $N^2 - MP < 0$  și  $M > 0$  atunci  $(a, b)$  este punct de minim local.
- 2). Dacă  $N^2 - MP < 0$  și  $M < 0$  atunci  $(a, b)$  este punct de maxim local.
- 3). Dacă  $N^2 - MP > 0$  atunci  $(a, b)$  nu este punct de extrem local.

**Demonstrație.** Concluzia corolarului rezultă din teorema precedentă și din observația 3.5.8.

Vom da în cazul general, fără demonstrație, condiții suficiente de extrem.

**3.5.12 Definiție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție diferențiabilă de două ori în  $a \in \overset{\circ}{A}$ ; atunci matricea

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_k}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_k}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}(a) \end{pmatrix}$$

se numește **hessiana** lui  $f$  în  $a$  (de la numele matematicianului german Ludwig Otto Hess (1811-1874)).

**3.5.13 Corolar** (condițiile lui Sylvester<sup>1</sup>). Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime deschisă și convexă,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție de clasă  $C^2$  pe  $A$ ,  $a \in A$  un punct critic

pentru  $f$  și  $d_1 = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a)$ ,  $d_2 = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) \end{vmatrix}$ , ...,  $d_k = \det(H_f(a))$ ,  
minorii principali ai matricii hessiene.

1). Dacă  $d_1, d_2, \dots, d_k$  sînt toți pozitivi atunci  $a$  este un punct de minim local pentru  $f$ .

2). Dacă  $-d_1, d_2, \dots, (-1)^k d_k$  sînt toți pozitivi atunci  $a$  este un punct de maxim local pentru  $f$ .

Sînt situații în care, așa cum vom remarca în exemplul următor, corolarul precedent nu este aplicabil.

**3.5.14 Exemplu.** Fie funcția  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y, z) = x^5 + y^5 + z^5 - 5xyz$ ,  $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Pentru a găsi punctele critice ale funcției  $f$  rezolvăm sistemul obținut din anularea derivatelor parțiale ale funcției.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 5x^4 - 5yz = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 5y^4 - 5xz = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 5z^4 - 5xy = 0 \end{cases} .$$

<sup>1</sup>James Joseph Sylvester (1814-1897), matematician englez.

Mulțimea soluțiilor sistemului este  $S = \{(1, 1, 1), (-1, -1, -1), (0, 0, 0)\}$ .

Derivatele parțiale de ordin doi sînt:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 20x^3 & , & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -5z \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 20y^3 & , & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = -5y \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 20z^3 & , & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = -5x \end{cases}$$

Deci matricea hessiană asociată lui  $f$  în punctul critic  $(1, 1, 1) \in A$  este

$$H_1 = \begin{pmatrix} 20 & -5 & -5 \\ -5 & 20 & -5 \\ -5 & -5 & 20 \end{pmatrix}. \text{ Minorii principali ai acestei matrici sînt pozitivi}$$

deci  $(1, 1, 1)$  este un punct de minim local pentru  $f$ .

Matricea hessiană asociată lui  $f$  în punctul critic  $(-1, -1, -1) \in A$  este

$$H_2 = \begin{pmatrix} -20 & 5 & 5 \\ 5 & -20 & 5 \\ 5 & 5 & -20 \end{pmatrix}. \text{ Aici } d_1 < 0, d_2 > 0 \text{ iar } d_3 < 0. \text{ Deci } (-1, -1, -1)$$

este un punct de maxim local pentru  $f$ .

Matricea hessiană în  $(0, 0, 0)$  este matricea nulă; deci corolarul precedent nu poate preciza natura acestui punct critic.

$f(0, 0, 0) = 0$  iar  $f(x, x, x) = 3x^5 - 5x^3 = x^3(3x^2 - 5)$ . Se observă că, pe orice vecinătate  $V$  a originii și  $\forall (x, x, x) \in V$ ,  $f(x, x, x)$  ia valori pozitive dacă  $x < 0$  și valori negative dacă  $x > 0$ . Rezultă că acest punct critic este un punct șa.

# Diferențiabilitatea funcțiilor de mai multe variabile

## 104



Oricare ar fi  $y = (y_1, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k$  sistemul

[illegible]

Deci  $T$  este un operator liniar și bijectiv.

$df(a)$  este bijectiv dacă și numai dacă  $k = l$  și  $J_f(a)$  este nesară; aceasta înseamnă că jacobianul lui  $f$  în  $a$ ,  $\frac{D(f_1, \dots, f_k)}{D(x_1, \dots, x_k)}(a) = \det J_f(a)$ , este diferit de zero.

**3.6.4 Observație.** Criteriul de diferențiabilitate ne asigură că orice difeomorfism între două mulțimi deschise  $U$  și  $V$  este o aplicație diferențiabilă în toate punctele mulțimii  $U$ ; inversa acestei aplicații este de asemenea difeomorfism între  $V$  și  $U$  și deci este diferențiabilă pe  $V$ .

Teorema următoare caracterizează difeomorfismele utilizând proprietatea de bijectivitate a diferențialei.

**3.6.5 Teoremă.** Fie  $U$  și  $V$  doi deschiși din  $\mathbb{R}^k$  și fie  $f : U \rightarrow V$  o aplicație bijectivă de clasă  $C^1$  pe  $U$  ( $f \in C^1(U)$ ).

Funcția  $f$  este un difeomorfism între  $U$  și  $V$  dacă și numai dacă

1.  $f^{-1} : V \rightarrow U$  este continuă pe  $V$  și
2.  $df(a) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  este operator liniar și bijectiv, oricare ar fi  $a \in U$ .

**Demonstrație.** Necesitatea. Dacă  $f$  este difeomorfism între  $U$  și  $V$  atunci, din observația precedentă,  $f^{-1} : V \rightarrow U$  este diferențiabilă pe  $V$  și deci este continuă pe  $V$ .

$f^{-1} \circ f = \text{id}_U : U \rightarrow U, \text{id}_U(x) = x, \forall x \in U$  (aplicația identică pe  $U$ );  $\text{id}_U$  este diferențiabilă pe  $U$  și, oricare ar fi  $a \in U, d(\text{id}_U)(a) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  este aplicația identică pe  $\mathbb{R}^k$  ( $\text{id}_{\mathbb{R}^k} : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k, \text{id}_{\mathbb{R}^k}(h) = h, \forall h \in \mathbb{R}^k$ ). Matricea asociată acestui operator liniar (matricea jacobiană a sa) este matricea

$$\text{unitate } I_k = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Deoarece  $f$  și  $f^{-1}$  sunt diferențiabile ( $f$  este difeomorfism) putem aplica formula de diferențiere a funcțiilor compuse:

$$\text{id}_{\mathbb{R}^k} = d(\text{id}_U)(a) = d(f^{-1})(f(a)) \circ df(a).$$

Matricile jacobiene asociate acestor operatori se vor găsi atunci în relația:

$$I_k = J_{f^{-1}}(f(a)) \cdot J_f(a),$$

de unde

$$1 = \det I_k = \det J_{f^{-1}}(f(a)) \cdot \det J_f(a).$$

De aici rezultă că  $\det J_f(a) \neq 0$  și deci că  $J_f(a)$  este nesingulară. Observația 3.6.2 ne asigură atunci că  $df(a) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  este operator liniar și bijectiv.

Suficiența. Fie  $f : U \rightarrow V$  o bijecție de clasă  $C^1$  pe  $U$  astfel încât  $f^{-1}$  este continuă pe  $V$  și, oricare ar fi  $a \in U, df(a) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  este operator liniar și bijectiv. Pentru a demonstra că  $f$  este difeomorfism între  $U$  și  $V$  este suficient să arătăm că  $f^{-1} \in C^1(V)$ .

Vom demonstra întâi că  $f^{-1}$  este diferențiabilă pe  $V$ .

Fie  $b \in V$  un punct arbitrar și fie  $a = f^{-1}(b) \in U$ ; deoarece  $f \in C^1(U)$ ,  $f$  este diferențiabilă pe  $U$  și deci  $f$  este diferențiabilă în  $a$ . Rezultă că există  $\alpha : U \rightarrow \mathbb{R}^k$  continuă și nulă în  $a$  astfel încât

$$(1) \quad f(x) = f(a) + df(a)(x - a) + \|x - a\| \cdot \alpha(x), \forall x \in U.$$

Vom nota  $df(a) = T$ ; din ipoteză  $T$  este un operator liniar și bijectiv pe  $\mathbb{R}^k$ .

Oricare ar fi  $y \in V$  există  $x \in U$  astfel încât  $f(x) = y$  și atunci, din (1), obținem:

$$(2) \quad y - b = T(x - a) + \|x - a\| \cdot \alpha(x).$$

Aplicația  $T^{-1} : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  este de asemenea operator liniar și, aplicând  $T^{-1}$  în relația (2), obținem:

$$(3) \quad T^{-1}(y) - T^{-1}(b) = x - a + \|x - a\| \cdot T^{-1}(\alpha(x)),$$

sau

$$(4) \quad x - a = T^{-1}(y) - T^{-1}(b) - \|x - a\| \cdot T^{-1}(\alpha(x)).$$

Deoarece  $T^{-1}$  este aplicație liniară ea este lipschitziană și deci există o constantă  $L > 0$  astfel încât  $\|T^{-1}(y) - T^{-1}(b)\| \leq L \cdot \|y - b\|$ . Aplicând norma în relația (4) și folosind inegalitatea precedentă obținem:

$$\|x - a\| \leq L \cdot \|y - b\| + \|x - a\| \cdot \|T^{-1}(\alpha(x))\|,$$

de unde

$$(5) \quad \frac{\|x - a\|}{\|y - b\|} \leq \frac{L}{1 - \|T^{-1}(\alpha(x))\|}.$$

Observăm că  $x = f^{-1}(y)$  și, deoarece  $f^{-1}$  este continuă,  $y \rightarrow b \implies x = f^{-1}(y) \rightarrow f^{-1}(b) = a$ ; atunci

$$(6) \quad \lim_{y \rightarrow b} \|T^{-1}(\alpha(x))\| = \|T^{-1}(\alpha(a))\| = 0$$

și deci există  $\delta > 0$  astfel încât

$$\|T^{-1}(\alpha(f^{-1}(y)))\| < \frac{1}{2}, \forall y \in S(b, \delta).$$

Din (5) rezultă

$$(7) \quad \frac{\|x - a\|}{\|y - b\|} < 2L, \forall y \in S(b, \delta).$$

Relația (4) se poate rescrie

$$(8) \quad f^{-1}(y) = f^{-1}(b) + T^{-1}(y - b) - \|x - a\| \cdot T^{-1}(\alpha(x)).$$

Fie funcția  $\beta : V \rightarrow \mathbb{R}^k$  definită prin

$$\beta(y) = \begin{cases} \frac{1}{\|y - b\|} \cdot [f^{-1}(y) - f^{-1}(b) - T^{-1}(y - b)] & , y \neq b \\ 0 & , y = b \end{cases}.$$

Atunci, din (7),

$$(9) \quad \beta(y) = -\frac{\|x - a\|}{\|y - b\|} \cdot T^{-1}(\alpha(x)).$$

Din (6) și (7) rezultă că  $\lim_{y \rightarrow b} \beta(y) = 0 = \beta(b)$  iar din definiția lui  $\beta$

$$(10) \quad f^{-1}(y) = f^{-1}(b) + T^{-1}(y - b) + \|y - b\| \cdot \beta(y), \forall y \in V,$$

ceea ce arată că  $f^{-1}$  este diferențiabilă în  $b$ , oricare ar fi  $b \in V$ . Deci  $f^{-1}$  este diferențiabilă pe  $V$ .

Deoarece  $f \circ f^{-1} = \text{id}_V$ , aplicând formula de diferențiere a compunerii,

$$(11) \quad J_f(f^{-1}(y)) \cdot J_{f^{-1}}(y) = I_k, \forall y \in V.$$

Deoarece  $df(f^{-1}(y))$  este bijectivă,  $J_f(f^{-1}(y))$  este nesingulară și deci inversabilă. Din relația (11) deducem:

$$(12) \quad J_{f^{-1}}(y) = [J_f(f^{-1}(y))]^{-1}, \forall y \in V.$$

Elementele matricii  $J_f(f^{-1}(y))$  sunt de forma  $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \circ f^{-1}\right)(y)$ ;  $f^{-1}$  fiind continuă, acestea vor fi funcții continue de variabila  $y$ , oricare ar fi  $i, j = 1, \dots, k$  (am notat  $f = (f_1, \dots, f_k)$  și am ținut cont că  $f \in C^1(U)$ , deci că  $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$  sunt continue pe  $U$ ). Ținând cont de modul în care se construiește inversa unei matrici rezultă din (12) că elementele matricii  $J_{f^{-1}}(y)$  sunt funcții continue de  $y$  pe  $V$  deci că  $f^{-1} \in C^1(V)$ .

Astfel rezultă că  $f$  este un difeomorfism între deschișii  $U$  și  $V$ . ■

**3.6.6 Observație.** Relația (12) din demonstrația teoremei precedente ne arată că, oricare ar fi  $y \in V$ ,  $df^{-1}(y) = [df(f^{-1}(y))]^{-1}$ .

În general aplicațiile  $f : U \rightarrow V$  pe care le întâlnim în practică nu sunt aplicații bijective astfel încât nu este în general posibil să definim inversa lui  $f$  pe mulțimea  $V$ . Ne punem problema dacă această funcție nu poate fi inversată măcar local, pe vecinătatea unor puncte din  $U$ . Teorema următoare dă condiții suficiente în care o astfel de inversare locală este posibilă.

**3.6.7 Teoremă** (teorema de inversare locală). *Fie  $D$  un deschis din  $\mathbb{R}^k$  și fie  $f : D \rightarrow \mathbb{R}^k$ ,  $f \in C^1(D)$ .*

*Dacă  $a \in D$  este un punct în care  $df(a) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  este bijectivă atunci există o mulțime deschisă  $U$  în  $\mathbb{R}^k$ ,  $a \in U \subseteq D$ , așa fel încât  $V = f(U)$  este deschisă și  $f$  este un difeomorfism între  $U$  și  $V$ .*

Demonstrația teoremei precedente este destul de laborioasă și nu o vom prezenta.

**3.6.8 Observații.** (i) Să remarcăm că, în ipotezele teoremei,  $f$  este inversabilă local pe  $U$  și  $f^{-1}$  este de clasă  $C^1$  pe mulțimea deschisă  $V$ , vecinătate a punctului  $f(a)$ . Oricare ar fi  $y \in V$ , există un punct unic  $x \in U$  așa fel încât  $f(x) = y$ ;  $f$  este diferențiabilă pe  $U$  și atunci, din teorema 3.6.5,  $df(x)$  este o bijecție.

(ii) Să presupunem  $k = 1$ ; în acest caz  $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  este de clasă  $C^1$  pe  $D$  dacă  $f$  este derivabilă și are derivată continuă pe  $D$ . Fie  $a \in D$  astfel încât  $df(a) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  să fie bijectivă. Deoarece  $df(a)(h) = f'(a) \cdot h$ ,  $\forall h \in \mathbb{R}$ ,  $df(a)$  este bijectivă dacă și numai dacă  $f'(a) \neq 0$ . Deci în acest caz teorema precedentă se formulează astfel: *Dacă  $f$  este de clasă  $C^1$  pe  $D$  atunci pentru orice punct  $a \in D$  pentru care  $f'(a) \neq 0$  există o vecinătate deschisă  $U$  așa fel încât restricția lui  $f$  la  $U$  este inversabilă și are inversa derivabilă. În plus  $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$ .*

**3.6.9 Exemplu.** Să rezolvăm sistemul

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = y_1 \\ x_1^2 - x_2^2 = y_2 \end{cases}$$

unde  $y_1, y_2$  sunt numere arbitrare în  $\mathbb{R}$  dar fixate.


Sistemul de mai sus poate fi transformat într-o ecuație vectorială. Definim  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  prin  $f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2, x_1^2 - x_2^2)$  și atunci sistemul de mai sus este echivalent cu ecuația vectorială  $f(x) = y$ , unde  $x = (x_1, x_2)$  iar  $y = (y_1, y_2)$ .

Observăm că  $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$  și că

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ 2x_1 & -2x_2 \end{pmatrix}, \forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Rezultă că  $df(a)$  este bijectivă dacă și numai dacă  $J_f(a)$  este nesingulară ceea ce revine la  $-8a_1a_2 \neq 0$  ( $a = (a_1, a_2)$ ). Deci  $df(a)$  este bijectivă dacă și numai dacă  $a$  nu se găsește pe axele de coordonate.

Să luăm un punct  $a$  din cadranul I ( $a_1 > 0, a_2 > 0$ ); atunci putem considera  $U = \{(x_1, x_2) : x_1 > 0, x_2 > 0\}$  (întreg cadranul I). Din sistem rezultă că  $\frac{y_1+y_2}{2} = x_1^2 > 0$  și  $\frac{y_1-y_2}{2} = x_2^2 > 0$ ; de aici  $f(U) = V$  unde  $V = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : -y_1 < y_2 < y_1\}$ .



Restricția funcției  $f$  la  $U$  este inversabilă și  $f^{-1} : V \rightarrow U$  este definită prin

$$f^{-1}(y_1, y_2) = \left( \sqrt{\frac{y_1 + y_2}{2}}, \sqrt{\frac{y_1 - y_2}{2}} \right).$$

### 3.7 Funcții definite implicit

Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^2$ ,  $F : A \rightarrow \mathbb{R}$  și  $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{A}$  a.î.  $F(x_0, y_0) = 0$ . Ne punem problema găsirii de condiții în care, local (pe o vecinătate a punctului  $(x_0, y_0)$ ), să putem rezolva ecuația  $F(x, y) = 0$  obținându-l pe  $y$  funcție de  $x$ .

Mai exact, ne interesează în ce condiții putem găsi două intervale deschise  $I, J \subseteq \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in I, y_0 \in J, I \times J \subseteq A$  și o funcție  $\varphi : I \rightarrow J$  a.î.

$$\{(x, y) \in I \times J : F(x, y) = 0\} = \{(x, \varphi(x)) : x \in I\}.$$

Observăm că membrul doi din relația de mai sus este graficul funcției  $\varphi$ ; astfel problema se poate formula astfel: în ce condiții mulțimea  $\{(x, y) \in I \times J : F(x, y) = 0\}$  reprezintă graficul unei funcții ?

În cazul în care există o astfel de funcție  $\varphi$  ea se numește funcție definită **implicit** sau funcție **implicită**.

Ne interesează deci să vedem în ce condiții ecuația  $F(x, y) = 0$  definește local o funcție implicită; în cazul în care această funcție există, este ea derivabilă ?

Exemplul următor arată că nu putem explicita ecuația  $F(x, y) = 0$  în vecinătatea oricărui punct.

**3.7.1 Exemplu.** Fie  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, F(x, y) = x^2 + y^2 - 1, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ .

1). Fie  $(x_0, y_0) = (0, 1)$  atunci există  $I = (-1, 1), J = (0, 2), 0 \in I, 1 \in J$  și există funcția  $\varphi : I \rightarrow J, \varphi(x) = \sqrt{1 - x^2}, \forall x \in I$  a.î.

$$\{(x, y) \in I \times J : F(x, y) = 0\} = \{(x, \varphi(x)) : x \in I\}.$$

2). Fie acum  $(x_0, y_0) = (1, 0)$ ; să presupunem că există intervalele deschise  $I, J \subseteq \mathbb{R}, 1 \in I, 0 \in J$  și că există o funcție  $\varphi : I \rightarrow J$  a.î.  
 $\{(x, y) \in I \times J : F(x, y) = 0\} = \{(x, \varphi(x)) : x \in I\}.$

Atunci există  $n \in \mathbb{N}$  a.î.,  $x_n = \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} \in I$ , iar  $-\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \in J$  și astfel  $(x_n, -\frac{1}{n}), (x_n, \frac{1}{n}) \in \{(x, y) \in I \times J : F(x, y) = 0\}$ ;  
 rezultă atunci că  $\varphi(x_n) = -\frac{1}{n}$  și  $\varphi(x_n) = \frac{1}{n}$ , ceea ce este absurd.

Formulăm următoarea teoremă de existență și derivabilitate pentru funcții de o variabilă definite implicit.

**3.7.2 Teoremă** (teorema funcțiilor implicite). Fie  $D \subseteq \mathbb{R}^2$  o mulțime deschisă,  $F : D \rightarrow \mathbb{R}$  și  $(x_0, y_0) \in D$  a.î. să fie verificate următoarele condiții:

- 1).  $F(x_0, y_0) = 0$ ,
- 2).  $F \in C^1(D)$ ,
- 3).  $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ .

Atunci există intervalele deschise  $I, J \subseteq \mathbb{R}$  cu  $(x_0, y_0) \in I \times J \subseteq D$  și există o funcție  $\varphi : I \rightarrow J$  cu proprietățile:

- a).  $\{(x, y) \in I \times J : F(x, y) = 0\} = \{(x, \varphi(x)) : x \in I\}$ ,
- b).  $\varphi$  este de clasă  $C^1$  pe  $I$  și,  $\forall x \in I$ ,

$$\varphi'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))}.$$


**Demonstrație.** Vom prezenta două demonstrații pentru această teoremă.

I. Prima demonstrație se bazează pe proprietatea de semn local a funcțiilor continue și pe proprietatea lui Darboux (o funcție continuă care ia valori de semn contrar la capetele unui interval se anulează pe acel interval).

Deoarece  $\frac{\partial F}{\partial y}$  este continuă pe  $D$  și  $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$  atunci există o vecinătate a lui  $(x_0, y_0)$  pe care  $\frac{\partial F}{\partial y}$  are același semn ca în  $(x_0, y_0)$ ; să presupunem că acest semn este pozitiv.

Fie deci  $I_1 = [a, b]$  și  $J = [c, d]$  astfel încât

$$(x_0, y_0) \in (a, b) \times (c, d) \subseteq I_1 \times J \subseteq D \text{ și } \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) > 0, \forall (x, y) \in (a, b) \times (c, d).$$



Fie  $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(y) = F(x_0, y)$ ; atunci  $g$  este derivabilă pe  $[c, d]$  și  $g'(y) = \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y), \forall y \in [c, d]$ .

Rezultă că funcția  $g$  este strict crescătoare pe  $[c, d]$  și, cum  $g(y_0) = F(x_0, y_0) = 0$ ,  $g(c) < 0 < g(d)$ .

Funcțiile  $h_c, h_d : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $h_c(x) = F(x, c)$ ,  $h_d(x) = F(x, d)$ ,  $\forall x \in [a, b]$  sunt continue și

$$h_c(x_0) = F(x_0, c) = g(c) < 0 < g(d) = F(x_0, d) = h_d(x_0).$$

Rezultă că există o vecinătate a punctului  $x_0$  pe care funcția  $h_c$  este negativă și  $h_d$  este pozitivă. Fie deci  $I$  un interval deschis a.î.  $x_0 \in I \subseteq (a, b)$  și

$$F(x, c) = h_c(x) < 0 < h_d(x) = F(x, d), \forall x \in I.$$

Deoarece pentru orice  $x \in I$   $F(x, \cdot)$  este o funcție continuă există  $\varphi(x) \in (c, d)$  astfel încât  $F(x, \varphi(x)) = 0$ . Pe de altă parte  $I \times (c, d) \subseteq (a, b) \times (c, d)$  și deci,





În particular, oricare ar fi  $x \in I$ ,  $(x, \varphi(x)) \in D$  și deci, înlocuind în relația precedentă pe  $y$  cu  $\varphi(x)$  și ținând cont că  $F(x, \varphi(x)) = 0 = F(x_1, y_1)$ , obținem

$$0 = \frac{\partial F}{\partial x}(x_1, y_1) \cdot (x - x_1) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_1, y_1) \cdot (\varphi(x) - \varphi(x_1)) + \\ + \alpha(x, \varphi(x)) \cdot \sqrt{(x - x_1)^2 + (\varphi(x) - \varphi(x_1))^2}, \forall x \in I$$

și, cum  $\frac{\partial F}{\partial y}(x_1, y_1) > 0$ ,

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(x_1)}{x - x_1} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_1, y_1)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_1, y_1)} - \gamma(x), \text{ unde} \\ \gamma(x) = \frac{\alpha(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_1, y_1)} \cdot \frac{\sqrt{(x - x_1)^2 + (\varphi(x) - \varphi(x_1))^2}}{x - x_1}.$$

Evident  $|\gamma(x)| \leq \frac{|\alpha(x, \varphi(x))|}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_1, y_1)}, \forall x \in I$ . Deoarece  $\varphi$  este continuă,  $\lim_{x \rightarrow x_1} \varphi(x) = \varphi(x_1) = y_1$  și deci  $\lim_{x \rightarrow x_1} \alpha(x, \varphi(x)) = \alpha(x_1, y_1) = 0$ ; rezultă că  $\lim_{x \rightarrow x_1} \gamma(x) = 0$  și deci

$$\lim_{x \rightarrow x_1} \frac{\varphi(x) - \varphi(x_1)}{x - x_1} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_1, y_1)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_1, y_1)}.$$

Cum  $x_1$  este arbitrar în  $I$ ,  $\varphi$  este derivabilă pe  $I$  și

$$\varphi'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))}, \forall x \in I.$$

Să observăm că  $\varphi$  este continuă pe  $I$  și că  $\frac{\partial F}{\partial x}$  și  $\frac{\partial F}{\partial y}$  sunt continue pe  $d$ ; atunci  $\varphi'$  este continuă pe  $I$  și deci  $\varphi \in C^1(I)$ .

Ⓢ II. Vom prezenta acum o demonstrație bazată pe teorema de inversare locală.

Fie  $f : D \rightarrow \mathbb{R}^2$  funcția definită prin  $f(x, y) = (x, F(x, y))$ , oricare ar fi  $(x, y) \in D$ . Observăm că  $f \in C^1(D)$ ,  $f(x_0, y_0) = (x_0, 0)$  și

$$\det(J_f(x_0, y_0)) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Rezultă că  $J_f(x_0, y_0)$  este nedegenerată și deci că  $df(x_0, y_0) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  este un operator liniar și bijectiv. Conform teoremei de inversare locală există un deschis  $U \subseteq \mathbb{R}^2$  astfel încât  $(x_0, y_0) \in U \subseteq D$ ,  $V = f(U)$  este un deschis din  $\mathbb{R}^2$  și  $f$  este un difeomorfism între  $U$  și  $V$ .

Putem presupune fără să restrângem generalitatea că  $U$  este un produs cartezian de două intervale deschise  $U = I' \times J$ ,  $x_0 \in I'$  și  $y_0 \in J$ .

Deoarece  $V$  este deschisă și  $f(x_0, y_0) = (x_0, 0) \in V$ , există un interval deschis  $I_1 \subseteq I'$  și un interval deschis  $J_1$  astfel încât  $(x_0, 0) \in I_1 \times J_1 \subseteq V$ .

$$(x_0, y_0) = f^{-1}(x_0, 0) \subseteq f^{-1}(I_1 \times J_1) \subseteq U.$$

Deoarece  $f$  este aplicație continuă,  $f^{-1}(I_1 \times J_1)$  este o mulțime deschisă și deci există  $I$  - un interval deschis - astfel încât  $x_0 \in I \subseteq I_1$  și există un interval deschis  $J'$  așa fel încât  $(x_0, y_0) \in I \times J' \subseteq f^{-1}(I_1 \times J_1)$ .

Fie  $p_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $p_2(u, v) = v, \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2$  (proiecția pe coordonata a doua). Atunci  $p_2$  este operator liniar și deci este diferențiabil pe  $\mathbb{R}^2$ .

Oricare ar fi  $x \in I$ ,  $(x, 0) \in I \times J_1 \subseteq I_1 \times J_1$ , de unde

$$f^{-1}(x, 0) \in f^{-1}(I_1 \times J_1) \subseteq U = I' \times J$$

și deci  $p_2(f^{-1}(x, 0)) \in J$ .

Definim atunci  $\varphi : I \rightarrow J$  prin  $\varphi(x) = p_2(f^{-1}(x, 0)), \forall x \in I$ .

Pentru orice  $(x, y) \in I \times J$ ,  $F(x, y) = 0 \iff f(x, y) = (x, 0) \iff (x, y) = f^{-1}(x, 0) \iff y = p_2(x, y) = p_2(f^{-1}(x, 0)) = \varphi(x) \iff (x, y) = (x, \varphi(x))$ , pentru orice  $x \in I$ .

Deci  $\varphi$  verifică condiția a) din concluzia teoremei. În plus, oricare ar fi  $x \in I$ ,  $F(x, \varphi(x)) = 0$ . Deoarece  $\varphi$  este o compunere de funcții diferențiabile ( $\varphi = p_2 \circ f^{-1} \circ g$ , unde  $g : I \rightarrow I \times J_1$ ,  $g(x) = (x, 0)$ ) ea este derivabilă și deci putem deriva relația de mai sus după  $x$ ; obținem:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x)) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = 0$$

de unde găsim și relația b) din concluzia teoremei.

$F \in C^1(D)$  ceea ce antrenează continuitatea lui  $\varphi'$  pe  $I$ . ■

**3.7.3 Observații.** 1). În exemplul 3.7.1, 2) nu este verificată condiția 3). din teorema precedentă; într-adevăr,  $\frac{\partial F}{\partial y}(1, 0) = 2y|_{y=0} = 0$  și, așa cum am văzut, nu este posibilă explicitarea ecuației  $F(x, y) = 0$  în  $(1, 0)$ .

2). Dacă  $F \in C^2(D)$  atunci funcția  $\varphi$  este de clasă  $C^2$  pe  $I$ ; derivata a doua se obține folosind formula de derivare a funcțiilor compuse în relația care dă derivata lui  $\varphi$ .

$$\varphi''(x) = - \frac{\left[ \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} \cdot \varphi'(x) \right] \cdot \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \left[ \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \cdot \varphi'(x) \right]}{\left( \frac{\partial F}{\partial y} \right)^2}.$$

Dacă în formula de mai sus înlocuim valoarea derivatei lui  $\varphi$  obținem:

$$\varphi''(x) = - \frac{\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \cdot \left( \frac{\partial F}{\partial y} \right)^2 - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \cdot \left( \frac{\partial F}{\partial x} \right)^2}{\left( \frac{\partial F}{\partial y} \right)^3}$$

unde toate derivatele parțiale ale lui  $F$  sînt calculate în  $(x, \varphi(x))$ .

## Capitolul 3

# Diferențiabilitatea funcțiilor de mai multe variabile

### 3.7 Funcții definite implicit

**3.7.4 Exemplu** (foliul lui Descartes). Să considerăm funcția definită implicit prin ecuația  $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy = 0$ . Ecuația dată este simetrică în  $(x, y)$  ceea ce înseamnă că  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : F(x, y) = 0\} = \{(y, x) \in \mathbb{R}^2 : F(x, y) = 0\}$ . Rezultă că mulțimea  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : F(x, y) = 0\}$  este simetrică față de prima bisectoare. Punctele în care prima bisectoare întâlnește mulțimea de mai sus sunt  $(0, 0)$  și  $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ . Vom figura porțiunea din mulțime plasată deasupra bisectoarei întâi ( $y \geq x$ ). Utilizând șirul lui Rolle putem arăta că, oricare ar fi  $x \in (-\infty, \frac{3}{2}]$ , există un unic  $y \geq x$  așa fel încât  $F(x, y) = 0$ .

$F \in C^1(\mathbb{R}^2)$  și  $\frac{\partial F}{\partial y} = 3y^2 - 3x$ . Dacă rezolvăm sistemul  $\begin{cases} y^2 - x = 0 \\ x^3 + y^3 - 3xy = 0 \end{cases}$  obținem punctele în care nu putem aplica teorema funcțiilor implicite:  $(0, 0)$ ,  $(\sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{2})$ . Pentru orice alt punct  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$  se obțin intervalele  $I$  și  $J$  și funcția  $\varphi : I \rightarrow J$  derivabilă cu derivata  $\varphi'(x) = \frac{x^2 - y}{x - y^2}, \forall x \in I$ . Punctele critice se obțin rezolvând sistemul  $\begin{cases} x^2 - y = 0 \\ x^3 + y^3 - 3xy = 0 \end{cases}$  care ne conduce la soluția  $(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4})$ ; dacă observăm că  $\varphi''(\sqrt[3]{2}) < 0$ , rezultă că punctul critic de mai sus este un punct de maxim local.

Notând  $y = tx$  în  $F(x, y) = 0$ , obținem ecuațiile parametrice ale foliului

lui Descartes:  $\begin{cases} x = \frac{3t}{t^3 + 1} \\ y = \frac{3t^2}{t^3 + 1} \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ . Tabelul de variație al lui  $x$  ca funcție de  $t$  este următorul:

$t$	$-\infty$	$-1$	$0$
$x'(t)$		$+$	$+$
$x(t)$	$0 \nearrow$	$+\infty$	$-\infty \nearrow 0$


Se observă că  $x \rightarrow -\infty \Leftrightarrow t \rightarrow -1, t > -1$ ; atunci putem să calculăm panta și ordonata la origine a asimptotei oblice la graficul lui  $\varphi: m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} =$

$\lim_{t \rightarrow -1} t = -1$  și  $n = \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - mx) = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{3(t^2 + t)}{t^3 + 1} = -1$ . Rezultă că graficul funcției admite ca asimptotă dreapta de ecuație  $x + y + 1 = 0$ .

Tabelul de variație al singurei soluții  $y = \varphi(x) \geq x$  a ecuației  $F(x, y) = 0$  va fi:


$x$	$-\infty$	$0$	$\sqrt[3]{2}$	$\frac{3}{2}$
$\varphi'(x)$	$-$	$0$	$+$	$-$
$\varphi(x)$	$+\infty \searrow$	$0$	$\nearrow \sqrt[3]{4}$	$\searrow \frac{3}{2}$

Graficul funcției implicate  $\varphi$  arată ca în figura de mai jos:



Dacă simetrizăm acum graficul de mai sus față de prima bisectoare obținem

graficul foliului lui Descartes.



Din figură putem observa că explicitarea este imposibilă în punctele  $(0, 0)$  și  $(\sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{2})$ .

În cele ce urmează vom prezenta o aplicație a teoremei 3.7.2.

**Aplicație.** Fie un interval  $K \subseteq \mathbb{R}$  și fie  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f \in C^1(K)$  și  $y_0 \in K$  a.î.  $f'(y_0) \neq 0$ . Definim atunci  $F : \mathbb{R} \times K \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x, y) = x - f(y)$ . Fie  $x_0 = f(y_0)$ ; atunci sînt îndeplinite condițiile din teorema 3.7.2 și deci există intervalele  $I, J \subseteq \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in I$ ,  $y_0 \in J$ ,  $I \times J \subseteq \mathbb{R} \times K$  și o funcție  $\varphi : I \rightarrow J$  derivabilă a.î.  $\{(x, y) \in I \times J : x = f(y)\} = \{(x, \varphi(x)) : x \in I\}$  și  $\varphi'(x) = \frac{1}{f'(\varphi(x))}$ . Putem constata ușor că  $(f \circ \varphi)(x) = x, \forall x \in I$  și că  $(\varphi \circ f)(y) = y, \forall y \in \varphi(I)$ . Rezultă că  $\varphi$  este inversă a funcției  $f$  local pe o vecinătate a lui  $y_0$  și obținem formula de derivare a inversei unei funcții de o variabilă.

Încheiem acest paragraf cu două teoreme care extind rezultatul din 3.7.2 la cazul funcțiilor scalare de mai multe variabile și respectiv la cazul funcțiilor vectoriale de mai multe variabile.

**3.7.5 Teoremă.** Fie  $F : D \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  și  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_k^0), y^0 \in \mathbb{R}, (x^0, y^0) \in D$  a.î. să fie verificate următoarele condiții:

- 1).  $F(x^0, y^0) = 0$ ,
- 2).  $F \in C^1(D)$ ,
- 3).  $\frac{\partial F}{\partial y}(x^0, y^0) \neq 0$ .

Atunci există două mulțimi deschise  $I \subseteq \mathbb{R}^k, J \subseteq \mathbb{R}$  cu  $(x^0, y^0) \in I \times J \subseteq D$  și există o funcție  $\varphi : I \rightarrow J$  cu proprietățile:

- a).  $\{(x, y) \in I \times J : F(x, y) = 0\} = \{(x, \varphi(x)) : x \in I\}$ ,

b).  $\varphi$  este de clasă  $C^1$  pe  $I$  și,  $\forall x = (x_1, \dots, x_k) \in I, \forall i = 1, \dots, n$ ,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))}.$$

**3.7.6 Teoremă.** Fie  $F : D \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^l, F = (F_1, \dots, F_l)$  și  $x^0 = (x_1^0, \dots, x_k^0) \in \mathbb{R}^k, y^0 = (y_1^0, \dots, y_l^0) \in \mathbb{R}^l, (x^0, y^0) \in D$ , așa fel încât să fie verificate următoarele condiții:

- 1).  $F(x^0, y^0) = 0$ ,
- 2).  $F \in C^1(D)$ ,
- 3).  $\frac{D(F_1, \dots, F_l)}{D(y_1, \dots, y_l)}(x^0, y^0) \neq 0$ .

Atunci există două mulțimi deschise  $I \subseteq \mathbb{R}^k, J \subseteq \mathbb{R}^l$  cu  $(x^0, y^0) \in I \times J \subseteq D$  și există o funcție

$\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_l) : I \rightarrow J$  cu proprietățile:

- a).  $\{(x, y) \in I \times J : F(x, y) = 0\} = \{(x, \varphi(x)) : x \in I\}$ ,
- b).  $\varphi$  este de clasă  $C^1$  pe  $I$  și,  $\forall x = (x_1, \dots, x_k) \in I, \forall i = 1, \dots, k$ ,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i}(x) = - \frac{\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_l)}{D(x_i, y_2, \dots, y_l)}(x, \varphi(x))}{\frac{D(F_1, \dots, F_l)}{D(y_1, \dots, y_l)}(x, \varphi(x))} \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial \varphi_l}{\partial x_i}(x) = - \frac{\frac{D(F_1, \dots, F_{l-1}, F_l)}{D(y_1, \dots, y_{l-1}, x_i)}(x, \varphi(x))}{\frac{D(F_1, \dots, F_l)}{D(y_1, \dots, y_l)}(x, \varphi(x))} \end{array} \right.$$

**Demonstrație.** Vom schița demonstrația teoremei; demonstrația este asemănătoare demonstrației II a teoremei 3.7.2; ea se bazează pe teorema de inversare locală (teorema 3.6.7).

Fie  $f : D \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l, f(x, y) = (x, F(x, y))$ , oricare ar fi  $(x, y) = (x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_l) \in D$ ; evident  $f \in C^1(D)$ ,  $f(x, y) =$

$$= (x_1, \dots, x_k, F_1(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_l), \dots, F_l(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_l))$$



și deci

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_k} & \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_l} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial F_l}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_l}{\partial x_k} & \frac{\partial F_l}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_l}{\partial y_l} \end{pmatrix}_{(k+l) \times (k+l)}$$

Rezultă că  $\det J_f(x, y) = \frac{D(F_1, \dots, F_l)}{D(y_1, \dots, y_l)}(x, y)$ . Din ipoteză  $\det J_f(x^0, y^0) \neq 0$  și deci  $df(x^0, y^0) : \mathbb{R}^{k+l} \rightarrow \mathbb{R}^{k+l}$  este o bijecție.

Teorema de inversare locală ne asigură că există un deschis  $U \subseteq \mathbb{R}^{k+l}$  astfel încât  $(x^0, y^0) \in U \subseteq D$ ,  $V = f(U)$  este deschis în  $\mathbb{R}^{k+l}$  și  $f$  este difeomorfism între  $U$  și  $V$ ; putem presupune fără a restrânge generalitatea că  $U = I' \times J$ , unde  $I' \subseteq \mathbb{R}^k$ ,  $J \subseteq \mathbb{R}^l$  sunt mulțimi deschise.

Deoarece  $f(x^0, y^0) = (x^0, 0) \in V$ , există mulțimile deschise  $I_1 \subseteq I' \subseteq \mathbb{R}^k$  și  $J_1 \subseteq J \subseteq \mathbb{R}^l$  astfel încât  $(x^0, 0) \in I_1 \times J_1 \subseteq V$  de unde  $(x^0, y^0) \in f^{-1}(I_1 \times J_1) \subseteq U$ .

Funcția  $f$  fiind continuă,  $f^{-1}(I_1 \times J_1)$  este mulțime deschisă și deci există doi deschiși  $I \subseteq I_1 \subseteq \mathbb{R}^k$ ,  $J' \subseteq J_1 \subseteq \mathbb{R}^l$  astfel încât

$$(x^0, y^0) \in I \times J' \subseteq f^{-1}(I_1 \times J_1) \subseteq U = I' \times J;$$

deci  $(x^0, y^0) \in I \times J \subseteq I_1 \times J \subseteq I' \times J = D$ .

Fie  $p_l : \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^l$ ,  $p_l(x, y) = y$ ,  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l$  (proiecția pe  $\mathbb{R}^l$ );  $p_l$  este operator liniar și deci este diferențiabil.

Definim  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^l$  prin  $\varphi(x) = p_l(f^{-1}(x, 0))$ ,  $\forall x \in I$ .

Oricare ar fi  $x \in I$ ,  $(x, 0) \in I \times J_1 \subseteq I_1 \times J_1 \subseteq V$  și deci  $f^{-1}(x, 0) \in U = I' \times J$ ; astfel  $\varphi(x) = p_l(f^{-1}(x, 0)) \in J$  și deci  $\varphi : I \rightarrow J$ .

În plus, dacă  $y = \varphi(x)$ , atunci  $(x, y) = f^{-1}(x, 0)$ , de unde  $F(x, y) = 0$ . Rezultă imediat că  $\{(x, y) \in I \times J : F(x, y) = 0\} = \{(x, \varphi(x)) : x \in I\}$ .

$\varphi$  este compunere de trei funcții diferențiabile ( $\varphi = p_l \circ f^{-1} \circ g$ , unde  $g : I \rightarrow I \times J_1$ ,  $g(x) = (x, 0)$ ) și deci  $\varphi$  este diferențiabilă. Dacă  $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_l)$  atunci, oricare ar fi  $x \in I$ ,

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_k, \varphi_1(x_1, \dots, x_k), \dots, \varphi_l(x_1, \dots, x_k)) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ F_l(x_1, \dots, x_k, \varphi_1(x_1, \dots, x_k), \dots, \varphi_l(x_1, \dots, x_k)) = 0 \end{cases}$$

Fie  $i \in \{1, \dots, k\}$ ; derivând în relațiile de mai sus după  $x_i$  obținem

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_i} + \frac{\partial F_1}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial y_l} \cdot \frac{\partial \varphi_l}{\partial x_i} = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial F_l}{\partial x_i} + \frac{\partial F_l}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial F_l}{\partial y_l} \cdot \frac{\partial \varphi_l}{\partial x_i} = 0 \end{cases} \quad \text{sau}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F_l}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial y_l} \cdot \frac{\partial \varphi_l}{\partial x_i} = -\frac{\partial F_1}{\partial x_i} \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial F_l}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial F_l}{\partial y_l} \cdot \frac{\partial \varphi_l}{\partial x_i} = -\frac{\partial F_l}{\partial x_i} \end{cases}$$

Acesta este un sistem liniar de  $l$  ecuații cu  $l$  necunoscute:  $\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i}, \dots, \frac{\partial \varphi_l}{\partial x_i}$ .

Determinantul sistemului este

$$\frac{D(F_1, \dots, F_l)}{D(y_1, \dots, y_l)}(x, \varphi(x)) = \det(J_f(x, \varphi(x))).$$

Să remarcăm că  $f : U \rightarrow V$  este difeomorfism și deci, oricare ar fi  $(x, \varphi(x)) \in I \times J \subseteq I' \times J = U$ ,  $df(x, \varphi(x)) : \mathbb{R}^{k+l} \rightarrow \mathbb{R}^{k+l}$  este o bijecție (vezi teorema 3.6.5) ceea ce antrenează că  $J_f(x, \varphi(x))$  este nesară.

Rezultă că sistemul de mai sus este compatibil și determinat iar soluția sa este dată de

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i}(x) = -\frac{\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_l)}{D(x_i, y_2, \dots, y_l)}(x, \varphi(x))}{\frac{D(F_1, \dots, F_l)}{D(y_1, \dots, y_l)}(x, \varphi(x))} \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial \varphi_l}{\partial x_i}(x) = -\frac{\frac{D(F_1, \dots, F_{l-1}, F_l)}{D(y_1, \dots, y_{l-1}, x_i)}(x, \varphi(x))}{\frac{D(F_1, \dots, F_l)}{D(y_1, \dots, y_l)}(x, \varphi(x))} \end{cases} \quad \blacksquare$$

## Capitolul 3

# Diferențiabilitatea funcțiilor de mai multe variabile

### 3.8 Extreme condiționate

**3.8.1 Definiție.** Fie  $f : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}, l < k, g_1, \dots, g_l : A \rightarrow \mathbb{R}$ ; considerăm mulțimea  $F = \{x \in A : g_1(x) = 0, \dots, g_l(x) = 0\} \subseteq A$ .


Un punct  $a \in F$  se numește **punct de minim local condiționat** pentru  $f$  în raport cu legăturile date de funcțiile  $g_1, \dots, g_l$  dacă există o vecinătate a sa  $V \in \mathcal{V}(a)$  a.î.  $f(x) \geq f(a), \forall x \in F \cap V$ .

Un punct  $a \in F$  se numește **punct de maxim local condiționat** pentru  $f$  în raport cu legăturile date de funcțiile  $g_1, \dots, g_l$  dacă există o vecinătate a sa  $V \in \mathcal{V}(a)$  a.î.  $f(x) \leq f(a), \forall x \in F \cap V$ .

Punctele de minim local condiționat sau de maxim local condiționat se numesc **puncte de extrem local condiționat** sau **puncte de extrem local cu legături** (condițiile sau legăturile fiind date de relațiile  $g_i(x) = 0, i = 1, \dots, l$ ). Dacă nu este pericol de confuzie, vom mai spune prescurtat că un astfel de punct este un punct de extrem condiționat pentru  $f$ .

**3.8.2 Observații.** 1). Punctele de extrem local condiționat pentru  $f$  sînt puncte de extrem obișnuite pentru restricția funcției  $f$  la mulțimea  $F, f|_F$ . Cu toate acestea nu putem aplica teoria dezvoltată mai sus pentru a găsi aceste puncte. Reamintim că am căutat punctele de extrem ale unei funcții printre punctele critice interioare mulțimii de definiție a funcției. Este însă posibil ca mulțimea  $F$  să nu aibă nici-un punct interior.

De exemplu, fie  $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = x^2 + y^2$ ,  $g(x, y) = x + y - 1$ ,  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Atunci  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y - 1 = 0\} = \{(x, 1 - x) : x \in \mathbb{R}\}$  reprezintă o dreaptă în  $\mathbb{R}^2$  și deci  $F$  nu are puncte interioare.



$f|_F(x, 1 - x) = 2x^2 - 2x + 1$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ , și deci are un punct de minim local în punctul  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \in F$ ; rezultă că punctul  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  este un punct de minim local condiționat pentru funcția  $f$ . Remarcăm că funcția  $f$  are un minim absolut pe  $\mathbb{R}^2$  în  $(0, 0)$ .

2). Așa cum am observat în exemplul de mai sus, dacă sistemul

$$(C) \quad \begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_k) = 0 \\ \dots \\ g_l(x_1, \dots, x_k) = 0 \end{cases}$$

s-ar putea rezolva și deci am determina  $l$  dintre numerele  $x_1, \dots, x_k$  funcție de celelalte  $k - l$  atunci, înlocuindu-le, funcția  $f$  ar rămâne funcție de  $k - l$  variabile independente (fără legături) și punctele de extrem s-ar putea determina prin metoda expusă în secțiunea precedentă. În general acest lucru nu se poate face explicit însă, dacă  $g = (g_1, \dots, g_l) : A \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$  este o funcție de clasă  $C^1$  pe  $A$  și rangul matricii jacobiene  $J_g$  într-un punct  $a \in A$  este egal cu  $l$  - numărul condițiilor impuse - atunci sistemul de mai sus admite local (pe o vecinătate a punctului  $a$ ) o soluție; deci  $l$  dintre variabilele  $x_1, \dots, x_k$  sînt funcții (chiar funcții diferentiabile!) de celelalte  $k - l$ . În cele ce urmează vom presupune că aceste condiții sînt îndeplinite și ne propunem să găsim metode specifice de obținere a punctelor de extrem condiționat pentru  $f$ .

Următoarea teoremă prezintă o condiție necesară pentru ca un punct să fie punct de extrem local condiționat.

**3.8.3 Teoremă.** Fie  $D \subseteq \mathbb{R}^k$  o mulțime deschisă, fie  $l < k$  și funcțiile  $f, g_1, \dots, g_l : D \rightarrow \mathbb{R}$  de clasă  $C^1$  pe  $D$ ; fie  $F = \{x \in D : g_1(x) = 0, \dots, g_l(x) =$

$0\}$  și  $a \in F$  un punct de extrem local condiționat pentru  $f$ . Atunci există  $l$  numere reale  $\lambda_1, \dots, \lambda_l$  a.î.

$$\nabla f(a) = \lambda_1 \cdot \nabla g_1(a) + \dots + \lambda_l \cdot \nabla g_l(a).$$

**Demonstrație.** Vom schița demonstrația teoremei în cazul  $l = 1$ . Presupunem deci că  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}, f, g \in C^1(D), F = \{x \in D : g(x) = 0\}$  și  $a \in F$  un punct de minim local pentru  $f$  condiționat de  $g$ ; există atunci o vecinătate  $V \subseteq D$  a sa a.î.  $f(x) \geq f(a), \forall x \in V \cap F$ .

Din observația precedentă vom presupune că  $\text{rang}(J_g(a)) = 1$ . Deoarece  $J_g(a) = \left( \frac{\partial g}{\partial x_1}(a) \cdots \frac{\partial g}{\partial x_k}(a) \right)_{1 \times k}$  aceasta antrenează că una dintre derivatele parțiale din matricea jacobiană este nenulă. Vom presupune că  $\frac{\partial g}{\partial x_k}(a) \neq 0$ . Putem atunci aplica atunci teorema 3.7.5 (variantea scalară a funcției de mai multe variabile definită implicit). Există deci deschișii  $I \subseteq \mathbb{R}^{k-1}, J \subseteq \mathbb{R}$  a.î.  $(\bar{a}, a_k) = ((a_1, \dots, a_{k-1}), a_k) \in I \times J \subseteq V \subseteq D$  și există funcția  $\varphi : I \rightarrow J$  cu proprietățile:

a).  $\{(\bar{x}, x_k) = (x_1, \dots, x_{k-1}, x_k) \in I \times J : g(x_1, \dots, x_k) = 0\} = \{(\bar{x}, \varphi(\bar{x})) : \bar{x} = (x_1, \dots, x_{k-1}) \in I\}$  și

$$\text{b). } \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\bar{x}) = - \frac{\frac{\partial g}{\partial x_i}(\bar{x}, \varphi(\bar{x}))}{\frac{\partial g}{\partial x_k}(\bar{x}, \varphi(\bar{x}))}, \forall \bar{x} \in I, \forall i = 1, \dots, k-1.$$

Oricare ar fi  $\bar{x} \in I, (\bar{x}, \varphi(\bar{x})) \in I \times J \subseteq V \subseteq D$  și  $g(\bar{x}, \varphi(\bar{x})) = 0$  deci  $(\bar{x}, \varphi(\bar{x})) \in V \cap F$  de unde  $f(\bar{x}, \varphi(\bar{x})) \geq f(a)$ . Rezultă că funcția  $h : I \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $h(\bar{x}) = f(\bar{x}, \varphi(\bar{x})), \forall \bar{x} = (x_1, \dots, x_{k-1}) \in I$  are un minim local în punctul  $\bar{a} = (a_1, \dots, a_{k-1}) \in I$ ; deoarece  $h$  este diferențiabilă în  $\bar{a}$  rezultă

$$\text{din teorema lui Fermat (teorema 3.5.2) că } \begin{cases} \frac{\partial h}{\partial x_1}(\bar{a}) = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial h}{\partial x_{k-1}}(\bar{a}) = 0 \end{cases}, \text{ de unde}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) + \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(\bar{a}) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) + \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(\bar{a}) = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{k-1}}(a) + \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x_{k-1}}(\bar{a}) = 0 \end{cases}.$$

În relațiile de mai sus înlocuim derivatele parțiale ale lui  $\varphi$  și obținem

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)}{\frac{\partial g}{\partial x_k}(a)} \cdot \frac{\partial g}{\partial x_1}(a) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{k-1}}(a) = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)}{\frac{\partial g}{\partial x_k}(a)} \cdot \frac{\partial g}{\partial x_{k-1}}(a) \\ \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)}{\frac{\partial g}{\partial x_k}(a)} \cdot \frac{\partial g}{\partial x_k}(a) \end{array} \right.$$

Notăm  $\lambda = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)}{\frac{\partial g}{\partial x_k}(a)}$  și aunci  $\nabla f(a) = \lambda \cdot \nabla g(a)$ . ■

**3.8.4 Definiție.** Numerele  $\lambda_1, \dots, \lambda_l$  se numesc **multiplicatori Lagrange** asociați funcției  $f$  și legăturilor  $g_1, \dots, g_l$  în punctul critic condiționat  $a$ .

**3.8.5 Observație.** În teorema precedentă

$$\nabla f(a) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \right)$$

este gradientul lui  $f$  în  $a$  (vezi observația 3.2.7, 1)) și  $\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_l(a)$  sînt gradientii funcțiilor  $g_1, \dots, g_l$  în  $a$ .

**3.8.6 Definiție.** Considerăm sistemul de  $k + l$  ecuații:

$$(EC) \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_k) = \lambda_1 \cdot \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_k) + \dots + \lambda_l \cdot \frac{\partial g_l}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_k) \\ \dots \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_k) = \lambda_1 \cdot \frac{\partial g_1}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_k) + \dots + \lambda_l \cdot \frac{\partial g_l}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_k) \\ g_1(x_1, \dots, x_k) = 0 \\ \dots \dots \\ g_l(x_1, \dots, x_k) = 0 \end{array} \right.$$

cu  $k + l$  necunoscute.

Dacă sistemul are o soluție,  $(a_1, \dots, a_k, \lambda_1, \dots, \lambda_l)$  atunci spunem că punctul  $a = (a_1, \dots, a_l)$  este un **punct critic condiționat** pentru funcția  $f$  în raport cu legăturile date de funcțiile  $g_1, \dots, g_l$  iar  $\lambda_1, \dots, \lambda_l$  sînt multiplicatorii Lagrange asociați funcției  $f$  și legăturilor  $g_1, \dots, g_l$  în acest punct.

### 3.8.7 Observație.

Ținînd cont de definiția precedentă putem reformula teorema 3.8.3:

*Punctele de extrem condiționat ale funcției  $f$  în raport cu legăturile date de funcțiile  $g_1, \dots, g_l$  se găsesc printre punctele critice condiționate ale funcției.*

Se observă că o soluție a sistemului din definiția precedentă ne pune la dispoziție atît punctele critice condiționate (potențiale puncte de extrem condiționat) cît și multiplicatorii Lagrange asociați.

**3.8.8 Definiție.** Fie  $\lambda_1, \dots, \lambda_l$  multiplicatorii Lagrange asociați funcției  $f : D \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  și legăturilor  $g_1, \dots, g_l : D \rightarrow \mathbb{R}$  în punctul critic  $a = (a_1, \dots, a_k) \in F = \{x \in D : g_1(x) = \dots = g_l(x) = 0\}$ ; funcția  $L : D \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin  $L(x) = f(x) - \lambda_1 g_1(x) - \dots - \lambda_l g_l(x), \forall x \in D$ , se numește **funcția lui Lagrange**.

**3.8.9 Observații.** 1). Deoarece  $(a_1, \dots, a_k, \lambda_1, \dots, \lambda_l)$  este o soluție a sistemului din definiția 3.8.6, remarcăm că  $a$  este un punct critic al funcției  $L$  și că  $L(a) = f(a)$ .

2). Dacă  $a$  este un punct de minim local pentru  $L$  atunci există o vecinătate a sa  $V$  așa fel încît,  $\forall x \in V \cap A, L(x) \geq L(a) = f(a)$ ; rezultă că,  $\forall x \in V \cap F, f(x) = L(x) \geq L(a) = f(a)$ , ceea ce arată că un asemenea punct este punct de minim local condiționat pentru  $f$ . La fel se arată că dacă  $a$  este punct de maxim local pentru  $L$  atunci el este punct de maxim local condiționat pentru  $f$ .

Rezultă că este suficient să studiem comportamentul lui  $L$  în punctul critic  $a$ ; acest studiu se va face, conform teoremei 3.5.10, analizînd comportarea formei pătratice de  $k$  variabile dată de diferențiala a doua a funcției lui

$$\text{Lagrange în } a, d^2L(a) = \sum_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}(a) dx_i dx_j.$$

Cele spuse mai sus argumentează următoarea teoremă:

**3.8.10 Teoremă.** Fie  $a$  un punct critic condiționat al funcției  $f$  în raport cu legăturile date de funcțiile  $g_1, \dots, g_l$  și  $L$  funcția lui Lagrange.

- Dacă  $d^2L(a)$  este pozitiv definită  $a$  este un punct de minim local condiționat pentru  $f$ .
- Dacă  $d^2L(a)$  este negativ definită  $a$  este un punct de maxim local condiționat pentru  $f$ .

**3.8.11 Observație.** Este posibil ca  $d^2L(a)$  să nu fie pozitiv sau negativ definită și totuși să putem decide asupra punctelor critice condiționate. Astfel, deoarece  $(x_1, \dots, x_k)$  este o soluție a sistemului  $(C)$  (observația 3.8.2, 2)),  $dx_i, i = 1, \dots, k$  nu sînt independente. Dacă diferențiem condițiile  $(C)$  în punctul  $a$  obținem sistemul

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(a)dx_1 + \dots + \frac{\partial g_1}{\partial x_k}(a)dx_k &= 0 \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(a)dx_1 + \dots + \frac{\partial g_2}{\partial x_k}(a)dx_k &= 0 \\ &\dots \\ \frac{\partial g_l}{\partial x_1}(a)dx_1 + \dots + \frac{\partial g_l}{\partial x_k}(a)dx_k &= 0 \end{aligned}$$

Așa cum am remarcat în 3.8.2, 2), presupunem tacit că rangul matricii jacobiene  $J_{(g_1, \dots, g_l)}(a)$  este  $l$ ; atunci sistemul de mai sus permite să determinăm liniar  $l$  dintre  $dx_1, \dots, dx_k$  în funcție de celelalte  $k - l$  diferențiale și astfel  $d^2L(a)$  este o formă pătratică depinzînd de  $k - l$  variabile; după cum aceasta este pozitiv definită, negativ definită sau nedefinită,  $a$  este un punct de minim condiționat, de maxim condiționat sau nu este punct de extrem condiționat.

**3.8.12 Exemplu.** Să se determine distanța de la punctul  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$  la dreapta  $(d)$   $ax + by + c = 0$ .

Considerăm funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(x, y) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$ ; să determinăm punctul de minim condiționat de  $g(x, y) = ax + by + c = 0$ . Sistemul  $(EC)$  care determină punctele critice condiționate devine în acest caz:

$$\begin{cases} 2(x - x_0) = \lambda a \\ 2(y - y_0) = \lambda b \\ ax + by + c = 0 \end{cases}$$

de unde  $\begin{cases} x_1 = x_0 + \frac{\lambda a}{2} \\ y_1 = y_0 + \frac{\lambda b}{2} \end{cases}$  și, înlocuind în ecuația drepte, obținem multiplicatorul  $\lambda = \frac{-2(ax_0 + by_0 + c)}{a^2 + b^2}$  și punctul critic condiționat  $(x_1, y_1)$ .



Funcția lui Lagrange este  $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $L(x, y) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 - \lambda(ax + by + c)$  și deci  $d^2L(x_1, y_1) = 2(dx)^2 + 2(dy)^2$  este pozitiv definită. Rezultă că  $(x_1, y_1)$  este punct de minim condiționat pentru  $f$ .

Valoarea minimului este  $f(x_1, y_1) = (x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 = \frac{\lambda^2(a^2 + b^2)}{4} = \frac{(ax_0 + by_0 + c)^2}{a^2 + b^2}$ .

Distanța de la  $(x_0, y_0)$  la dreapta  $(d)$  se va obține extrăgând radical din valoarea minimă a lui  $f$ ; se obține valoarea cunoscută  $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ .